



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 03 (Έντυπο 11) ημερομηνίας 18/03/2016 για τροποποίηση της άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος, σε χρήσεις ήσσονος σημασίας, με βάση την άδεια του ίδιου σκευάσματος στην Ελλάδα και

την αίτηση με αρ. 3486 (Έντυπο 08), ημερομηνίας 20/02/2019 για παράτασης άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος και

την αίτηση με αρ. 414 (Έντυπο 09) για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε σχέση με τις συσκευασίες με τις οποίες διατίθεται στην αγορά και

την αίτηση με αρ. 106 (Έντυπο 10) ημερομηνίας 09/03/2020 για τροποποίηση της άδειας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και

την επιστολή του αιτητή για τροποποίηση της άδειας με βάση την άδεια του ίδιου σκευάσματος στην Ελλάδα και

τις αιτήσεις με αρ. 3952 και 4422 (Έντυπο 08), για παράτασης άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν

BACTECIN με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3184

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

30/04/2023

Ημερομηνία λήξης άδειας:

15/08/2025

2. Κάτοχος της άδειας:

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Spyros Stavrinos Chemicals Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Spyros Stavrinos Chemicals Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

2. Μορφή:

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη με διάτρητο εσωτερικό καπάκι (τύπου αλατιέρα)	200γρ.,	HDPE
2	Σάκος	1 Kg	PET/AL/PE
3	Σάκος	6Kg έως 20Kg	Εξωτερικά χάρτινος σάκος, εσωτερικά πλαστικός σάκος PA/PE

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Βιολογικό εντομοκτόνο για την καταπολέμηση προνυμφών των λεπιδοπτέρων. Το προϊόν δρα από στομάχου και πρέπει να καταποθεί από τις προνύμφες για να είναι αποτελεσματικό. Λίγες ώρες μετά την κατάποση, οι προνύμφες παύουν να τρέφονται και πεθαίνουν τις επόμενες μέρες.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Επίπαση του φυλλώματος ή της επιφάνειας των πατατοσορών κατά στρώσεις. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης κάλυψη του φυλλώματος και των στρώσεων των πατατοσορών

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις	Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		Κιλά / Δεκάριο ή Κιλά / τόνο		
Αμπέλι (επιτραπέζιο και οينوποιήσιμο)	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i>)	3 κιλά / δεκάριο	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων (L1) 1-2 εφαρμογές ανά γενιά με μεσοδιάστημα 7 ημερών	5 εφαρμογές
Πατάτα (μετασυλλεκτικά)	Φθοριμαία (<i>Phthorimaea operculella</i>)	3 κιλά / τόνο πατάτας	Εφαρμογή στους κονδύλους μετά τη συγκομιδή, κατά την αποθήκευση. Καλό σκόνισμα των κονδύλων κατά στρώσεις. Επανάληψη αν χρειαστεί, μετά από 15 ημέρες	2 εφαρμογές
Λαχανικά Σολανώδη (Υ+Θ) Τομάτα Πιπεριά Μελιτζάνα	Προνύμφες λεπιδοπτέρων: <i>Spodoptera</i> , <i>Noctuidae</i> , <i>Mamestra</i> , <i>Acrolepia (Acrolepiopsis) assectella</i> <i>Agrotis (Scotia) segetum</i> <i>Mamestra brassicae</i> , <i>Depressaria erinaceella</i> , <i>Evergestis forficalis</i> , <i>Tuta absoluta</i> , <i>Helicoverpa (Heliothis) armigera</i> , <i>Helicoverpa (Heliothis) spp.</i> , <i>Spodoptera exigua</i> , <i>Pieris brassicae</i> , <i>Pieris rapae</i> , <i>Plusia spp.</i> , <i>Plutella xylostella</i> , <i>Plutella spp.</i> , <i>Mamestra oleracea</i> (<i>Phytometra (Autographa) gamma</i> <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Spodoptera spp.</i> , <i>Trichoplusia ni</i> , <i>Vanessa cardui</i>	3 κιλά / δεκάριο	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων (L1). 1-3 εφαρμογές ανά γενιά με μεσοδιάστημα 7 ημερών.	5 εφαρμογές
Κράμβες (Υ) Λάχανο Μπρόκολο Κουνουπίδι Λαχανάκια Βρυξελλών Κινέζικο λάχανο Μη κεφαλωτή κράμβη Γογγυλοκράμβη				
Μαρούλια και σαλατικά (Υ) Μαρούλι Λυκοτρίβολο Σκαρόλες (πικρίδα)/πλατύφυλλα αντίδια Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτερες Γαιοκάρδαμο Ρόκα Κόκκινο σινάπι				
Σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα) (Υ) Σπανάκι Ανδράκλα Σέσκουλα/ φύλλα τεύτλων ραδίκια witloof/ αντίβ-				

Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις	Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		Κιλά / Δεκάριο ή Κιλά / τόνο		
<p>Φρέσκο κρεμμύδι Πράσο Αγκινάρα Καπνός</p>	<p>Προνύμφες λεπιδοπτέρων: <i>Spodoptera</i>, <i>Noctuidae</i>, <i>Mamestra</i>, <i>Acrolepia (Acrolepiopsis) assectella</i> <i>Agrotis (Scotia) segetum</i> <i>Mamestra brassicae</i>, <i>Depressaria erinaceella</i>, <i>Evergestis forficalis</i>, <i>Tuta absoluta</i>, <i>Helicoverpa (Heliiothis) armigera</i>, <i>Helicoverpa (Heliiothis) spp.</i>, <i>Spodoptera exigua</i>, <i>Pieris brassicae</i>, <i>Pieris rapae</i>, <i>Plusia spp</i>, <i>Plutella xylostella</i>, <i>Plutella spp.</i>, <i>Mamestra oleracea</i> <i>(Phytometra (Autographa) gamma</i> <i>Spodoptera littoralis</i>, <i>Spodoptera spp.</i>, <i>Trichoplusia ni</i>, <i>Vanessa cardui</i></p>	<p>3 κιλά / δεκάριο</p>	<p>Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων (L1). 1-3 εφαρμογές ανά γενιά με μεσοδιάστημα 7 ημερών.</p>	<p>5 εφαρμογές</p>

Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες: φρέσκο κρεμμύδι, πράσο, αγκινάρα και καπνός από τη χρήση του σκευάσματος.
Για αυτές τις χρήσεις ήσσονος σημασίας, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Όλες οι καλλιέργειες του φάσματος δράσης	0 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: ----

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα:

Δε συνδυάζεται με άλλα προϊόντα

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P102+P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε τη σκόνη.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια (EN166: 4 ή άλλο ανάλογο)/ μάσκα για σκόνη (EN149 FFP1 ή άλλη ανάλογη).

P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε

Περιέχει *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P302 + P352- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό

P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Πληροφορίες για τον γιατρό:

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Αποθηκεύεται στην αρχική, καλά κλεισμένη συσκευασία του, μακριά από ηλιακό φως, σε χώρο αεριζόμενο και χωρίς υγρασία, με θερμοκρασία κάτω από 30°C. Στις παραπάνω συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα σακίδια ή φιάλες που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 23/05/2023...



(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα