



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011  
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 3689, ημερομηνίας 20/05/2015 για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος και  
την επιστολή του αιτητή με ημ. 01/04/2015 για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στη Γαλλία και  
την αρ. 195 (Έντυπο 09), ημερομηνίας 30/01/2017 για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος, σε σχέση με τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας και του σκευάσματος και  
την αίτηση με αρ. 3278 (Έντυπο 08), για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος και  
την αίτηση με αρ. 454 (Έντυπο 09), για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος, σε σχέση με τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος και τις συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν διατίθεται στην αγορά και την αίτηση με αρ. 3724 (Έντυπο 8), για παράταση της άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος και την αίτηση με αρ. 4168 (Έντυπο 08), για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **PREVALOR 80WG** με τα ακόλουθα στοιχεία:

**A) Γενικά στοιχεία άδειας**

1. Αριθμός Άδειας:

3164

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

29/03/2022

Ημερομηνία λήξης άδειας:

30/04/2024

2. Κάτοχος της άδειας:

Bayer Ελλάς ABEE

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Costas Christodoulou Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Costas Christodoulou Ltd

## Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

2. Μορφή:

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλα μέσα σε κουτί	100γρ, 500γρ, 1Kg, 2.5Kg, 5Kg (2 σακουλάκια των 2.5Kg), 5Kg.	Σακούλα τρίφυλλη από πολυεστέρα/αλουμίνιο/πολυαιθυλένιο, κουτί χάρτινο

### Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:
2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:
3. Παρασκευαστής της δ.ο.:
4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

### Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Το Prevalor 80 WG είναι ένα διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.  
Χάρη στη διασυστηματική δράση του, το Prevalor 80 WG επιτυγχάνει τη διέγερση των φυσικών αμυνών του φυτού και δρα αποτελεσματικά κατά των μυκήτων που συνδέονται άμεσα με τη Φυτόφθορα (*Phytophthora*), καθώς και κατά ασθενειών που προκαλούνται από βακτήρια, όπως το Βακτηριακό κάψιμο (*Erwinia amylovora* σε μηλιά και αχλαδιά).

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες   
ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε στο ψεκαστικό την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε με νερό αναδεύοντας συνεχώς.

## 5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Ασθένεια που ελέγχεται	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	γρ./δεκ. μέγιστη		
<b>Μηλιά</b> <b>Αχλαδιά</b> <b>Αχλαδιά τύπου “Nashi”</b> <b>(Αχλαδόμηλο)</b> <b>Κυδωνιά</b>	<b>Βακτηριακό κάψιμο</b> ( <i>Erwinia amylovora</i> )	---	100 – 200	375	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικές εφαρμογές την περίοδο της ανθοφορίας από το στάδιο του «φουσκώματος» των οφθαλμών και ανάλογα με τις συνθήκες και την πίεση της προσβολής. Εφαρμόστε 3-4 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή (2 <sup>η</sup> εφαρμογή). 3-4 ημέρες αργότερα μπορεί να είναι απαραίτητη και μία 3 <sup>η</sup> εφαρμογή στην περίπτωση που ο κίνδυνος μόλυνσης του φυτού είναι μεγάλος και η ανθοφορία παρατείνεται.	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 3 – 4 ημέρες
<b>Μηλιά</b>	<b>Φυτόφθορα</b> ( <i>Phytophthora spp.</i> )		100 – 200	250	Ψεκασμοί φυλλώματος. Α) Στα φυτώρια εφαρμόστε έναν ψεκασμό το μήνα κατά την περίοδο της βλάστησης και μέχρι 4 φορές το χρόνο. Β) Σε ενήλικα δένδρα εφαρμόστε προληπτικά: - Κατά την ανθοφορία. - Ένα (1) μήνα μετά την ανθοφορία. - 2 μήνες μετά την ανθοφορία. Για θεραπευτική προστασία εφαρμόστε έναν (1) ψεκασμό κάθε μήνα κατά την περίοδο της βλάστησης με όριο τις 4 εφαρμογές	4
<b>Εσπεριδοειδή</b> (Πορτοκαλιά Λεμονιά Μανταρινιά Νερατζιά Γκρειπ-Φρουτ Κουμ-κουάτ)	<b>Φυτόφθορα</b> ( <i>Phytophthora spp.</i> )		200 – 400	250	Ψεκασμοί φυλλώματος. Τρεις (3) εφαρμογές: - Την άνοιξη. - Στις αρχές του Ιουνίου (2 <sup>ο</sup> κύμα βλάστησης). - Το Σεπτέμβριο (με το τέλος του 2 <sup>ου</sup> κύματος βλάστησης).	3

Πεδίο Εφαρμογής	Ασθένεια που ελέγχεται	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	γρ./δεκ. μέγιστη		
<b>Πεπόνι</b> (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	<b>Περονόσπορος</b> ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	---	50 – 100	400	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	2
<b>Φράουλα</b> (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	<b>Σήψεις λαιμού Φυτόφθορα</b> ( <i>Phytophthora fragariae</i> , <i>Phytophthora cactorum</i> )	---	50 – 70	500	A. Τη χρονιά της φύτευσης μία (1) εφαρμογή κατά τη φύτευση, και μετά 1-2 εφαρμογές τον επόμενο μήνα της εφαρμογής. B. Τη χρονιά παραγωγής την περίοδο της άνοιξης με την ανανέωση της βλάστησης 2-3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα ενός (1) μηνός.	3
<b>Ραδίκι</b>	<b>Φυτόφθορα</b> ( <i>Phytophthora cryptogea</i> )	375	--	--	Εμβάπτιση φυτών (ριζών) διάρκειας 1-2 λεπτών, κατά τη μεταφύτευση (σπορείο).	1
<b>Ραδίκι</b>		15 γρ./τετρ. μέτρο	--	--	Μία (1) εφαρμογή ανά έτος. Ψεκασμός του υπέργειου τμήματος (φύλλωμα) κατά τη μεταφύτευση (σπορείο).	Μία (1) εφαρμογή ανά έτος
<b>Ραδίκι<sup>1</sup></b> (Υπαίθρου)		---	500	60 – 80	Δύο (2) εφαρμογές ανά έτος. Ψεκασμός του υπέργειου τμήματος (φύλλωμα).	Δύο (2) εφαρμογές ανά έτος
<b>Λυκίσκος</b>	<b>Περονόσπορος</b> ( <i>Pseudoperonospora humili</i> )		625	60 – 80	Ψεκασμός φυλλώματος με μεσοδιαστήματα 14 ημερών.	8 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημέρες

**Παρατηρήσεις:**

1. Σε περίπτωση εφαρμογής στο υπέργειο τμήμα ραδικιού να μην εφαρμόζεται το Prevalor 80 WG σε συνδυασμό με άλλο σκεύασμα κατά την περίοδο του «δυναμώματος».

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Μηλιά, Αχλαδιά, Αχλαδιά τύπου "Nashi" (Αχλαδόμηλο), Κυδωνιά	28 ημέρες
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Νερατζιά, Γκρειπ-Φρουτ)	15 ημέρες
Πεπόνι	3 ημέρες
Ραδίκι (1 εφαρμογή/έτος) (εμβάπτιση ριζών / σπορείο)	21 ημέρες
Φράουλα , Ραδίκι (2 εφαρμογές/έτος) Λυκίσκος	14 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Ομάδα Τρόπου Δράσης: **33**

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

----

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

----

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

24 ώρες

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα:

-----

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

**ΠΡΟΣΟΧΗ**



**GHS07**

## 12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

**H319** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

## 13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

**P102** Μακριά από παιδιά.

**P270** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

**P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο.

**Spe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** μέχρι τα σώματα επιφανειακών υδάτων.

**Spe3** Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** μέχρι τη μη γεωργική γη.

**SP1** Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

**EUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

«Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές»

## 14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

**P337 + P313** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.

Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα που διαρκούν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** μετακινηθείτε στον καθαρό αέρα.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι, και εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400 και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** ξεπλύνετε τα καλά με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Καλέστε αμέσως γιατρό. Θεραπεία του ματιού από οφθαλμίατρο.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ειδοποιήστε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό και σε ηρεμία.

**Πληροφορίες για το Γιατρό:**

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401**

## Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο ξηρό χώρο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.

**ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

**Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:**

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία: 29/03/2022

.....  
(Ανδρούλα Γεωργίου)  
Διευθύντρια  
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα