



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4456 (έντυπο 01), για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος με βάση τη διαδικασία της αμοιβαίας αναγνώρισης και

την επιστολή του αιτητή για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ιταλία και

την αίτηση με αρ. 595 (έντυπο 09) για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε σχέση με τα εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος και

την αίτηση με αρ. 4472 (έντυπο 08), για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν JAVISE με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3892

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

30/04/2023

Ημερομηνία λήξης άδειας:

15/03/2026

2. Κάτοχος της άδειας:

ASCENZA AGRO S.A.

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

L. LAMBROU AGRO LTD

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

L. LAMBROU AGRO LTD

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

Javise

2. Μορφή:

Εναιωρηματοποιησιμοι κόκκοι (WG)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Cyprodinil:50% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 49% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

ASCENZA AGRO S.A.

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

1. ASCENZA AGRO S.A.
2. S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SPA

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

ASCENZA AGRO S.A.

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Σακούλα	375 γρ έως 1κιλό	PET/ AL /PE
2.	Σακούλα	3 έως 6 κιλά	OPP/ AL /PE

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

Cyprodinil

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98% (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

ASCENZA AGRO S.A.

4. Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Jiangsu Flag Chemical Industry Co., Ltd

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση, για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου των μηλοειδών, της *Monilia fructigena* των πυρηνοκάρπων και του βοτρυτή στο αμπέλι. Το cyrodinil παρουσιάζει αποπ्लाστική και διελασματική δράση

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Το ψεκαστικό διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες από την παρασκευή του αφού προηγηθεί ισχυρή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τον ψεκαστικό εξοπλισμό. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο, ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος. Η προσθήκη απορρυπαντικού θα βελτιώσει τη διαδικασία καθαρισμού

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόσεις			Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο	
		γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	Γρ. σκ./δεκ. μέγιστη		
Αμπέλι (οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο) ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά Αχλαδιά Κυδωνιά Μουσμουλιά Αχλαδομηλιά ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Ροδακινιά Βερικοκιά Κερασιά Βουσσινιά Δαμασκηνιά ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:	Βοτρυτής (<i>Botrytis sp.</i>)			75	Από την έναρξη της άνθισης έως το στάδιο αλλαγής χρώματος των ραγών. (BBCH 60-83)	1 εφαρμογή
	Φουζικλάδιο (<i>Venturia sp.</i>)	---	50 – 100	50	Από την έναρξη της ανάπτυξης του φυλλώματος έως πριν την έναρξη της άνθισης. (BBCH 10-59)	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες
	Φαιά Σήψη (<i>Monilia fructigena</i>)			50	Από την έναρξη της ανάπτυξης του φυλλώματος έως όπου ο καρπός να είναι ώριμος για κατανάλωση. (BBCH 10-89)	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας. 2. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΥΣ						

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Αμπέλι, Πυρηνόκαρπα	7 ημέρες
Μηλοειδή	60 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: Cyrodinil: D1

- Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας του φουζικλαδίου στο cyrodinil, ο αριθμός των εφαρμογών περιορίζεται στις δύο ανά κύκλο καλλιέργειας.
- Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται οι εφαρμογές με JAVISE να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα από άλλες ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις ανιλινοπυριμιδίνες

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH208 Περιέχει cyrodinil. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

- P405+102** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
- P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
«Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και κατά την εφαρμογή.»
«Σε περίπτωση επανεισόδου, μετά το ψεκάσμο, θα πρέπει να φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.»
- SP1** Μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή την συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).
- SPe2** Για την προστασία των **μακροοργανισμών του εδάφους**, μην εφαρμόζεται σε εδάφη με $pH \leq 5$.
- SPe3** Για να προστατέψετε τους **υδρόβιους οργανισμούς**, αφήστε από τα επιφανειακά ύδατα: Στην καλλιέργεια του Αμπελιού, μια φυτική ζώνη ανάσχεσης **10 μέτρων**. Στις καλλιέργειες Μηλοειδών και Πυρηνόκαρπων, μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας **30 μέτρων** συμπεριλαμβανομένης μίας φυτικής ζώνης ανάσχεσης **20 μέτρων**

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Γενικές πληροφορίες: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα.

Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύνετε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείται.

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό (<40°C) και καλά αεριζόμενο μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας (σακούλες) αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 08/06/2023



(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας