



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4312-P (Έντυπο 03) για χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου σε φυτοπροστατευτικό προϊόν

τροποποιείται ως ακολούθως η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν HERBY FLO 400SC με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3789-P

Προηγούμενη χορήγησης άδειας:

14/09/2020

Ημερομηνία λήξης άδειας:

Θα καθορισθεί μετά την επανέγκριση του προϊόντος αναφοράς

2. Κάτοχος της άδειας:

L.Lambrou Agro Ltd

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

L.Lambrou Agro Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

L.Lambrou Agro Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Herby Flo 400SC

2. Μορφή: Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: propyzamide: 40% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 61,85% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: Dow AgroSciences LLC Indianapolis USA

5. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	100κ.εκ., 150κ.εκ., 200κ.εκ., 250κ.εκ., 500κ.εκ., 750κ.εκ., 1Λ, 1.5Λ, 2Λ, 3Λ και 5Λ	HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) ή PET

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: propyzamide

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 92% β/β min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: Dow AgroSciences LLC Indianapolis USA

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Dow AgroSciences Italia Srl, Ιταλία

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο που απορροφάται από τις ρίζες και μετακινείται αποπ्लाστικά. Η ζιζανιοκτόνος δράση του οφείλεται στην παρεμπόδιση του πολυμερισμού της τουμπουλίνης με αποτέλεσμα την αναστολή της αύξησης του ριζικού συστήματος.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Εφαρμόζεται ανάλογα με την καλλιέργεια, προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά ή αμέσως μετά την μεταφύτευση.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίζετε το ψεκαστικό δοχείο με τη μισή ποσότητα νερού. Προσθέστε την απαιτούμενη δόση σκευάσματος και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να αναδευτεί καλά πριν την έναρξη του ψεκασμού.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Ζιζάνιο που ελέγχεται	Δόσεις		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		κ.εκ σκ./δεκ.	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)		
Ακρόδρυα: (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Καστανιά)	- Πλατύφυλλα: Κουσκούτα (<i>Cuscuta spp.</i>) Πολυκόμπι (<i>Polygonum aviculare</i>) Αγριοπιπεριά (<i>P. persicaria</i>) Λουβουδιά (<i>Chenopodium album</i>) Βερόνικα (<i>Veronica spp.</i>) Αντράκλα (<i>Portulaca oleracea</i>) - Αγρωστώδη: Αλεπονουρά (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Κοινή πόα (<i>Poa annua</i>)	187,5	20 – 40	Εφαρμόζεται ανάμεσα στις γραμμές προφυτρωτικά επιφανειακά.	1 εφαρμογή
Μηλοειδή: (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά)					
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά)					
Αμπέλι		250		α) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά β) αμέσως μετά τη μεταφύτευση.	
Μπρόκολο Λάχανο				α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά γ) αμέσως μετά τη μεταφύτευση	
Κουνουπίδι		375		α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά γ) αμέσως μετά τη μεταφύτευση.	
Μαρούλι		375		α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά γ) αμέσως μετά τη μεταφύτευση.	
Ραδίκι		375		Μεταφυτρωτικά έως το 4 ^ο φύλλο.	
Αντίδι		375		α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά.	
Φασολάκια νωπά		187,5		α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά	

Πεδίο Εφαρμογής	Ζιζάνιο που ελέγχεται	Δόσεις		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		κ.εκ σκ./δεκ.	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)		
Αγκινάρα Άγρια αγκινάρα	- Πλατύφυλλα: Κουσκούτα (<i>Cuscuta spp.</i>)	375	20 – 40	Μεταφυτρωτικά στην έναρξη ανάπτυξης βλαστού.	1 εφαρμογή
Φακή	Πολυκόμπι (<i>Polygonum aviculare</i>)	187,5		α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά.	
	Αγριοπιπεριά (<i>P. persicaria</i>) Λουβουδιά (<i>Chenopodium album</i>)			α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά	
Ηλιάνθος	Βερόνικα (<i>Veronica spp.</i>) Αντράκλα (<i>Portulaca oleracea</i>)	187,5		α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά	
Ελαιοκράμβη	- Αγρωστώδη: Αλεπονουρά (<i>Alopecurus myosuroides</i>)	187,5		Μετά το στάδιο των 2-4 φύλλων	
Καλλωπιστικά (Δένδρα και Θάμνοι)	Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Κοινή πόα (<i>Poa annua</i>)	375	Εφαρμόζεται στις γραμμές φύτευσης ή στο 50% της επιφάνειας του εδάφους.		

Παρατηρήσεις:

1. Στα φυλλώδη λαχανικά για την καλύτερη καταπολέμηση της κουσκούτας, η δόση μπορεί να αυξηθεί έως τα 500κ.εκ./δεκάριο.
2. **Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων που προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος HERBY FLO 400 SC.**

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Ακρόδρυα, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Αμπέλι, Ηλίανθος, Ελαιοκράμβη, Καλλωπιστικά δένδρα και θάμνοι	Μη Εφαρμόσιμο
Μπρόκολο, Λάχανο, Κουνουπίδι, Αγκινάρα	60 ημέρες
Μαρούλι, Αντίδι	28 ημέρες
Φασολάκια νωπά, Φακή	90 ημέρες
Άγρια αγκινάρα	120 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

1. Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: K1

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

- Αγκινάρες, ραδίκι, μαρούλι, σκαρόλα: κανένα.
- Ψυχανθή, καλαμπόκι, σόργο, καρώτο, πατάτα, σέλινο, φράουλα, βαμβάκι: 5 μήνες.
- Σαχαρότευτλα, σπανάκι, κολοκυνθοειδή, λάχανο, ελαιοκράμβη, κρεμμύδι, σκόρδο, πιπεριά, τομάτα, μελιτζάνα: 8 μήνες.
- Σιτηρά, αγρωστώδη για βοσκή, γρασίδια: 12 μήνες.

Το έδαφος στο οποίο έχει εφαρμοστεί HERBY FLO 400 SC πρέπει να οργωθεί σε βάθος 15 εκ. πριν να σπαρεί με σιτηρά, αγρωστώδη ή οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια που δεν αναφέρεται παραπάνω.

Οι παραπάνω χρόνοι είναι οι μέγιστοι που απαιτούνται. Ο χρόνος αναμονής μπορεί να μειωθεί σε θερμά κλίματα καθώς και όταν χρησιμοποιούνται οι χαμηλές δόσεις εφαρμογής.

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Να αποφεύγεται η επανείσοδος των ανθρώπων μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS08



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

EUH208 Περιέχει 2-ναφθαλινοσουλφονικό οξύ, 6-υδροξυ-, πολυμερές με φορμαλδεΐδη και μεθυλοφαινόλη, άλας νατρίου και 1,2-βενζισοθειαζολιν-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P202 Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης

P280 Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα

Απαγορεύεται η εφαρμογή του σκευάσματος με ψεκαστήρες πλάτης

EUH401 «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης»

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P302+P361+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P308+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P304+P340+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P305+P351+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P301+P330+P331+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε θεραπεία συμπτωματική.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο ξηρό χώρο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η άδεια παράλληλου εμπορίου χορηγείται στο προϊόν Herby Flo 400SC που είναι εγκεκριμένο στη Γερμανία με εμπορικό όνομα KERBFLO και αριθμό έγκρισης 006620-00 και με κάτοχο άδειας την εταιρεία Dow AgroSciencesGmbH

Το προϊόν αναφοράς στην Κύπρο βάση του οποίου χορηγείται η σχετική άδεια είναι το Kerb Flo 400SC με αριθμό άδειας 3303.

Η εταιρεία L. Lambrou Agro Ltd, οφείλει να τηρά αρχείο (Αρχείο Εισαγωγής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Παράλληλου Εμπορίου) με τις ποσότητες του σκευάσματος Herby Flo 400SC που εισάγονται στην Κύπρο (θα περιλαμβάνει όλα τα παραστατικά στοιχεία των εισαγωγών ανά παρτίδα σκευάσματος).

Το αρχείο θα είναι άμεσα διαθέσιμο για έλεγχο από την αρμόδια Αρχή.

Για κάθε φορτίο του σκευάσματος Herby Flo 400SC που εισάγεται στην Κύπρο θα πρέπει να χορηγείται η σχετική «Άδεια για Εισαγωγή Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος Παράλληλου Εμπορίου». Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η εισαγωγή του σκευάσματος στη χώρα.

Η ετικέτα του σκευάσματος θα φέρει ευανάγνωστα τη φράση «**ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**» με τα πλέον έντονα και μεγάλα γράμματα.

Η άδεια παράλληλου εμπορίου θα ανακληθεί:

- σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας του προϊόντος αυτού στη Γερμανία για λόγους ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας.

- σε περίπτωση κακού χειρισμού της άδειας παράλληλου εμπορίου από την εταιρεία L. Lambrou Agro Ltd, με στόχο την εισαγωγή ή τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων άλλων από αυτά για τα οποία χορηγήθηκε η παρούσα άδεια.

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011

Ημερομηνία:14/09/2020.....

.....
(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα