



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011  
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 3600-P (έντυπο 07) για ανανέωση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος παράλληλου εμπορίου και την τροποποίηση του προϊόντος αναφοράς

τροποποιείται η άδεια παράλληλου εμπορίου στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **FOLICUR 25WG** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3014-P

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

18/09/2020

Ημερομηνία λήξης άδειας:

Θα καθορισθεί μετά τη διαδικασία επανέγκρισης του προϊόντος αναφοράς

2. Κάτοχος της άδειας:

A. D. Georoniki Ltd

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

A. D. Georoniki Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

A. D. Georoniki Ltd

## Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

2. Μορφή:

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

5. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Σακούλα σε κουτί	100 γρ., 150 γρ., 200 γρ., 300 γρ., 400 γρ., 500 γρ., 600 γρ. και 1 κιλού	Σακούλα (εξ) από σύνθετο υλικό (πολυεστέρας /αλουμίνιο/ πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας), κουτί χάρτινο
2.	Σακούλες σε κουτί	2 x 500 γρ.	

## Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

## Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

### 1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Το Folicur 25 WG είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με πλατύ φάσμα δράσης. Χρησιμοποιείται προφυλακτικά αλλά και θεραπευτικά. Εφαρμόζεται σε ψεκασμούς φυλλώματος. Καταπολεμά ένα μεγάλο αριθμό ασθενειών όπως Ωίδιο (Στάχτη), Βοτρύτη, Αλτερνάρια, Διδυμέλλα, Κλαδοσπόριο, Σεπτόρια, Σκωρίαση, Μυκοσφαιρέλλα, Φουζικλάδιο, Μονίλια και Σκληρωτίνια.

### 2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

### 3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός καλύψεως.

### 4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

## 5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο	
		γρ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	γρ. σκ./δεκ. μέγιστη			
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά)	<b>Φουζικλάδιο</b> ( <i>Venturia inaequalis</i> )	40	100 – 150	60	Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικές εφαρμογές ή Θεραπευτικές εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημέρες	
	<b>Ωίδιο (στάχτη)</b> ( <i>Podosphaera leucotricha</i> )	50*	150	75			
	<b>Μονίλια</b> ( <i>Monilinia laxa</i> )	50 – 75*	100 – 150*	75			
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά Νεκταρινιά Βερικοκιά Κερασιά Δαμασκηνιά)	<b>Φουζικλάδιο</b> ( <i>Venturia carpophila</i> )	40	100-150	60		Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικές εφαρμογές ή Θεραπευτικές εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημέρες
	<b>Ωίδιο (στάχτη)</b> ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> )	50*	150	75			
	<b>Μονίλια</b> ( <i>Monilinia laxa</i> )	50 – 75*	100 – 150*	75			
<b>Αμπέλι</b> (Επιτραπέζιες & Οινοποιήσιμες ποικιλίες)	<b>Ωίδιο (στάχτη)</b> ( <i>Uncinula necator</i> )	40	100	40	Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικές εφαρμογές ή Θεραπευτικές εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.		2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 12-14 ημέρες
	<b>Βοτρύτης</b> ( <i>Botrytis sp.</i> )						
<b>Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Καρπούζι, Πεπόνι, Κολοκύθι, Φασόλι, Μπιζέλι</b>	<b>Ωίδιο (στάχτη)</b> ( <i>Leveillula taurica, Oidium neolycopersici, Oidium spp, Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum, Erysiphe spp.</i> )	50	100	50			Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικές εφαρμογές ή Θεραπευτικές εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.
	<b>Βοτρύτης</b> ( <i>Botrytis cinerea, Botrytis sp.</i> )						
	<b>Αλτερνάρια</b> ( <i>Alternaria spp., Alternaria solani, Alternaria alternata</i> )						
	<b>Ανθράκωση</b> ( <i>Colletotrichum spp.</i> )						
	<b>Διδυμέλλα</b> ( <i>Didymella sp.</i> )						
	<b>Μυκοσφαιρέλλα</b> ( <i>Mycosphaerella sp.</i> )						
	<b>Σκωρίαση</b> ( <i>Uromyces spp, Uromyces pisi</i> )						
	<b>Σεπτόρια</b> ( <i>Septoria spp.</i> )						
	<b>Σκληρωτίνια</b> ( <i>Sclerotinia spp.</i> )						

Η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 75 κ.εκ. σκευάσματος/δεκάριο.

Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει Υπέρβαση του Μέγιστου Επιτρεπόμενου Ορίου Υπολειμμάτων

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Αγγούρι, Κολοκύθι, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά	3 ημέρες
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά), Καρπούζι, Πεπόν	7 ημέρες
Φασόλια, Μπιζέλια	14 ημέρες
Αμπέλι (Επιτραπέζιες ποικιλίες)	Εφαρμογή μέχρι το τέλος της άνθησης
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες)	21 ημέρες
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά)	35 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 3**

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Η ανεκτικότητα του από τα φυτά θεωρείται πολύ καλή όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

10. Συνδυαστικότητα:

Συνδυάζεται με τα συνηθισμένα εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα εκτός από τα πολύ αλκαλικά

11. Εικονογράμματα κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS08



GHS09

## 12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

**H361d** Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

**H411** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

**EUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

## 13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

**P405 + P102** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

**P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P201** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση

**P220** Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

**P281** Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.

**SP 1** Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

## 14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση ατυχήματος** ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε αυτή την ετικέτα.

Δεν υπάρχει αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία

**Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401**

## Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής του εφόσον φυλάγεται σφραγισμένο σε ξηρή και δροσερή αποθήκη

## ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας

## **Z. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:**

### **ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**

Η άδεια παράλληλου εμπορίου χορηγείται στο προϊόν Folicur 25WG που είναι εγκεκριμένο στην Ιταλία με εμπορικό όνομα Folicur WG και αριθμό έγκρισης 8498 και με κάτοχο άδειας την εταιρεία BAYER.

Το προϊόν αναφοράς στην Κύπρο βάση του οποίου χορηγείται η σχετική άδεια είναι το Folicur 25WG με αριθμό άδειας 2095.

Η εταιρεία A.D Georoniki Ltd, οφείλει να τηρά αρχείο (Αρχείο Εισαγωγής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Παράλληλου Εμπορίου) με τις ποσότητες του σκευάσματος Folicur 25WG που εισάγονται στην Κύπρο (θα περιλαμβάνει όλα τα παραστατικά στοιχεία των εισαγωγών ανά παρτίδα σκευάσματος).

Το αρχείο θα είναι άμεσα διαθέσιμο για έλεγχο από την αρμόδια Αρχή.

Για κάθε φορτίο του σκευάσματος Folicur 25WG που εισάγεται στην Κύπρο θα πρέπει να χορηγείται η σχετική «Άδεια για Εισαγωγή Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος Παράλληλου Εμπορίου». Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η εισαγωγή του σκευάσματος στη χώρα.

Η ετικέτα του σκευάσματος θα φέρει ευανάγνωστα τη φράση «**ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**» με τα πλέον έντονα και μεγάλα γράμματα.

Η άδεια παράλληλου εμπορίου θα ανακληθεί:

- σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας του προϊόντος αυτού στην Ιταλία για λόγους ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας.
- σε περίπτωση κακού χειρισμού της άδειας παράλληλου εμπορίου από την εταιρεία A.D Georoniki Ltd, με στόχο την εισαγωγή ή τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων άλλων από αυτά για τα οποία χορηγήθηκε η παρούσα άδεια.

1. Έξι μήνες μετά την υπογραφή της παρούσας άδειας, η τιμολόγηση του σκευάσματος από τον κάτοχο της άδειας ή τον υπεύθυνο για τη διάθεση του σκευάσματος στην αγορά επιτρέπεται μόνο εφόσον φέρει ετικέτα σύμφωνη με τα οριζόμενα στην παρούσα άδεια.

2. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία ...18/09/2020...

.....  
(Ανδρούλα Γεωργίου)  
Διευθύντρια  
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα