



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4544 (Έντυπο 01), για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος και
την επιστολή του αιτητή, για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ολλανδία (Χρήσεις Εντός Θερμοκηπίου) και
την αίτηση με αρ. 766 (Έντυπο 09) για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε σχέση με τη χρονική σταθερότητα του σκευάσματος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **VELIFER OD** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3996

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

09/02/2024

Ημερομηνία λήξης άδειας:

20/02/2030

2. Κάτοχος της άδειας:

BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Agrolan Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Agrolan Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:
2. Μορφή:
3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
4. Παρασκευαστής σκευάσματος:
5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:
6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:
7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Μπουκάλι	0.15 λίτρο έως 1 λίτρο	f-HDPE & HDPE Πολυαιθυλένιο Υψηλής πυκνότητας
2.	Φιάλη	1 λίτρα έως 50 λίτρα	f-HDPE & HDPE Πολυαιθυλένιο Υψηλής πυκνότητας

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:
2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:
3. Παρασκευαστής των δ.ο.:
4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση θριπών και αλευρωδών σε λαχανικά, φράουλα και καλλωπιστικά υπό κάλυψη.
Περιέχει το στέλεχος PPRI5339 του εντομοπαθογόνου μύκητα *Beauveria bassiana* και δρα από επαφής, καθώς τα σπόριά του βλαστάνουν και εισέρχονται στο σώματα των εντόμων διαπερνώντας του χιτινικό τους περίβλημα και την επιδερμίδα τους.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος μέχρι απορροής.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα νερού και ενεργοποιήστε τον αναδευτήρα σε κίνηση. Προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος υπό ανάδευση. Συμπληρώστε το ψεκαστικό μηχάνημα με την υπόλοιπη ποσότητα νερού, συνεχίζοντας την ανάδευση. Μην αποθηκεύετε το ψεκαστικό διάλυμα. Επειδή πρόκειται για εντομοκτόνο επαφής, ο ψεκαστικός εξοπλισμός και τα ακροφύσια θα πρέπει να ρυθμίζονται κατά τέτοιο τρόπο που να επιτυγχάνεται πλήρης κάλυψη της επιφάνειας των φυτών κατά την εφαρμογή του.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Ξεπλύνετε το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη	
Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα (Θερμοκηπίου)	Θρίπας <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>	50	50 – 250	125	73/5
	Αλευρώδης <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Bemisia argentifolii</i>				
Αγγούρι Αγγουράκι Κολοκύθι Κολοκύθα Πεπόνι Καρπούζι (Θερμοκηπίου)	Θρίπας <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>				
	Αλευρώδης <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Bemisia argentifolii</i>				
Φράουλα (Θερμοκηπίου)	Θρίπας <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>	50	50 – 250	125	
	Θρίπας <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>				
Καλλωπιστικά φυτά (Θερμοκηπίου)	Θρίπας <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>				
	Αλευρώδης <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Bemisia argentifolii</i>				

Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του πληθυσμού των εντόμων σε όλη τη διάρκεια της καλλιεργείας. (BBCH 11-89)

Παρατηρήσεις:

1. Το Velifer OD είναι ένα εντομοκτόνο που περιέχει ζωντανά σπόρια. Για την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα του προϊόντος, η εφαρμογή του θα πρέπει να γίνεται υπό κατάλληλες συνθήκες για την επιβίωση και ανάπτυξη του μύκητα. Η θερμοκρασία πρέπει να είναι 22-28°C και να επικρατεί υψηλή υγρασία (>60% κατά την εφαρμογή και λίγες ώρες μετά). Συστήνεται οι εφαρμογές να γίνονται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα ή το βράδυ, ώστε να αποφευχθεί η έκθεση του προϊόντος στο άμεσο ηλιακό φως τις πρώτες ώρες μετά την εφαρμογή.
2. Για καλύτερα αποτελέσματα τουλάχιστον 3 εφαρμογές, ώστε τα έντομα να εκτεθούν επαρκώς στα σπόρια του μύκητα

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Όλες οι καλλιέργειες του σημείου 5 πιο πάνω	0 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: ---

- Δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ανθεκτικότητας στον μύκητα *Beauveria bassiana*. Το Velifer OD είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για προγράμματα διαχείρισης ανθεκτικότητας σε εντομοκτόνα, καθώς δεν έχει παρατηρηθεί διασταυρωτή ανθεκτικότητα με τα συμβατικά εντομοκτόνα.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του. Συστήνεται η δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρό αριθμό φυτών για να επιβεβαιωθεί η εκλεκτικότητά του στις συνθήκες εφαρμογής του, επιτρέποντας λίγο χρόνο για να φανούν πιθανά συμπτώματα

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

Περιέχει *Beauveria bassiana* strain PPRI 5339. Οι μικροοργανισμοί μπορεί να προκαλέσουν ευαισθησία. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που παρουσιάζουν ανοσοανεπάρκεια ή διατελούν υπό θεραπεία με ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες.
ΕΥΗ401 Για να αποφύγετε τους κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Φοράτε γάντια, ολόσωμη φόρμα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας για την αναπνοή κατά την ανάμειξη/φόρτωση και την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια.

P501 Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

- **Το σκεύασμα είναι επιβλαβές για τους επικονιαστές.** Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή επικονιαστών για τη χρήση του σκευάσματος σε συνδυασμό με τη χρήση επικονιαστών για να προσδιορίσετε την κατάλληλη περίοδο αναμονής μεταξύ της εφαρμογής του σκευάσματος και της εισαγωγής επικονιαστών στο θερμοκήπιο.

- **Το σκεύασμα μπορεί να είναι επιβλαβές για τους φυσικούς εχθρούς.** Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε φυσικούς εχθρούς, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή φυσικών εχθρών για τη χρήση του σκευάσματος σε συνδυασμό με τους φυσικούς εχθρούς

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά.

Σε περίπτωση κατάποσης: Πιείτε άφθονο νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για ένα (1) έτος, όταν αποθηκεύεται σε θερμοκρασία 25°C στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, καλά αεριζόμενο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.


ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι κενές συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 09/02/2024...


Ανδρούλα Γεωργίου
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας
Σφραγίδα