



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4588-P, ημερομηνίας 11/05/2023 για χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου σε φυτοπροστατευτικό προϊόν και
την αίτηση με αρ. 4700-P (Έντυπο 07) για ανανέωση άδειας παράλληλου εμπορίου φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

τροποποιείται η άδεια παράλληλου εμπορίου στο φυτοπροστατευτικό προϊόν LARENA SC με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

4016-P

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

31/01/2024

Ημερομηνία λήξης άδειας:

30/06/2027

2. Κάτοχος της άδειας:

L. Lambrou Agro Ltd

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

L. Lambrou Agro Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

L. Lambrou Agro Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

Larena SC

2. Μορφή:

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

fluopyram: 20% β/ο
tebuconazole: 20% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 62,93% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Bayer S.A.S., Division Crop Science, Γαλλία

5. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες	200κ.εκ. και 500κ.εκ.	Φιάλες HDPE/ Coex HDPE/EVOH

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

1. fluopyram
2. tebuconazole

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

1. 96% β/β min
2. 95% β/β min

3. Παρασκευαστής των δ.ο.:

fluopyram - Bayer AG, Leverkusen, Γερμανία
tebuconazole - Bayer AG, Leverkusen, Γερμανία

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Το μυκητοκτόνο Larena SC είναι μίγμα της νέας δραστικής ουσίας fluopyram και του tebuconazole. Εφαρμόζεται στις καλλιέργειες αμπέλι, μηλιά, αχλαδιά, ροδακινιά, νεκταρινιά, κερασιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά, φιστικιά, κρεμμύδι, φρέσκα κρεμμύδια, σκόρδο, πράσο, ασκαλώνια και βολβίνα.

Το fluopyram παρεμποδίζει τη μιτοχονδριακή αναπνοή μπλοκάροντας τη μεταφορά των ηλεκτρονίων στην αναπνευστική αλυσίδα του Succinate DeHydrogenase (σύμπλοκο II – παρεμποδιστής SDH). Το fluopyram δρά παρεμποδίζοντας τη βλάστηση και την ανάπτυξη των σπορίων καθώς και την ανάπτυξη του μυκηλίου.

Το tebuconazole είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs, (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρά παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors-DMIs).

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήρα μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόσεις			Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη	
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες)	Ωίδιο (<i>Uncinula necator</i>)	30 – 40	40 – 100	12 – 40	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 12 ημέρες
	Ωίδιο (<i>Podosphaera leucotricha</i>) Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i> <i>Venturia pyrina</i>) Στεμφύλιο (<i>Stemphylium vesicarium</i>) Αλτερνάρια (<i>Alternaria alternata</i> , <i>Alternaria spp.</i>)	40 – 50	50 - 150	20 – 75	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες Μία εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο ή εναλλακτικά 2 εφαρμογές από τα μέσα Αυγούστου έως το τέλος Οκτωβρίου όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο.
Μηλιά Αχλαδιά	Μετασυλλεκτικές σήψεις από: Αλτερνάρια (<i>Alternaria mali</i>) Βοτρύτη (<i>Botrytis cinerea</i>) Φαϊά σήψη (<i>Monilinia fructigena</i>)	50	150	75	Εφαρμογές από το στάδιο της ρόδινης κορυφής μέχρι την έναρξη της συγκομιδής (BBCH 57-87).
Κρεμμύδι Φρέσκα κρεμμύδια Σκόρδο Πράσο Ασκαλώνια Βολβίνα (σκορδοχορτο, <i>Allium fistulosum</i>)	Σκωρίαση (<i>Puccinia allii</i>) Στεμφύλιο (<i>Stemphylium sp.</i>)	--	30 – 80	60 – 100	Εφαρμογές από το στάδιο της διόγκωσης της βάσης των φύλλων μέχρι την έναρξη αποχρωματισμού του υπέργειου μέρους. Σε έντονη προσβολή να χρησιμοποιείται η υψηλή δόση 100 κ.εκ./δεκάριο.

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη		
Ροδακινιά Νεκταρινιά Βερικοκιά Κερασιά Δαμασκηνιά (Χρήση Ήσσονος Σημασίας)*	Φαιά σήψη (<i>Monilinia laxa</i> , <i>Monilinia fructigena</i> , <i>Monilia spp.</i>)	40 – 50	50 – 150	75	Εφαρμογές από το στάδιο της ρόδινης κορυφής μέχρι την έναρξη της συγκομιδής (BBCH 57-87). Η μέγιστη ποσότητα προϊόντος ανά καλλιεργητική περίοδο να μην ξεπερνάει τα 200 κ.εκ./δεκάριο.	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες Μία εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο ή εναλλακτικά 2 εφαρμογές από τα μέσα Αυγούστου έως το τέλος Οκτωβρίου στις καλλιέργειες που αυτό είναι εφαρμοσίμο
	Μετασυλλεκτικές σήψεις από: Βοτρύτη (<i>Botrytis cinerea</i>) Φαιά σήψη (<i>Monilinia fructigena</i> , <i>Monilinia spp.</i>) Σήψεις από <i>Rhizopus stolonifer</i> και <i>Mucor spp.</i>	50				
	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>) Σκωρίαση (<i>Tranzschelia pruni-spinosae</i> , <i>Tranzschelia discolor</i>)	37,5 – 50	50 – 100	50		
Φιστικιά (Χρήση Ήσσονος Σημασίας)*	Καμαροσπόριο (<i>Botryosphaeria dothidea</i>) Σεπτορίωση (<i>Septoria pistaciae</i>) Αλτερνάρια (<i>Alternaria alternata</i>)	40 – 50	50 – 150	20 – 75	Προληπτικός ψεκάσμος έως το τέλος της άνθησης (έως BBCH 69)	Μία εφαρμογή

* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της δαμασκηνιάς και της φιστικιάς από τη χρήση του σκευάσματος.
Για τις χρήσεις αυτές αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες), Μηλιά, Αχλαδιά, Πράσο	14 ημέρες
Κρεμμύδι, Φρέσκα κρεμμύδια, Σκόρδο, Ασκαλώνια, Βολβίνα (σκορδόχορτο, <i>Allium fistulosum</i>), Βερικοκιά	7 ημέρες
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά	3 ημέρες
Φιστικιά	35 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: fluopyram - 7
tebuconazole - 3**

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Οι εργάτες δεν πρέπει να εισέρχονται στις περιοχές που έχει γίνει εφαρμογή πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια.
Προκείμενου να ξεκινήσει η συγκομιδή, οι εργάτες πρέπει να εισέλθουν στην ψεκασμένη περιοχή τουλάχιστον 14 ημέρες μετά την εφαρμογή για το αμπέλι και τουλάχιστον 3 ημέρες μετά την εφαρμογή για τις δενδρώδεις καλλιέργειες.

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:


ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS07



GHS08



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας

- H319** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H361d Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH 208 Περιέχει 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης

- P102** Μακριά από παιδιά.
P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P202 Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
P260 Μην αναπνέετε εκνεφώματα.
P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
«Φορέστε κατάλληλα υποδήματα κατά την εφαρμογή»
«Οι εργάτες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια αν εισέλθουν στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή»
Sp1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Spe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:
- **20 μέτρων** για τα πυρηνόκαρπα και τα μηλοειδή ή 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων 50% μειωμένης διασποράς.
- **10 μέτρων** για το αμπέλι μόνο για εφαρμογές κατά την περίοδο του φθινοπώρου ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια 50% μειωμένης διασποράς.
- **10 μέτρων** για το κρεμμύδι, το σκόρδο και το πράσο.
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Γενικά: P308 + P311 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Μεταφέρετε και τοποθετείτε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι (εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400) και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό.
P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.
P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.
Πληροφορίες για το γιατρό:
Θεραπεία συμπτωματική.
Εάν καταποθεί σημαντική ποσότητα σκευάσματος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη γαστρική απόπλυση εντός των πρώτων 2 ωρών. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η χορήγηση ενεργού άνθρακα και θειικού Νατρίου. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, σε συνήθεις συνθήκες αποθήκευσης, στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία μέχρι 40 °C.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η άδεια παράλληλου εμπορίου χορηγείται στο προϊόν Larena SC που είναι αδειοδοτημένο στην Ελλάδα με εμπορικό όνομα Luna Experience και αριθμό έγκρισης 60612 και με κάτοχο άδειας την εταιρεία Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

Το προϊόν αναφοράς στην Κύπρο, βάσει του οποίου χορηγείται η σχετική άδεια, είναι το Luna Experience SC με αριθμό άδειας 3051.

Η εταιρεία L. Lambrou Agro Ltd, οφείλει να τηρεί αρχείο (Αρχείο Εισαγωγής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Παράλληλου Εμπορίου) με τις ποσότητες του σκευάσματος Larena SC που εισάγονται στην Κύπρο (θα περιλαμβάνει όλα τα παραστατικά στοιχεία των εισαγωγών ανά παρτίδα σκευάσματος).

Το αρχείο θα είναι άμεσα διαθέσιμο για έλεγχο από την αρμόδια Αρχή.

Για κάθε φορτίο του σκευάσματος Larena SC που εισάγεται στην Κύπρο θα πρέπει να χορηγείται η σχετική «Άδεια για Εισαγωγή Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος Παράλληλου Εμπορίου». Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η εισαγωγή του σκευάσματος στη χώρα.


Η ετικέτα του σκευάσματος θα φέρει ευανάγνωστα τη φράση **«ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»** με τα πλέον έντονα και μεγάλα γράμματα.

Η άδεια παράλληλου εμπορίου θα ανακληθεί:

- σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας του προϊόντος αυτού στην Ελλάδα για λόγους ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας.
- σε περίπτωση κακού χειρισμού της άδειας παράλληλου εμπορίου από την εταιρεία L. Lambrou Agro Ltd, με στόχο την εισαγωγή ή τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων άλλων από αυτά για τα οποία χορηγήθηκε η παρούσα άδεια.

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 28/02/2024



Σφραγίδα

(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας