



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4650 (Έντυπο 01), για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,
την επιστολή του αιτητή για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ελλάδα,

χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
..... **FERRONITE SLUG & SNAIL** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

4080

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

12/04/2024

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/12/2031

2. Κάτοχος της άδειας:

Doff Portland Limited

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

Ferronite Slug & Snail

2. Μορφή:

Ετοιμόχρηστο Κοκκώδες δόλωμα (RB)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Ferric Phosphate 1 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: 98,75 % β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Doff Portland Limited, Ηνωμένο Βασίλειο

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Doff Portland Limited, Ηνωμένο Βασίλειο

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

Doff Portland Limited, Ηνωμένο Βασίλειο

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Δοχείο με πώμα ασφαλείας για παιδιά και σύστημα δοσομέτρησης με το οποίο διασφαλίζεται ακρίβεια $\pm 10\%$	150 γρ. – 2 κιλών	HDPE (Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο) ή PP (Πολυπροπυλένιο)
2	Δοχείο με πώμα ασφαλείας για παιδιά και σύστημα δοσομέτρησης με το οποίο διασφαλίζεται ακρίβεια $\pm 10\%$ μέσα σε κουτί.	150 γρ. – 2 κιλών	PP / HDPE χάρτινο κουτί

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

Ferric Phosphate

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

80 % (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Doff Portland Limited, Ηνωμένο Βασίλειο

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Budenheim Ibérica S.L.U., Ισπανία

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Κοκκώδες κοχλιολειμακοκτόνο δόλωμα για την καταπολέμηση κοχλιών (σαλιγκαριών) και λειμάκων (γυμνοσαλιάγκων). Έχει ελκυστική δράση και δρα δια στομάχου. Μετά την κατάποση του προϊόντος, τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσαλιάγκες σταματάνε να τρέφονται και να εναποθέτουν εκκρίσεις στα φυτά.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες ερασιτέχνες χρήστες

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ομοιόμορφος διασκορπισμός σε όλη την επιφάνεια του αγρού, προσέχοντας να μην μένουν κόκκοι του σκευάσματος στο φύλλωμα των φυτών. Εφαρμόζεται με το χέρι, μόλις εμφανιστούν οι κοχλίες και οι λείμακες ή με τα πρώτα συμπτώματα στα φυτά, κατά προτίμηση νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, σε υγρό έδαφος μετά από βροχή ή πότισμα.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

--

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		γρ./110 m ²			
<p><u>Μαρούλια & σαλατικά</u> (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Μαρούλι - Ρόκα - Λυκοτρίβολο - Σκαρόλες / Πλατύφυλλα αντίδια - Ραδίκι - Σταμναγκάθι - Κάρδαμο - Γαιοκάρδαμο - Κόκκινο σινάπι - Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης) <p><u>Σπανάκι και παρεμφερή φύλλα</u> (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Σπανάκι - Ανδράκλα - Ξέσκουλα/φύλλα τεύτλων <p><u>Βότανα και βρώσιμα άνθη</u> (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Φραγκομαϊντανός - Σχοινόπρασο - Φύλλα σέλινου - Μαϊντανός - Φασκόμηλο - Δενδρολίβανο - Θυμαρί 	<p>Κοχλίες (Σαλιγκάρια)</p> <p>Γυμνοσάλιαγκες (Λειμακές, Αρίονες)</p>	38	<p>Προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά με τα πρώτα συμπτώματα στα φυτά.</p>	4 / 7 – 14 ημέρες	

<ul style="list-style-type: none"> - Βασιλικός - Δάφνη/ Δαφνόφυλλα - Δρακόντιο/ Εστραγκόν 				
<p>Καλλωπιστικά (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)</p>				
<p>Εσπεριδοειδή Ακρόδρυα Μηλοειδή Πυρηνόκαρπα</p>				
<p>Μούρα και μικροί καρποί (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Φράουλα - Βατόμουρα - Σμέουρα - Μύρτιλλα - Φραγκοστάφυλα - Αγριοτριανταφυλλιά - Μουριά - Κουφοξυλιά 	<p>Κοχλίες (Σαλιγκάρια)</p> <p>Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες)</p>	38	<p>Προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά με τα πρώτα συμπτώματα στα φυτά.</p>	4 / 7 – 14 ημέρες
<p>Αμπέλι</p>				
<p>Κουνουπίδι Λάχανο Βρυξελλών Λάχανο Λάχανο Κινέζικο (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)</p>				
<p>Παρατηρήσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Προτιμήστε τις προληπτικές εφαρμογές ή εφαρμόστε μόλις εμφανιστούν οι πρώτες ζημιές. 2. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των φυτών. 3. Επανάληψη εφαρμογής κάθε 2 εβδομάδες, εάν χρειαστεί ή μετά από ισχυρές βροχές ή όταν η ποσότητα σκευάσματος στο χωράφι έχει μειωθεί σημαντικά. Επανάληψη εφαρμογής όταν οι κόκκοι του σκευάσματος έχουν καταναλωθεί και οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για τα σαλιγκάρια ή τους γυμνοσάλιαγκες μέχρι το τέλος της καλλιέργειας. 4. Το σκεύασμα είναι ανθεκτικό στη βροχή για 14 ημέρες. Συστήνεται επανάληψη της εφαρμογής μετά από 7 ημέρες ύστερα από έντονες βροχοπτώσεις. 				

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Όλες οι καλλιέργειες	--

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- Κατά την εφαρμογή το προϊόν να μην έρχεται σε επαφή με τα εδώδιμα μέρη των φυτών που είναι έτοιμα προς κατανάλωση.
- Να μην έρχεται σε επαφή με τα καλλιεργούμενα φυτά.
- Διασκορπίστε το σκεύασμα ανάμεσα στα φυτά, διασφαλίζοντας ότι δεν θα μείνουν κόκκοι στο φύλλωμα
- Μην το εφαρμόζετε αντίθετα στον άνεμο.
- Εφαρμόστε το όταν η επιφάνεια των φύλλων είναι στεγνή.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

--

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

--

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην ψεκασμένη περιοχή παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τον ψεκασμό.

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται στις εγκεκριμένες καλλιέργειες στις συνιστώμενες δόσεις σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής. Η επαφή των κόκκων με ευαίσθητα φύλλα (π.χ. νεαρούς βλαστούς σε εαρινές καλλιέργειες, σε θερμοκήπια ή υπό κάλυψη) μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή τοπικές νεκρώσεις.

10. Συνδυαστικότητα:

Χρησιμοποιείται μόνο του

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

--

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό και μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα, εάν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν υπάρχει ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Σε περίπτωση αδιαθεσίας ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.


ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι συσκευασίες αφού καταστραφούν με τρύπημα ή σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης τους, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Z. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 12/04/2024.....



(Δρ Μάκης Αντωνιάδης)
Αν. Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα