



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 3996 (Έντυπο 08) για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **NIMROD 25 EC** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

168

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

21/07/2023

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/08/2025

2. Κάτοχος της άδειας:

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

Nimrod 25EC

2. Μορφή:

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

bupirimate: 25 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 71,25% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

ADAMA Makhteshim Ltd

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

ADAMA Makhteshim Ltd

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. ADAMA Makhteshim Ltd
2. MAGMA-AGRO AEBE

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Δοχεία	250 κ.εκ, 500 κ.εκ. & 1 λίτρου	Πλαστικό τύπου SELAR, COEX ή PET

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

Bupirimate

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

94.5 % (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

ADAMA Makhteshim Ltd

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

ADAMA Makhteshim Ltd

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση κατά του Ωϊδίου. Απορροφάται από τα φύλλα και έχει διελασματική δράση. Αναστέλλει την παραγωγή σπορίων.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμοί φυλλώματος με καλό λούσιμο των φυτών.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστήρα με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος, αναδεύοντας συγχρόνως το ψεκαστικό υγρό. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με καθαρό νερό τρεις (3) φορές.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόσεις			Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιερ. περίοδο / μεσοδιάστημα
		κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη	
Μηλιά	Ωίδιο	30 – 60	75 – 150	20 - 90	Εφαρμογές από πριν την άνθηση έως την ωρίμανση ⁽¹⁾ (BBCH 51 – 87) 4 / 10 ημέρες
Βερικοκιά Ροδακινιά Νεκταρινιά	Ωίδιο	60 – 100	75 – 100	45 - 100	Εφαρμογές μετά το τέλος της ανθοφορίας και της πλήρους πτώσης των πετάλων μέχρι την ωρίμανση. (BBCH 69 – 87) 3 / 10 ημέρες
Αμπέλι (επιτραπέζιο)	Ωίδιο	60 – 100	50 – 130	30 – 130	Εφαρμογές από το 5 ^ο φύλλο μέχρι την ωρίμανση. (BBCH 15 – 87) 3 / 10 ημέρες
Αμπέλι (οινοποιήσιμο)			20 - 80	10 - 80	
Φράουλα (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	Ωίδιο	--	50 – 100	100	Υ: 2 / 10-12 ημέρες Θ: 4 / 12 ημέρες

Βατόμουρο Φραγκοστάφυλο (κόκκινο & μαύρο) (Υπαίθρου)	Ωίδιο	--	50 - 100	100	Εφαρμογές από την εμφάνιση της ταξιανθίας (διαχωρισμός μούρων) μέχρι το σχηματισμό του 90% των καρπών. (BBCH 59 – 79)	2 / 12-14 ημέρες
						4 / 10-12 ημέρες
Τομάτα Μελιτζάνα (Υπαίθρου)	Ωίδιο	200 - 300	50 - 100	100	Εφαρμογές από το στάδιο του 3 ^{ου} πραγματικού φύλλου μέχρι την ωρίμανση. (BBCH 13 – 87)	1
				200		3 / 12 ημέρες
				100 – 150 ^(α)		3 / 12 ημέρες
Μελιτζάνα Πιπεριά (Θερμοκηπίου)	Ωίδιο	200 - 300	50 - 100	100 – 200 ^(β)	Εφαρμογές από το στάδιο του 3 ^{ου} πραγματικού φύλλου μέχρι την ωρίμανση. (BBCH 13 – 87)	3 / 12 ημέρες
				100 - 200		4 / 12 ημέρες
				150		4 / 10-12 ημέρες
Πιπεριά (Υπαίθρου)	Ωίδιο	150	50 – 100	200	Εφαρμογές από το στάδιο του 3 ^{ου} πραγματικού φύλλου μέχρι την ωρίμανση. (BBCH 13 – 87)	2 / 10-12 ημέρες
				75		4 / 10 ημέρες
Αγγούρι Κολοκυθάκι (Υπαίθρου)	Ωίδιο	150	50 – 100	150	Εφαρμογές από το στάδιο του 3 ^{ου} πραγματικού φύλλου μέχρι την ωρίμανση. (BBCH 13 – 87)	1
				Στάγδην άρδευση: 100 - 200		2 / 15 ημέρες
				75 - 150		3 / 12 ημέρες
Αγγούρι Κολοκυθάκι (Θερμοκηπίου)	Ωίδιο	150	50 – 100	Στάγδην άρδευση: 100 - 200	Εφαρμογές από το στάδιο του 3 ^{ου} πραγματικού φύλλου μέχρι την ωρίμανση. (BBCH 13 – 87)	2 / 15 ημέρες

Καρπούζι Πεπόνι Κολοκύθα (Υπαίθρου)	Ωίδιο	150	50 - 150	75	Εφαρμογές από το στάδιο του 3 ^{ου} πραγματικού φύλλου μέχρι την ωρίμανση. (BBCH 13 – 87)	3 / 10-12 ημέρες
				150		1
				Στάγδην άρδευση: 100 - 200		1
Καρπούζι Πεπόνι Κολοκύθα (Θερμοκηπίου)	Ωίδιο	200 - 300	50 - 70	75 - 150	Εφαρμογές από το στάδιο του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου μέχρι της πλήρους πτώσης των φύλλων. (BBCH 10 – 97)	3 / 12 ημέρες
				Στάγδην άρδευση: 100 - 200		1
Θάμνοι και μικρά διακοσμητικά δέντρα, Κωνοφόρα, Φυλλοβόλα, Φοίνικες, Χουρμαδιά (*) και Τριανταφυλλιά (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	Ωίδιο	200 - 300	50 - 70	100 - 150	Εφαρμογές από το στάδιο του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου μέχρι της πλήρους πτώσης των φύλλων. (BBCH 10 – 97)	Υ: 1 Θ: 2 / 10 ημέρες
Παρατηρήσεις:						
(1) Μπορεί να συμβεί μικρή πτώση φύλλων στις ποικιλίες "Cox", "Jonathan", "Imperatore" και "Reineta".						
(α) Χειροκίνητη εφαρμογή ψεκασμού με ψεκαστήρα/πιστόλι ψεκασμού και ψεκαστήρα πλάτης						
(β) Εφαρμογή μέσω τροχήλατου ψεκαστικού						
(*) Αποκλειστικά για διακοσμητική χρήση, ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.						
<ul style="list-style-type: none"> • Για όλες τις εγκεκριμένες χρήσεις στην ύπαιθρο, συνήθως εφαρμόζεται ψεκασμός με τρακτέρ. • Για όλες τις εγκεκριμένες χρήσεις στο θερμοκήπιο, εφαρμόζεται χειροκίνητος ψεκασμός με ψεκαστήρα/πιστόλι ψεκασμού και ψεκαστήρα 						

πλάτης σε ύψος κάτω του 1m. ή αλλιώς με τροχήλατο.

- Η εφαρμογή μέσω στάγδην άρδευσης είναι εξ' ολοκλήρου εγκεκριμένη για τα κολοκυνθοειδή (βρώσιμος φλοιός ή μη βρώσιμος φλοιός) στην ύπαιθρο ή στο θερμοκήπιο.
- Εφαρμόστε μόλις θα εμφανιστούν οι πρώτες προσβολές.
- Στην ετικέτα δίνονται οι απαραίτητες οδηγίες για σωστή χρήση του προϊόντος και οι ενδείξεις για τους κινδύνους που μπορούν να προέρχονται από την λάθος εφαρμογή, καθώς η σχετική πληροφωρία ποικίλει πάνω στο ότι δεν υπάρχουν αρκετές εγγυήσεις ανεκτικότητας.
- **Μείωση κινδύνου κατά τον χειρισμό:**

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΥΠΑΙΘΡΟΣ:

- **ΑΝΑΜΕΙΞΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:**

Για όλες τις χρήσεις και μεθόδους εφαρμογής ρούχα εργασίας και γάντια χημικής προστασίας.

- **ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΣΩ ΤΡΑΚΤΕΡ:**

Ρούχα εργασίας

Για τις χρήσεις σε αμπέλι, διακοσμητικά φυτά και τριαντάφυλλα, χρησιμοποιείστε ακροφύσιο μείωσης της ποσότητας κατά 50%.

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ:

- **ΑΝΑΜΕΙΞΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:**

Για όλες τις χρήσεις και μεθόδους εφαρμογής ρούχα εργασίας και γαντιών χημικής προστασίας.

- **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 1m):**

Ρούχα εργασίας

Γάντια χημικής προστασίας

- **ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ:**

Ρούχα εργασίας

Γάντια χημικής προστασίας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ

Ψεκασμός στην ύπαιθρο:

Ρούχα εργασίας

Βατόμουρο, φραγκοστάφυλο, φράουλα, θάμνοι και μικρά διακοσμητικά δέντρα, κωνοφόρα, φυλλοβόλα, φοίνικας, χουρμαδιά, τριανταφυλλιά, μελιτζάνα,

πιπεριά και κολοκυνθοειδή: χρησιμοποιείτε ακόμα γάντια χημικής προστασίας (για τον έλεγχο σε συνθήκες καλλιέργειας ή μολυσμένες επιφάνειες για επανείσοδο για εργασίες).

Ψεκασμοί στο θερμοκήπιο:

Ρούχα εργασίας και γάντια χημικής προστασίας

Χρήσεις άρδευσης στάγδην στην ύπαιθρο ή στο θερμοκήπιο:

Εναρμονισμένο με την οδηγία UNE-EN ISO 20347:2013

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

- Ρούχα εργασίας: μακριά μανίκια, μακρύ παντελόνι και κατάλληλα υποδήματα.
- Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος, ο χειριστής να αποφεύγει την επαφή με το υγρό φύλλωμα.
- Μην μπειτε στην καλλιέργεια μέχρι να στεγνώσει το προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε περίπτωση που θα πραγματοποιήσετε μηχανικές εργασίες που μπορεί να καταστρέψουν τα γάντια χημικής προστασίας.
- Ο διαχειριστής δεν χρησιμοποιεί την εγκατάσταση του συστήματος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Συστήνεται να ελέγχεται η εγκατάσταση του συστήματος άρδευσης πριν αρχίσει η εφαρμογή του προϊόντος.
- Ο τροχήλατος ψεκασμός των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με προώθηση αντίθετα στο νέφος ψεκασμού, εφοδιασμένο με δυο κάθετες ράβδους ψεκασμού, εξοπλισμένες η κάθε μια με 4 επίπεδα ακροφύσια ανεμιστήρα με στήριγμα ακροφυσίων με λειτουργία στάλαξης. Επίσης πρέπει να έχει ένα μανόμετρο να ελέγχει την πίεση λειτουργίας όπου συνίσταται να είναι μεταξύ 10-15 bars. Η απόσταση μεταξύ των ραβδών και του χερουλιού πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 m.

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Αμπέλι (επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο)	15 ημέρες
Βερικοκιά, Μηλιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά	14 ημέρες
Βατόμουρο, Φραγκοστάφυλο	7 ημέρες
Μελιτζάνα, Φράουλα, Πιπεριά, Τομάτα	3 ημέρες
Κολοκυθάκι, Κολοκύθα, Πεπόνι, Αγγούρι, Καρπούζι	1 ημέρα
Θάμνοι και μικρά διακοσμητικά δέντρα, Κωνοφόρα, Φυλλοβόλα, Φοίνικες, Χουρμαδιά, Τριανταφυλλιά	Δεν ορίζεται

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 8

Για διαχείριση φαινομένων ανθεκτικότητας οι επεμβάσεις με το σκεύασμα πρέπει να γίνονται σε έναλλαγή με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις αμινοπυριμιδίνες

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Καλλιέργειες Υπαίθρου:

- Αμπέλι (επιτραπέζιο): 4 ημέρες
- Τομάτα: 3 ημέρες
- Αμπέλι (οινοποιήσιμο): 2 ημέρες
- Μηλιά, βατόμουρο, φραγκοστάφυλο, βερικοκιά, ροδακινιά, νεκταρινιά: 5 ημέρες
- Θάμνοι και μικρά διακοσμητικά δέντρα, κωνοφόρα, φυλλοβόλα, φοίνικες, χουρμαδιά, τριανταφυλλιά: 6 ημέρες
- Μελιτζάνα, πιπεριά: 1 ημέρα

Καλλιέργειες Θερμοκηπίου:

- Φράουλα: 2 ημέρες
- Τομάτα: 1 ημέρα
- Μελιτζάνα, πιπεριά: 3 ημέρες
- Θάμνοι και μικρά διακοσμητικά δέντρα, κωνοφόρα, φυλλοβόλα, φοίνικες, χουρμαδιά, τριανταφυλλιά: 11 ημέρες

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα.

10. Συνδυαστικότητα:

Το σκεύασμα δεν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα.

11. Εικονογράμματα κινδύνου:



12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H226 Εύφλεκτο υγρό
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H315 Προκαλεί ερεθισμό δέρματος.
H317 Μπορεί να προκαλέσει μια αλλεργική αντίδραση στο δέρμα.
H318 Προκαλεί σοβαρές οφθαλμικές βλάβες.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
ΕΥΗ 401 «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

- P201+P202** Ζητήστε ειδικές οδηγίες πριν από την χρήση και μην χειρίζεστε την ουσία πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες ασφάλειας.
- P210** Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
- P261** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.
- P273** Αποφύγετε την απελευθέρωση του στο περιβάλλον.
- P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο.
- P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
- P501** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- SP1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
- Spe3** Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών, αφήστε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας μέχρι τα σώματα των επιφανειακών υδάτων:
- 10 μέτρα με φυτική κάλυψη για ντομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, κολοκυθάκι, αγγούρι, μήλο, βερίκοκο, ροδάκινο, νεκταρίνι, βατόμουρα και φραγκοστάφυλο.
 - 5 μέτρα για πεπόνι, καρπούζι, κολοκύθα, θάμνους και μικρά διακοσμητικά δέντρα, κωνοφόρα, φυλλώδη, φοίνικες, χουρμάδες, τριανταφυλλίες, αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο) και φράουλες.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό (ή στο ντους).

P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το άτομο στην ύπαιθρο και κρατήστε το σε μια θέση που τον διευκολύνει η αναπνοή.

P305 + P351 + P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή με τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα ή σχίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

1. Η τιμολόγηση του σκευάσματος με την παλιά ετικέτα επιτρέπεται μέχρι 21/08/2023.
2. Η τελική διάθεση, αποθήκευση και χρήση από τους γεωργούς του σκευάσματος, με την παλιά ετικέτα επιτρέπεται μέχρι 21/01/2024.
3. Όσο αφορά τις ποσότητες του σκευάσματος που ήδη υπάρχουν στα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά τις 21/01/2024, ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο, για να ενημερώσει για την νέα άδεια τα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων που έχουν ήδη προμηθευτεί το σκεύασμα. Νοείται ότι, όσα ΦΠ παρασκευάστηκαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας υπογραφής της νέας άδειας θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νέα άδεια.
4. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021

Ημερομηνία: 21/07/2023.....



.....
(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας