



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4497 (Έντυπο 01), για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,
την επιστολή του αιτητή για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Γαλλία και
την αίτηση με αρ. 687 (Έντυπο 09) για τροποποίηση άδειας ΦΠ σε σχέση με τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος και
την αίτηση με αρ. 4518 (Έντυπο 08) για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **ΚΑΤΟΥΝ GOLD** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3935

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

11/08/2023

Ημερομηνία λήξης άδειας:

15/12/2025

2. Κάτοχος της άδειας:

Belchim Crop Protection NV/SA

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Advartia Cyprus Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

1. L. Lambrou Agro Ltd
2. Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

Katoun Gold

2. Μορφή:

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Pelargonic acid: 50 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 45,35% (β/β)

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Belchim Crop Protection NV/SA

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

1. Nantong Shenyu Green Medicine CO., Ltd. Κίνα
2. DIACHEM S.p.A. Ιταλία
3. Cheminova Deutschland Gmbh & Co. KG, Γερμανία
4. IRIS, Γαλλία
5. Torre Srl, Ιταλία

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. Nantong Shenyu Green Medicine CO., Ltd. Κίνα
2. DIACHEM S.p.A. Ιταλία
3. Cheminova Deutschland Gmbh & Co. KG, Γερμανία
4. IRIS, Γαλλία
5. Torre Srl, Ιταλία

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες ή Δοχεία	1Λ έως 10Λ	Fluorinated-HDPE

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

Pelargonic acid or Nonanoic acid

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

95% β/β min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Belchim Crop Protection NV/SA

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

1. Nantong Shenyu Green Medicine Co., Ltd, Κίνα
2. Matrica S. p. a., Ιταλία

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση νεαρών ζιζανίων. Περιέχει τη δραστική ουσία πελαργονικό οξύ το οποίο είναι 100% φυτικής προέλευσης. Δρα με αποξήρανση, διαταράσσοντας τη διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης των φυτών και τα αποτελέσματα είναι ορατά πολύ γρήγορα.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Εφαρμόζεται με κατευθυνόμενο ψεκασμό στο φύλλωμα των ζιζανίων, που πρέπει να είναι στεγνό πριν τον ψεκασμό, με πίεση ψεκαστικού 2 - 2,5 bar.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Ανακινείστε καλά το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και ξεκινήστε την ανάδευση. Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση καθ' όλη την διάρκεια της εφαρμογής. Να ψεκάζεται αμέσως μετά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	Λίτρα σκ./δεκ. μέγιστη		
Διαπερατές επιφάνειες που επικαλύπτουν το έδαφος Σκληρές επιφάνειες. Γύρω από θάμνους και δέντρα Καλλωπιστικά Ερασιτεχνικοί κήποι Φυτόρια	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	30 – 75	2,25	Ομοίμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων όταν βρίσκονται σε γρήγορη ανάπτυξη (λιγότερο από 10 εκ. ύψος) και επανάληψη ψεκασμού, εάν χρειαστεί.	4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημερών
	Βρύα		1,8	Ομοίμορφος ψεκασμός των βρύων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημερών

Παρατηρήσεις:

- Όπως χώροι με αμμοχάλικο, μονοπάτια, οδοστρώματα, γύρω από τριαντάφυλλα, καλλωπιστικά φυτά, δέντρα, θάμνους και φράκτες, γύρω από υπόστεγα και θερμοκήπια, κατά μήκος φραχτών.
- Εφαρμόστε κατά προτίμηση το πρωί, σε μέρες με καλή φωτεινότητα.
- Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται σε ελάχιστες θερμοκρασίες 15°C, σε καιρικές συνθήκες που διευκολύνουν την ανάπτυξη. Να γίνεται πλήρης και ομοίμορφη διαβροχή των φυτών.
- Το Katoun Gold καταστρέφει όλα τα πράσινα μέρη των φυτών. Μην το εφαρμόζετε σε φυτά που δεν είναι στόχοι, συμπεριλαμβανομένου του χλοοτάπητα.
- Μην το εφαρμόζετε σε υγρά φυτά ή εάν αναμένεται βροχή 2 ώρες μετά την εφαρμογή.
- Καταπολεμούμενα ζιζάνια:
Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*), Βλήτο καλλιεργούμενο (*Amaranthus hybridus*)
Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*), Σετάρια (*Setaria viridis*)
Τραχεία λειβαδοπία (*Poa trivialis*), Αγριοράδιο (*Taraxacum officinale*)
Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Βερόνικα (*Veronica persica*)
Γεράνι (*Geranium pusillum*, *Geranium rotundifolium*)
Κίρσιο (*Cirsium arvense*), Λάμιο (*Lamium* sp.)
Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Μικρή τσουκνίδα (*Urtica urens*)
Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Πάνικο (*Panicum dichotomiflorum*)
Πολικόμπι (*Polygonum aviculare*), Πολυετής ζωχός (*Sonchus arvensis*)
Στελλάρια (*Stellaria media*), Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexu*)
Χαμομήλι (*Matricaria chamomilla*)

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
M .E	

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 0

Ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας είναι χαμηλός. Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Να αποφύγετε τον ψεκασμό σε φύλλα γειτονικών φυτών διότι υπάρχει κίνδυνος ζημιάς.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια.

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS07

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P102 Μακριά από παιδιά.

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.

P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1 Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

SPe4 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να μην χρησιμοποιείται σε αδιαπέραστες επιφάνειες όπως άσφαλο, σκυρόδεμα, λιθόστρωτα [σιδηροτροχιές] και άλλες επιφάνειες με υψηλό κίνδυνο απορροής

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P305+P351+P338: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση κατάποσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο σε θερμοκρασίες πάνω από 0°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες/δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 11/08/2023.....



(Μάκης Αντωνιάδης)
για Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα