



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. 4150-P (Έντυπο 07) για ανανέωση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος παράλληλου εμπορίου

τροποποιείται η άδεια παράλληλου εμπορίου του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **STROBY WG** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3508-P

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

31/12/2021

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/12/2025

2. Κάτοχος της άδειας:

A.D. Georoniki Ltd

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

A.D. Georoniki Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

A.D. Georoniki Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

2. Μορφή:

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

5. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	20γρ., ,30γρ., 40γρ., 50γρ., 60γρ., 75γρ., 100γρ., 150γρ., 200γρ., 250γρ., 300γρ., 500γρ., 600γρ.,1000γρ.	Polyethylene (PE)
2	Σακίδια		Χαρτοσακούλα με επένδυση PE (PA/PE)

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Μη διασυστηματικό μυκητοκτόνο, με προληπτική ή/και θεραπευτική δράση, καθώς και αξιόλογη διάρκεια δράσης (περίπου 15 ημέρες). Δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου καθώς και την παραγωγή σπορίων. Εμφανίζει διελασματική και τοπικά διεισδυτική δράση και η αποτελεσματικότητά του δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη βροχόπτωση, δύο ώρες μετά την εφαρμογή του.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Διαλύουμε το σκεύασμα σε λίγο νερό. Στη συνέχεια αδειάζουμε το μίγμα στο μισογεμισμένο με νερό βυτίο με συνεχή ανάδευση και απογεμίζουμε το βυτίο με νερό.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα με νερό, αδειάζοντας πλήρως όλα τα εξαρτήματα από το ψεκαστικό υγρό και ξεπλένοντας όλα τα εξαρτήματα 2-3 φορές, έως ότου ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος έχουν απομακρυνθεί.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	γρ./δεκ. μέγιστη		
Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο)	Ωίδιο (<i>Uncinula necator</i>) Μαύρη Σήψη (<i>Guignardia bidwellii</i>)	--	20 – 100	20	Προληπτικοί ψεκασμοί, ξεκινώντας πριν από την άνθηση	3 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα 12-14 ημερών
Μηλιά Κυδωνιά	Ωίδιο (<i>Podospaera leucotricha</i>) Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i>)	--	20 – 120	20	Ψεκασμοί από το στάδιο της έκπτυξης των οφθαλμών έως την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών	3 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα 12-14 ημερών
Αχλαδιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia pirina</i>) Στεμφύλιο (<i>Stemphylium versicarium</i>)	--	20 – 120	20	Ψεκασμοί από το στάδιο της έκπτυξης των οφθαλμών έως την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών	3 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα 12-14 ημερών
Ελιά (Βρώσιμη και ελαιοποιήσιμη)	Κυκλοκόνιο (<i>Spilocaea oleagina</i>)	40 – 100	50 – 100	12 – 20	Ψεκασμοί μέχρι την πλήρη ανάπτυξη των καρπών (BBCH 00-79)	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 – 60 ημέρες
Τομάτα Πιπεριά Μελιτζάνα (Θερμοκηπίου)	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i>)	--	40 – 100	50	Ψεκασμοί από την έκπτυξη του δεύτερου πραγματικού φύλλου έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH 12-89)	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 15 ημέρες
Φράουλα (Θερμοκηπίου)	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca acularis</i>)	--	40 – 100	30	Ψεκασμοί από την έκπτυξη του πρώτου πραγματικού φύλλου έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH 11-89)	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 15 ημέρες

Παρατηρήσεις:

- Εφόσον υπάρχει σύστημα αγροτικών προειδοποιήσεων, να ακολουθούνται οι γενικές συστάσεις.
- * Η δεύτερη εφαρμογή εναντίον του κυκλοκόνιου στην ελιά μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον ο συνολικός αριθμός εφαρμογών για την καταπολέμηση του κυκλοκόνιου ανά καλλιεργητική περίοδο είναι τουλάχιστο 4.

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Αμπέλι	42 ημέρες
Μηλιά, Κυδωνιά, Αχλαδιά	28 ημέρες
Ελιά	30 ημέρες
Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα Φράουλα (Θερμοκηπίου)	3 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 11

Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης ανθεκτικότητας στα παθογόνα στόχους σε μηλοειδή και αμπέλι συνιστώνται προληπτικές επεμβάσεις συνεχόμενες (μέχρι 3) ή απλές (σε εναλλαγή ή σε μίγμα με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε ομάδες διαφορετικές των στρομπιλουρινών (π.χ azoxystrobin) ή οξαζολιδινιδίωνων (π.χ famoxadone) και δεν εμφανίζουν διασταύρωτη ανθεκτικότητα με αυτές).

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή, πριν το ψεκαστικό διάλυμα στα φύλλα της καλλιέργειας στεγνώσει εντελώς. Για να εισέλθετε μετά από την εφαρμογή φορέστε προστατευτική ενδυμασία και νάντια.

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας.

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS09



GHS08

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

- P102** Μακριά από παιδιά.
- P201** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- P202** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
- P270** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- P281** Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.
- P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο
- EUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Γενικές πληροφορίες: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε ψεκαστικό υγρό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο, την ετικέτα και/ή το φύλλο ορθού χειρισμού στον γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατείστε τον παθόντα ήρεμο και μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν αναπτυχθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά κάτω από τρεχούμενο νερό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε αρκετό νερό. Ζητήστε ιατρική φροντίδα. Μην προκαλείτε εμετό εκτός αν σας δοθεί τέτοια εντολή από κέντρο δηλητηριάσεων ή γιατρό. Ποτέ μην προκαλείτε εμετό και μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα εάν το θύμα δεν έχει τις αισθήσεις του ή εάν έχει σπασμούς.

Γιατροί: Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία (απομόλυνση, ζωτικές λειτουργίες). Δεν είναι γνωστό συγκεκριμένο αντίδοτο.

Τηλ. Πρώτων Βοηθειών: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια, αν αποθηκευθεί στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακίδια, σάκοι) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

Z. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η άδεια παράλληλου εμπορίου χορηγείται στο προϊόν Stroby WG που είναι εγκεκριμένο στην Ολλανδία με εμπορικό όνομα Stroby WG και αριθμό έγκρισης 11818N και με κάτοχο άδειας την εταιρεία Basf Nederland B.V.

Το προϊόν αναφοράς στην Κύπρο βάση του οποίου χορηγείται η σχετική άδεια είναι το Stroby 50WG με αριθμό άδειας 2314.

Η εταιρεία A.D. Georoniki Ltd, οφείλει να τηρά αρχείο (Αρχείο Εισαγωγής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Παράλληλου Εμπορίου) με τις ποσότητες του σκευάσματος Stroby WG που εισάγονται στην Κύπρο (θα περιλαμβάνει όλα τα παραστατικά στοιχεία των εισαγωγών ανά παρτίδα σκευάσματος).

Το αρχείο θα είναι άμεσα διαθέσιμο για έλεγχο από την αρμόδια Αρχή.

Για κάθε φορτίο του σκευάσματος Stroby WG που εισάγεται στην Κύπρο θα πρέπει να χορηγείται η σχετική «Άδεια για Εισαγωγή Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος Παράλληλου Εμπορίου». Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η εισαγωγή του σκευάσματος στη χώρα.

Η ετικέτα του σκευάσματος θα φέρει ευανάγνωστα τη φράση «**ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**» με τα πλέον έντονα και μεγάλα γράμματα.

Η άδεια παράλληλου εμπορίου θα ανακληθεί:

- σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας του προϊόντος αυτού στην Ολλανδία για λόγους ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας.
- σε περίπτωση κακού χειρισμού της άδειας παράλληλου εμπορίου από την εταιρεία A.D. Georoniki Ltd, με στόχο την εισαγωγή ή τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων άλλων από αυτά για τα οποία χορηγήθηκε η παρούσα άδεια.

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία:04/02/2022.....

.....
(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα