



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 224 (Έντυπο 12), ημερομηνίας 25/05/2020 για την τροποποίηση υφιστάμενης άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος μετά την έγκριση όλων των δραστικών ουσιών που περιέχονται στο προϊόν και

την επιστολή του αιτητή για τροποποίηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της οριστικής άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ολλανδία,

χορηγείται οριστική άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **FUNGAFLOR 500EC** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

2946

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

27/05/2020

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/12/2025

2. Κάτοχος της άδειας:

Janssen PMP
a division of JANSSEN PHARMACEUTINA N.V.

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

FFH Farmer's Fresh & Healthy Products Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

FFH Farmer's Fresh & Healthy Products Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Fungaflor 500EC

2. Μορφή: Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: imazalil: 50% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 53,3 % β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: Janssen PMP
a division of JANSSEN PHARMACEUTINA N.V

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Kwizda Agro GmbH

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Kwizda Agro GmbH

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες	1Λ	Αλουμίνιο

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: imazalil

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 950 g/kg min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: JANSSEN PMP
a division of JANSSEN PHARMACEUTINA N.V.

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Shaanxi Hanjiang Pharmaceutical Group Co. Ltd

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα ιμιδαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση για εφαρμογή μετασυλλεκτικά σε καρπούς εσπεριδοειδών. Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στο στάδιο της απομεθυλίωσης του C-14.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

1. Με νερό: ψεκασμός χαμηλού όγκου στη γραμμή συσκευασίας.

2. Με κερι: εφαρμογή με ειδικό κηρωτικό μηχάνημα στη γραμμή συσκευασίας

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Σε ένα δοχείο που περιέχει 5-10 λίτρα νερού προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα Fungaflo 500 EC με συνεχή ανάδευση.

Τρόπος παρασκευής του μίγματος με κερι υδροδιαλυτής βάσης:

Σε ένα δοχείο αναμείξτε 1 μέρος Fungaflo 500 EC με 5 μέρη νερού με ανάδευση μέχρι να γίνει ομοιόμορφο γαλάκτωμα. Στη συνέχεια, το γαλάκτωμα αυτό προστίθεται στο κερι και αναδεύεται, με συνεχή λειτουργία του συστήματος ανάμειξης, για 15 λεπτά, σε 1500 στροφές/λεπτό. Το τελικό μίγμα εφαρμόζεται με ειδικό κηρωτικό μηχάνημα.

Καθαρισμός του εξοπλισμού:

Καθαρίστε την συσκευή εφαρμογής και όλο τον εξοπλισμό με καθαρό νερό και απορρυπαντικό.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών
Καρποί εσπεριδοειδών [πορτοκάλια, λεμόνια, γκρέϊπ-φρουτ, μανταρίνια- συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και παρόμοια υβρίδια, λιμμετίες (limes), φράπες]	Μετασυλλεκτικές σήψεις καρπών από πενικίλλια (<i>Penicillium italicum</i> <i>P. digitatum</i>, <i>Diplodia sp.</i>, <i>Phomopsis sp.</i>)	300 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό (1500 γρ. δ.ο. / TN νερού)	Ψεκασμός χαμηλού όγκου στη γραμμή συσκευασίας	1` εφαρμογή
		400 κ.εκ./ 100 λίτρα κεριού (2000 γρ. δ.ο. / TN κεριού)	Εφαρμογή με κηρωτικό μηχάνημα στη γραμμή συσκευασίας	

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Καρποί εσπεριδοειδών	1 ημέρα

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: - imazalil: 3

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας:

- Αποφεύγετε την αποκλειστική επαναλαμβανόμενη χρήση του μυκητοκτόνου.
- Συνίσταται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης, που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με το imazalil .
- Τηρείτε αυστηρά μέτρα υγιεινής στο χώρο αποθήκευσης και στις συσκευασίες των καρπών ώστε να μειωθεί η πιθανότητα μόλυνσης.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:



12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

- H302** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής
H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

- P201** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις/αέρια.
P264 Πλυθείτε καλά μετά το χειρισμό
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση.
«Οι εργάτες που θα χειριστούν τα φρούτα μετά την εφαρμογή θα πρέπει να φοράνε προστατευτικά γάντια.»
Sp1 Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό.

P308+P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευτείτε /επισκεφτείτε γιατρό.

P305+P351+P338+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό.

P304 + P340 + P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε έμετο εκτός εάν είναι οδηγία του γιατρού. Μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα αν ο ασθενής είναι αναισθητός ή έχει σπασμούς.

P302+P352: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Διατηρείται στην αρχική καλά κλεισμένη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από θερμότητα και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 3 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκάστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

1. Η τιμολόγηση και χρήση του σκευασμάτος, από τον κάτοχο της άδειας ή τον υπεύθυνο για τη διάθεση του σκευάσματος στην αγορά, με την παλιά ετικέτα, δεν επιτρέπεται.

2. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί στα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων, ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο, για να ενημερώσει για την παρούσα άδεια τα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων που έχουν ήδη προμηθευτεί το σκεύασμα.

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία:27/05/2020.....

.....
(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα