



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011  
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4250 (Έντυπο 01), ημερομηνίας 25/10/2019 για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος και

την επιστολή του αιτητή με ημ. 04/10/2019 για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Γαλλία και

την αίτηση με αρ. 3920 (Έντυπο 08), για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **FIXOR 100SL** με τα ακόλουθα στοιχεία:

**A) Γενικά στοιχεία άδειας**

1. Αριθμός Άδειας:

3694

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

21/04/2021

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/12/2024

2. Κάτοχος της άδειας:

Certiplant B.V

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

L. Lambrou Agro Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

L. Lambrou Agro Ltd

## Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Fixor 100SL

2. Μορφή: Πυκνό διάλυμα (SL)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: 1-NAA: 100 g/L  
Βοηθητικές ουσίες: 90,14 % β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: Certiplant NV

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Chimac S.A.

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: 1. ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε.  
2. Chimac S.A.

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη	50 κ. εκ. έως 1 λίτρο	PE/PA

## Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: 1-Naphthylacetic acid (1-NAA)

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 98% β/βmin

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: Amvac Netherlands B.V

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Sabari Chemicals Private Ltd

## Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Ρυθμιστής ανάπτυξης των φυτών, για την πρόληψη και τον περιορισμό της καρπόπτωσης σε μηλιές και αχλαδιές, καθώς για το αραίωμα των καρπών σε μηλιές

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός είναι καθαρός. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. Εάν είναι εφικτό, να διατηρηθεί η ανάδευση καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τον εξοπλισμό ψεκασμού λεπτομερώς. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ δεκ.)	κ.εκ σκ./δεκ. μέγιστη		
Μηλιά	Περιορισμός καρπόπτωσης	100	15	15	Η πρώτη εφαρμογή πρέπει να γίνει 14 ημέρες και η δεύτερη τουλάχιστον 7 ημέρες πριν τη συγκομιδή (BBCH 79-87: όταν οι καρποί φτάσουν το 90% του τελικού τους μεγέθους έως το στάδιο της ωρίμανσης κατάλληλο για συγκομιδή).	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες
	Αραιώμα καρπών				Όταν οι καρποί έχουν μέγεθος μεταξύ 8-12 mm (BBCH 71)	1 εφαρμογή
Αχλάδια	Περιορισμός καρπόπτωσης				Η πρώτη εφαρμογή πρέπει να γίνει 14 ημέρες και η δεύτερη τουλάχιστον 7 ημέρες πριν τη συγκομιδή (BBCH 79-87: όταν οι καρποί φτάσουν το 90% του τελικού τους μεγέθους έως το στάδιο της ωρίμανσης κατάλληλο για συγκομιδή).	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**  
 -Προσαρμόστε τον όγκο του ψεκαστικού υγρού ανάλογα με το μέγεθος του δέντρου ώστε να υπάρχει πλήρη επικάλυψη καρπών και φύλλων.  
 -Μην ψεκάζετε όταν φυσάει .

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Μηλιά για αραίωμα καρπών	Μ.Ε (καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής)
Μηλιά, Αχλαδιά για περιορισμό καρπόπτωσης	7 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Για το αραίωμα** η μέγιστη αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται με εφαρμογές όταν οι καρποί έχουν διάμετρο 8-12 mm, που αντιστοιχεί σε περίοδο 10-25 ημερών μετά την ανθοφορία ανάλογα με τις ποικιλίες και τις τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Συνιστάται οι εφαρμογές να πραγματοποιούνται κατά τις δροσερές ώρες της ημέρας κατά προτίμηση το βράδυ (σε θερμοκρασίες μεταξύ 15°C και 25°C). Υψηλές θερμοκρασίες είναι καλό να αποφεύγονται. Επιθυμητή υγρασία: 80-95%.

**Για τον περιορισμό της καρπόπτωσης** συνιστάται η εφαρμογή να πραγματοποιείται σε ξηρή καλλιέργεια, το απόγευμα μιας ζεστής μέρας όταν δεν αναμένεται άμεσα βροχή.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

----

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

---

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Η πρόσβαση επιτρέπεται αφού στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που αναφέρονται στο φάσμα δράσης και για τις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής

10. Συνδυαστικότητα:

---

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GHS05



GHS08

## 12. Δηλώσεις επικινδυνότητας:

- H314** Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
- H318** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- H361d** Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
- H412** Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
- EUH401** Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

## 13. Δηλώσεις προφύλαξης:

- P405 + P102** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
- P201** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- P260** Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.
- P270** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
- P501** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.  
*Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γυαλιά και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.*  
*Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, να φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο.*
- SP1** Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.]
- SPe8** **Επικίνδυνο για τις μέλισσες.** Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία.

## 14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

- P303+P361+P353+P310:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό.
- P305+P351+P338+P310:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό.
- P308+P313:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
- Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία
- Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401**

**Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:**

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο

**ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στη δεξαμενή) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

**Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:**

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία: .....21/04/2021.....

Σφραγίδα

.....  
(Μάκης Αντωνιάδης)  
για Διευθύντρια  
Τμήματος Γεωργίας