



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 3712, ημερομηνίας 30/11/2015 για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,
την επιστολή του αιτητή με ημ. 17/11/2015 για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Γαλλία,
την αίτηση με αρ. 3457 (Έντυπο 8) για παράταση της άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,
την αίτηση με αρ. 461 (Έντυπο 09) για τροποποίηση της άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε σχέση με την εμπορική ονομασία του κατόχου άδειας και
τις αιτήσεις με αρ. 3850 και 4309 (Έντυπο 8) για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **GLOMATE** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3187

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

12/09/2022

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/10/2024

2. Κάτοχος της άδειας:

ALBAUGH TKI d.o.o.

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Agrolan Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Agrolan Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Clomate

2. Μορφή: Μικροκάψουλες σε αιώρημα (CS)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: Clomazone: 36% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 69,75% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: Albaugh Europe Sàrl

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: ALBAUGH TKI d.o.o.

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: ALBAUGH TKI d.o.o.

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες	30, 50, 60, 75, 100, 150, 200, 300, 350, 600, 900 κ.εκ. και 1Λ	HDPE, PET, HDPE /PA, HDPE /EVOH και HDPE /F
2.	Δοχεία	2, (2,5), 3, 5, 10, 20 Λ	HDPE, PET, HDPE /PA, HDPE /EVOH και HDPE /F

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Clomazone

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 98 % (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:
1. Albaugh Europe Sàrl
2. Sipcarn Oxon SpA

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:
1. Shandong Cynda Chemical Co. Ltd
2. Weifang Cynda Chemical Co. Ltd
3. Sipcarn Oxon SpA

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Διασυστηματικό προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα των ισοξαζολιδινόνων για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων σε πατάτα και ελαιοκράμβη. Απορροφάται κυρίως από τους νεαρούς βλαστούς και δευτερευόντως από τις ρίζες των ζιζανίων και μεταφέρεται προς τα πάνω μέρη του φυτού. Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση της χλωροφύλλης και των καροτινοειδών

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους με μπεκ τύπου σκούπας, πίεση μικρότερη από 2,7 ατμόσφαιρες (40 psi) και υπό συνεχή ανάδευση με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού στο δεκάριο

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό.

Ανακινήστε καλά το σκεύασμα πριν τη χρήση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση, μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Γεμίστε το βυτίο με νερό και προσθέστε ένα κατάλληλο απορρυπαντικό. Ενεργοποιήστε τον αναδευτήρα και αφήστε το για 10-15 λεπτά. Αδειάστε τελείως το βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού 2-3 φορές με καθαρό νερό μέχρι να απομακρυνθεί κάθε ορατό ίχνος του σκευάσματος. Τα ακροφύσια και τα φίλτρα θα πρέπει να αφαιρούνται και να καθαρίζονται ξεχωριστά.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Ζιζάνιο που ελέγχεται	Δόσεις		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		κ/εκ. σκ./δεκ. μέγιστη	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)		
Πατάτα	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	30	20 - 40	Προφυτρωτικά έως 7 μέρες μετά την φύτευση	1
Ελαιοκράμβη	Καφέλλα (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Λουβουδιά (<i>Chenopodium album</i>) Μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (<i>Galium aparine</i>) Ζωχός (<i>Sonchus spp</i>) Πορφυρό λάμιο (<i>Lamium purpureum</i>) Στύφνος (<i>Solanum nigrum</i>) Στελλάρια (<i>Stellaria media</i>) Περδικούλι (<i>Persicaria maculosa</i>) Μαρτιάκος (<i>Senecio vulgaris</i>) Σισύμβριο (<i>Sisymbrium officinalis</i>) Βερόνικα (<i>Veronica spp.</i>)	33	20 - 40	Προφυτρωτικά έως 5 μέρες μετά την σπορά	1
Παρατηρήσεις: <ol style="list-style-type: none"> Εφαρμόζεται προφυτρωτικά των ζιζανίων. Η αποτελεσματικότητά του μειώνεται σε περίπτωση ξηρασίας που μειώνουν την εδαφική υγρασία και από δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες στις 2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή Μπορεί να γίνει σπαστή εφαρμογή (2) χωρίς να υπερβαίνεται η μέγιστη συνολική δόση/δεκ/καλλιεργητική περίοδο όταν υπάρχει σταδιακή εμφάνιση των ζιζανίων Μην το εφαρμόζετε όταν φυσάει. 					

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Πατάτα, Ελαιοκράμβη	Μη Εφαρμόσιμο λόγω του χρόνου εφαρμογής

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: F3

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μην φυτέψετε/σπέρνετε καλλιέργειες μικρού βιολογικού κύκλου για 90 ημέρες από την εφαρμογή του σκευάσματος

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Λόγω της διάρκειας δράσης του σκευάσματος στο έδαφος, θα πρέπει να ακολουθούνται οι κάτωθι οδηγίες σε περίπτωση αμειψισποράς:

Μετά από φρεζάρισμα 8-10 εκ.

1 μήνα μετά την εφαρμογή μπορούν να σπαρθούν: ελαιοκράμβη, καρότα, λάχανο, κολοκυθάκια, φασόλια, πεπόνι, μπιζέλια-αρακάς, πιπεριά, πατάτα .

4 μήνες μετά την εφαρμογή μπορούν να σπαρθούν: τα ανωτέρω και σιτηρά, φασόλια, γογγύλια

10 μήνες μετά την εφαρμογή μπορεί να σπαρθούν: τα ανωτέρω και ζαχαρότευτλα, σπανάκι

Μετά από βαθύ όργωμα 25 εκ.

1 μήνα μετά την εφαρμογή μπορούν να σπαρθούν: καρότα, σπανάκι, ζαχαρότευτλα, λάχανο, ελαιοκράμβη, κολοκύθα, κολοκυθάκια, φασόλια, λινάρι, λούπινα, αραβόσιτος, πεπόνι (μεταφύτευση), γογγύλια, κρεμμύδι, κρεμμύδι (από σπόρο), μπιζέλια -αρακάς, πατάτα, σαλατικά, σόγια, καπνό, τομάτα, ηλίανθο

4 μήνες μετά την εφαρμογή μπορούν να σπαρθούν: τα ανωτέρω και σιτηρά

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. Μπορεί να παρατηρηθούν παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας (αποχρωματισμός), που δεν επηρεάζουν την ανάπτυξη ή την απόδοση των καλλιεργειών.

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
Φοράτε κατάλληλα γάντια, φόρμα εργασίας, μπότες και γυαλιά κατά την ανάμιξη /φόρτωση και κατά την εφαρμογή.
«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό»

Sp1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από επιφανειακά ύδατα.

SPe3 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη **5 μέτρων** από μη γεωργική γη.

EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση κατάποσης: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από υψηλές θερμοκρασίες και από παγετό. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξέπλυματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία:12/09/2022

Σφραγίδα

.....
(Μάκης Αντωνιάδης)
για Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας