



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011  
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4460 (έντυπο 01), για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος με βάση τη διαδικασία της αμοιβαίας αναγνώρισης και

την επιστολή του αιτητή για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ελλάδα,

χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν VIRIATO με τα ακόλουθα στοιχεία:

**A) Γενικά στοιχεία άδειας**

1. Αριθμός Άδειας:

3896

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

09/06/2021

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/08/2025

2. Κάτοχος της άδειας:

ASCENZA AGRO S.A.

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

L. LAMBROU AGRO LTD

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

L. LAMBROU AGRO LTD

## Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

Viriato

2. Μορφή:

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Hexythiazox: 25,87% β/ο (ή 24% β/β)  
Βοηθητικές ουσίες: 75,41% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

ASCENZA AGRO S.A.

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

ASCENZA AGRO S.A.

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. ASCENZA AGRO S.A.  
2. AGROTECHNICA OΒΕΕ

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

| A/A | Είδος | Μέγεθος         | Υλικό           |
|-----|-------|-----------------|-----------------|
| 1.  | Φιάλη | 10 - 1000 κ.εκ. | COEX(HDPE-EVOH) |

## Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

Hexythiazox

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

97,6% (β/β)

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

HEXYTHIAZOX TASK FORCE – ΙΣΠΑΝΙΑ  
(Represented by: Industrias Afrasa S.A.)

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Jiangsu March Chemicals Co. Ltd

## Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

### 1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Ακαρεοκτόνο επαφής και στομάχου με δράση ωοκτόνο, προνυμφοκτόνο και νυμφοκτόνο.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος

### 4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστικών:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

5. Φάσμα Δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής  | Εχθρός που ελέγχεται   | Δόσεις                      |                                 |                        | Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|--|
|  |  | κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.) | κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη |  |
| <b>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ</b><br>(Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέϊπ φρούτ)   | <b>Κόκκινος τετράνυχος</b><br><i>Ranonychus citri</i> ,                                  | 6                           | 100 – 250                       | 6 - 15                 | 1 εφαρμογή                                 |
|  | <b>Κίτρινος Τετράνυχος</b><br><i>Tetranychus urticae</i><br><i>Eotetranychus carpini</i> | 20                          | 80 – 100                        | 16 – 20                | 1 εφαρμογή                                 |
|  | <b>Κίτρινος Τετράνυχος</b><br><i>Tetranychus urticae</i>                                 | 20                          | 50 – 100                        | 10-20                  | 1 εφαρμογή                                 |
| <b>Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας</b>  |  |                             |                                 |                        |  |
| <b>Τριανταφυλλιά</b><br>(θερμोकήπιο)*  | <b>Κίτρινος Τετράνυχος</b><br><i>Tetranychus urticae</i>                                 | 20                          | 50 – 100                        | 10-20                  | 1 εφαρμογή                                 |
| <b>Δρεπτά άνθη*</b>  | <b>Κίτρινος Τετράνυχος</b><br><i>Tetranychus urticae</i>                                 | 20                          | 50 – 100                        | 10-20                  | 1 εφαρμογή                                 |
| <b>Καλλωπιστικά/Ανθοκομικά</b><br>(θερμोकήπιο)**   | <b>Κίτρινος Τετράνυχος</b><br><i>Tetranychus urticae</i>                                 | 20                          | 50 – 100                        | 10-20                  | 1 εφαρμογή                                 |
| <b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:</b>   |  |                             |                                 |                        |  |
| 1. Να χρησιμοποιείται πριν φτάσουν τα ακάρεα στο στάδιο του ακμαίου.   |  |                             |                                 |                        |  |
| 2. Έχει μακρά υπολειμματική διάρκεια, δύο μηνών και δεν απαιτείται περισσότερο από μια εφαρμογή το χρόνο.  |  |                             |                                 |                        |  |
| *Το σκεύασμα έχει δοκιμαστεί στις ποικιλίες τριαντάφυλλων (Sunki, Samurai, Electron, Parade). Για την αποφυγή ανεπιθύμητων επιπτώσεων σε άλλες ποικιλίες τριανταφυλλιάς καθώς και στα υπόλοιπα δρεπτά άνθη συνίσταται η δοκιμή σε ένα μικρό αριθμό φυτών, πριν τη γενικευμένη χρήση του.   |  |                             |                                 |                        |  |
| ** Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιεργείες καλλωπιστικών/ανθοκομικών φυτών από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του επομένως η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη |  |                             |                                 |                        |  |

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

| Καλλιέργειες                             | Χρόνος Ασφάλειας |
|--|------------------|
| Μηλιά, Αχλαδιά                           | 28 ημέρες        |
| Αμπέλι<br>(Επιτραπέζια και Οινοποιήσιμα) | 21 ημέρες        |
| Εσπεριδοειδή                             | 14 ημέρες        |

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 10A**

Συνίσταται η εναλλαγή με σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης. Μετά την εφαρμογή του σκευάσματος, αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε ακαρεοκτόνο με δραστική ουσία clofentezine ή και το αντίθετο, στην ίδια καλλιεργητική περίοδο

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.  
Σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες καλλωπιστικών και ανθοκομικών,  
μην εισέρχεστε στο θερμοκήπιο πριν περάσουν 10 ημέρες.

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

**H411** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**EUH208** Περιέχει 1,2-Benzisothiazol-3(2)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**EUH401** Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

**EUH210** Δελτίο δεδομένων ασφάλειας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

**P405+102** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

**P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα.

«Να φοράτε γάντια κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης».

«Να φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο και ανθεκτικά υποδήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής».

Σε περίπτωση επανεισόδου να φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο.

Συνιστάται η εφαρμογή να γίνεται με τρακτέρ με κλειστή καμπίνα.

**P501** Διάθεση περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.

**Sp1** Μη ρυπαίνεται το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

**SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

- **8 μέτρων** σε καλλιέργεια εσπεριδοειδών,
- **25 μέτρων** σε καλλιέργεια μηλιάς και αχλαδιάς (πρώιμη εφαρμογή)
- **15 μέτρων** σε καλλιέργεια μηλιάς και αχλαδιάς (όψιμη εφαρμογή)
- **7 μέτρων** σε καλλιέργεια αμπελιού (όψιμη εφαρμογή).

Στην καλλιέργεια αμπελιού (πρώιμη εφαρμογή) δεν απαιτείται αφέκαστη ζώνη προστασίας.

**SPe3** Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 3 μέτρων από ακαλλιέργητη γη, όταν η καλλιέργεια υπερβαίνει σε ύψος τα 50 εκ.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

**P309+311:** Σε περίπτωση έκθεσης ή αδιαθεσίας καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401**

**Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:**

Διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του

**ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:**

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία: 09/06/2021



(Αγόρουλα Γεωργίου)  
Διευθύντρια  
Τμήματος Γεωργίας