



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. 4392-P (Έντυπο 03) για χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου σε φυτοπροστατευτικό προϊόν και την αίτηση με αρ. 4289-P (έντυπο 07) για ανανέωση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος παράλληλου εμπορίου και την τροποποίηση του προϊόντος αναφοράς,

Τροποποιείται η άδεια παράλληλου εμπορίου στο φυτοπροστατευτικό προϊόν PREVICUR ENERGY SL με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3823-P

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

31/08/2022

Ημερομηνία λήξης άδειας:

30/04/2024

2. Κάτοχος της άδειας:

AKG Paphitis Chemicals Ltd

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

AKG Paphitis Chemicals Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

AKG Paphitis Chemicals Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

2. Μορφή:

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

5. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	100κ.εκ. και 500κ.εκ.	HDPE

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

3. Παρασκευαστής των δ.ο.:

4. Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση.

Το propanoic acid-HCL παρουσιάζει μικρή διασυστηματική κίνηση και η δράση του φαίνεται να επηρεάζει το σχηματισμό των κυτταρικών μεμβρανών με συνέπεια την παρεμπόδιση της μυκηλιακής ανάπτυξης, καθώς και την παραγωγή και βλάστηση των σπορίων του περονόσπορου.

Το fosetyl- Al παρουσιάζει συμπλαστική και αποπλαστική κίνηση και δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων αλλά και επάγοντας μηχανισμούς άμυνας των φυτών.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμοί στα σπορεία, εφαρμογές με πότισμα, ψεκασμοί φυλλώματος

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού.. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη	κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)		
Σπορεία Τομάτα Μελιτζάνα Αγγούρι Πεπόνι Μαρούλι	Πύθιο (<i>Pythium spp.</i>)	3 κ.εκ. σκευάσματος ανά τετραγωνικό μέτρο (3 λίτρα/δεκ.)	---	2 λίτρα νερό ανά τετραγωνικό μέτρο (2.000 λίτρα/δεκ.)	Εφαρμογές στο Σπορείο. (BBCH 00-13)	1-2 εφαρμογές: Μία εφαρμογή μετά τη σπορά και μία εφαρμογή μετά τη βλάστηση των σπόρων (μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες)
Σπορεία Πιπεριά		6 κ.εκ. σκευάσματος ανά τετραγωνικό μέτρο (6 λίτρα/δεκ.)	---			1 εφαρμογή
Τομάτα Πιπεριά Αγγούρι Πεπόνι (θερμοκηπίου)		300 κ. εκ. σκευάσματος ανά δεκάριο	---	300 λίτρα νερού ανά δεκάριο	Ριζοπότισμα. Προληπτικές ή θεραπευτικές εφαρμογές. (BBCH 13-89)	- Καλλιέργεια στο έδαφος: 2 εφαρμογές ανά 7-14 ημέρες - Καλλιέργεια σε τεχνητά υποστρώματα: 4 εφαρμογές ανά 7-14 ημέρες
Τομάτα (θερμοκηπίου)	Φυτόφθορα (<i>Phytophthora Infestans</i>)	250 max	130 – 170	50 – 150	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από την εμφάνιση του 6 ^{ου} πραγματικού φύλλου μέχρι το 50% των καρπών εμφανίζει το τυπικό πλήρως ώριμο χρώμα. (BBCH 16-85)	Καλλιέργεια στο έδαφος/σε τεχνητά υποστρώματα: 1-2 εφαρμογές ανά 7 ημέρες

Αγγούρι (θερμοκηπίου)	Περονόσπορος (<i>Peronospora cubensis</i>)	250 max	130 – 170	50 – 150	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από την εμφάνιση του 4 ^{ου} πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση. (BBCH 14-89)	Καλλιέργεια στο έδαφος/σε τεχνητά υποστρώματα: 1-2 εφαρμογές ανά 7 ημέρες
Μαρούλι (υπαίθρου)	Περονόσπορος (<i>Bremia lactucae</i>)	250 κ. εκ. σκευάσματος ανά δεκάριο	---	40 λίτρα νερού ανά δεκάριο	Προληπτικοί ψεκασμοί εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.	Δύο εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7- 14 ημέρες εφόσον απαιτείται

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Εφαρμογές στα σπορεία	
Όλες οι καλλιέργειες	Μη Εφαρμόσιμο
Εφαρμογές με ριζοπότισμα (Θερμοκηπίου)	
Τομάτα, Πιπεριά, Αγγούρι (Θ)	3 ημέρες
Πεπόνι (Θ)	14 ημέρες
Εφαρμογές στο Φύλλωμα	
Μαρούλι (υπαίθρου)	21 ημέρες
Τομάτα (Θ), Αγγούρι (Θ)	3 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: propamocarb hydrochloride: 28
fosetyl-AI: 33**

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Λαχανικά με βρώσιμη ρίζα και λαχανικά του γένους *Allium* που προορίζονται για τη διατροφή ανθρώπων και ζώων, μπορεί να φυτευτούν ή να σπαρθούν στο ίδιο υπόστρωμα μετά την πάροδο 120 ημερών από την τελευταία εφαρμογή.

Φυλλώδη, στελεχώδη και καρποφόρα κηπευτικά και σταυρανθή μπορεί να φυτευτούν ή να σπαρθούν μετά την πάροδο 60 ημερών από την τελευταία εφαρμογή.

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Μην εισέρχετε σε ψεκασμένες περιοχές πριν στεγνώσουν εντελώς

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής .

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS07

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
EUH 401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη, αναθυμιάσεις/αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.
P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.
Φοράτε γάντια, μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την επανείσοδο στην καλλιέργεια πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.
P501 Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
SP1 Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Γενικές υποδείξεις: Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή.
P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
P308+P311: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ξαπλωμένο. Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό. Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό
P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, προσέχοντας να ξεπλυθεί η περιοχή κάτω από τα βλέφαρα. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν, μετά από τα 5 πρώτα λεπτά και συνεχίστε με το πλύσιμο του ματιού. Εάν ο ερεθισμός ματιών ή το κοκκίνισμα εμμένει, επισκεφθείτε έναν οφθαλμίατρο.
Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Ειδοποιήστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.
Πληροφορίες για το γιατρό
Συμπτώματα: Τα ακόλουθα συμπτώματα μπορεί να συμβούν: Λήθαργος, Σύγχυση, Σπασμοί,
Τοπικά: ευαισθητοποιητική δράση
Κίνδυνοι: Το προϊόν, παρόλο που είναι καρβαμδικό, δεν είναι αναστολέας της χοληνεστεράσης.
Μεταχείριση: Συστήνεται κατάλληλη υποστηρικτική και συμπτωματική θεραπεία όπως αυτή ενδείκνυται από την κατάσταση του ασθενή.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει αντίδοτο. Αντένδειξη: ατροπίνη. Δεν απαιτείται φυσιολογικά πλύση στομάχου. Όταν έχει απορροφηθεί σημαντική ποσότητα (περισσότερο από μία μπουκιά), χορηγήστε ενεργό άνθρακα και θειικό νάτριο.
Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η άδεια παράλληλου εμπορίου χορηγείται στο προϊόν Prenicur Energy SL που είναι εγκεκριμένο στην Ελλάδα με εμπορικό όνομα Prenicur Energy SL και αριθμό έγκρισης 60257 και με κάτοχο άδειας την εταιρεία BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.

Το προϊόν αναφοράς στην Κύπρο βάση του οποίου χορηγείται η σχετική άδεια είναι το Prenicur Energy SL και αριθμό άδειας 2807.

Η εταιρεία AKG Paphitis Chemicals Ltd, οφείλει να τηρά αρχείο (Αρχείο Εισαγωγής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Παράλληλου Εμπορίου) με τις ποσότητες του σκευάσματος Prenicur Energy SL που εισάγονται στην Κύπρο (θα περιλαμβάνει όλα τα παραστατικά στοιχεία των εισαγωγών ανά παρτίδα σκευάσματος).

Το αρχείο θα είναι άμεσα διαθέσιμο για έλεγχο από την αρμόδια Αρχή.

Για κάθε φορτίο του σκευάσματος Prenicur Energy SL που εισάγεται στην Κύπρο θα πρέπει να χορηγείται η σχετική «Άδεια για Εισαγωγή Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος Παράλληλου Εμπορίου». Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η εισαγωγή του σκευάσματος στη χώρα.

Η ετικέτα του σκευάσματος θα φέρει ευανάγνωστα τη φράση **«ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»** με τα πλέον έντονα και μεγάλα γράμματα.

Η άδεια παράλληλου εμπορίου θα ανακληθεί:

- σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας του προϊόντος αυτού στην Ελλάδα για λόγους ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας.

- σε περίπτωση κακού χειρισμού της άδειας παράλληλου εμπορίου από την εταιρεία AKG Paphitis Chemicals Ltd, με στόχο την εισαγωγή ή τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων άλλων από αυτά για τα οποία χορηγήθηκε η παρούσα άδεια.

1. Η τιμολόγηση του σκευάσματος με την παλιά ετικέτα επιτρέπεται μέχρι 30/09/2022.

2. Η τελική διάθεση, αποθήκευση και χρήση από τους γεωργούς του σκευάσματος, με την παλιά ετικέτα επιτρέπεται μέχρι 28/02/2023.

3. Όσο αφορά τις ποσότητες του σκευάσματος που ήδη υπάρχουν στα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά τις 28/02/2023, ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο, για να ενημερώσει για την νέα άδεια τα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων που έχουν ήδη προμηθευτεί το σκεύασμα. Νοείται ότι, όσα ΦΠ παρασκευάστηκαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας υπογραφής της νέας άδειας θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νέα άδεια.

4. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία:31/08/2022

.....
(Μάκης Αντωνιάδης)
για Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα