



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 154 (Έντυπο 12), ημερομηνίας 20/10/2017 για την τροποποίηση υφιστάμενης άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος μετά την έγκριση όλων των δραστικών ουσιών που περιέχονται στο προϊόν και

την επιστολή της εταιρείας με ημ. 04/10/2017 για τροποποίηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της οριστικής άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ελλάδα και

τις αιτήσεις με αρ. 4005 και 4529 (Έντυπο 08), για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **MYSTIC 25WG** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

2796

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

31/08/2023

Ημερομηνία λήξης άδειας:

15/08/2027

2. Κάτοχος της άδειας:

Nufarm S.A.S

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

L. Lambrou Agro td

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

L. Lambrou Agro td

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Mystic 25WG

2. Μορφή: Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: tebuconazole: 25% β/β
βοηθητικές ουσίες: 74,2% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: Nufarm S.A.S

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:
1. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.
2. Κ&N Ευθυμιάδη ABEE

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες ή Δοχεία	50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 γραμμάρια, 1 κιλό	HDPE
2	Δοχεία	2 – 20 κιλά	

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: tebuconazole

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 97% (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: Nufarm S.A.S

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:
1. Astec LifeScience Limited, Ινδία
2. Shangyu Nutrichem Co., Ltd, Κίνα
3. Yancheng Huihuang Chemical Co Ltd., Κίνα
4. Excel Crop Care Ltd, Ινδία

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs, (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors - DMIs).

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς

Τρόπος καθαρισμού του εξοπλισμού: Ξεπλύνετε ενδελεχώς τον εξοπλισμό με καθαρό νερό αμέσως μετά τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο με καθαρό νερό και ξεπλύνετε τρεις φορές ψεκάζοντας το πριν την αποθήκευση ή χρήση για εφαρμογή άλλων προϊόντων. Ίχνη του προϊόντος μπορεί να προκαλέσουν ζημιά σε ευαίσθητες καλλιέργειες που θα ψεкаστούν μετά

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	γρ./δεκ. μέγιστη		
Ροδακινιά Νεκταρινιά Βερικοκιά	Μονίλια φύλλων και καρπών (<i>Monilinia laxa</i> , <i>Monilinia fructigena</i>) Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	50 – 60	80 – 200	50	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθeneιών από το σχηματισμό του καρπού έως και οι αυτοί εμφανίσουν το χρώμα της ποικιλίας. (BBCH 79-85) Εφαρμογή για την προστασία των ωρίμων καρπών πριν από τη συγκομιδή, και εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Η μεγάλη δόση να εφαρμόζεται μόνο εφόσον οι καρποί πρόκειται να αποθηκευτούν σε ψυγεία μετά τη συγκομιδή τους. (BBCH 79-85)	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες
Μηλιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i>)	35 – 50	50 – 100	25 – 35	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθeneιών από το σχηματισμό του καρπού έως αυτοί σχηματίσουν το χρώμα της ποικιλίας. (Τελευταία επέμβαση BBCH 79) Θεραπευτικές εφαρμογές μόνο κατόπιν σχετικής σύστασης από τα κέντρα των γεωργικών προειδοποιήσεων.	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 8 ημέρες
Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο)	Ωίδιο (<i>Uncinula necator</i>)	30 – 100	40 – 100	30 – 40	Εφαρμογή από την ανθοφορία έως και την έναρξη αλλαγής χρώματος των ραγών.	1 – 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 – 14 ημέρες
Ελαιοκράμβη	<i>Phoma Leptosphaeria maculans</i>	250 – 500	20 – 40	100	Εφαρμογές την άνοιξη. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. (BBCH 52-80).	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 – 15 ημέρες

Παρατηρήσεις:

Προσοχή: η μεγάλη δοσολογία να συνδυάζεται με το μικρότερο όγκο νερού, ώστε να μη γίνεται υπέρβαση της μέγιστης δόσης του σκευάσματος στο δεκάριο

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά	7 ημέρες
Μηλιά, Αμπέλι	14 ημέρες
Ελαιοκράμβη	Μ.Ε (καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής)

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 3

- Χρησιμοποιείτε εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης των παθογόνων. Καταστρέψτε τα υπολείμματα των καλλιεργειών, καθώς επίσης αφαιρέστε λαιμάργους που τυχόν λειτουργούν ως φορείς των παθογόνων.
- Στις περιπτώσεις που είναι εφικτό, χρησιμοποιείτε ανθεκτικές ποικιλίες.
- Αποφύγετε τη χρήση ευαίσθητων ποικιλιών σε μεγάλες εκτάσεις σε περιοχές με ιστορικό εμφάνισης των παθογόνων.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνον εφόσον η παρουσία του παθογόνου συνιστά επέμβαση. Να γίνεται παρακολούθηση των καλλιεργειών, και επέμβαση πριν η ασθένεια εκδηλωθεί.
- Χρησιμοποιείτε πάντα την ελάχιστη συνιστώμενη δοσολογία.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα κατά προτίμηση επαφής, που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMI's ή που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DMI's στην οποία ανήκει το tebuconazole. Να μην υπερβαίνετε το μέγιστο αριθμό εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Οι εργάτες μπορούν να εισέλθουν στην ψεκάσμενη περιοχή μόνο αφού οι επιφάνεια των φύλλων έχει στεγνώσει, και εφόσον φορούν μακρυμάνικα ρούχα και παντελόνι. Στη περίπτωση της καλλιέργειας του αμπελιού, οι εργάτες μπορούν να εισέλθουν για τη συγκομιδή 14 μέρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS08



GHS09

12. Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

13. Δηλώσεις προφύλαξης:

P102 Μακριά από παιδιά.

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P202 Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.

P308+P313 Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: συμβουλευτείτε/επισκεφτείτε γιατρό.

P264 Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά το χειρισμό.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Να φοράτε γάντια και συσκευή προστασίας ματιών προσώπου κατά την ανάμιξη / φόρτωση του προϊόντος, γάντια, ολόσωμη φόρμα και κατάλληλες μπότες κατά τη διάρκεια χειρισμού του προϊόντος.

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

P501 Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα διάθεσης αποβλήτων.

SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Spe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήνετε μian απέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: 10 μέτρων για τις καλλιέργειες της ελαιοκράμβης και του αμπελιού και 15 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια περιορισμού της διασποράς 50% για τις καλλιέργειες μηλοειδών και πυρηνόκαρπων.

SPe3 Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους να αφήνετε μian απέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη:

5 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια περιορισμού της διασποράς 50% στην καλλιέργεια της ελαιοκράμβης,

5 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια περιορισμού της διασποράς 50% ή 10 μέτρων στην καλλιέργεια του αμπελιού

10 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια περιορισμού της διασποράς 50% ή 15 μέτρων για καλλιέργειες πυρηνόκαρπων.

SPe3 Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήνετε μian απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων για καλλιέργειες μηλοειδών και πυρηνόκαρπων από μη γεωργική γη.

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

EUH208 Περιέχει silicon antifoam. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P308+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και συμβουλευτείτε ιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε με σαπούνι και νερό. Πλύνετε τα ρούχα πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση κατάποσης: Πλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα.

Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία .

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία σε χώρο δροσερό, καλά αεριζόμενο και προστατευμένο από την υγρασία. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα/σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 01/09/2023



(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα

