



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. 4232-P (Έντυπο 03), για χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου σε φυτοπροστατευτικό προϊόν και τις αιτήσεις με αρ. 4105-P και 4627-P (Έντυπο 07) για ανανέωση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος παράλληλου εμπορίου,

τροποποιείται η άδεια παράλληλου εμπορίου στο φυτοπροστατευτικό προϊόν KUMULUS S 80WG με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3690-P

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

31/12/2023

Ημερομηνία λήξης άδειας:

15/04/2026

2. Κάτοχος της άδειας:

AKG Paphitis Chemicals Ltd

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

AKG Paphitis Chemicals Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

AKG Paphitis Chemicals Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

2. Μορφή:

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

5. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακίδια μέσα σε κουτί	100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800 γρ., 1 κιλού, (1,2), (1,25), (1,4), (1,5), 2, (2,5), 3, 4 και 5 κιλών	Σακίδιο πολυαιθυλενίου, μέσα σε κουτί χάρτινο
2	Σακίδια	100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800 γρ., 1 κιλού, (1,2), (1,25), (1,4), (1,5), 2, (2,5), 3, 4 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30 και 50 κιλών	Σακίδιο πολυαιθυλενίου
3	Σάκοι	100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800 γρ., 1 κιλού, (1,2), (1,25), (1,4), (1,5), 2, (2,5), 3, 4 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30 και 50 κιλών	Χάρτινοι σάκοι με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμοί φυλλώματος

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αργά στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αμέσως μετά το τέλος του ψεκασμού, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, δυο-τρεις (2-3) φορές με καθαρό νερό. Επειδή το θειάφι διαβρώνει τα μέταλλα, οι ψεκαστήρες πρέπει να πλένονται πολύ καλά αμέσως μετά το τέλος του ψεκασμού.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	γρ./δεκ. μέγιστη	
Εσπεριδοειδή	Άκαρι (<i>Eriophyes</i> sp.)	200 - 500	50 - 300	750	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων
		400 – 500 200 – 300	100 – 150	600	
Μηλιά Αχλαδιά	Ωίδιο (<i>Podosphaera leucotricha</i>) Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i>)	300 - 400	50-150	600	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, στα στάδια πτώσης πετάλων, απόσπασης του κάλυκα και στο <u>στάδιο καρπιδίου</u> .
		200 - 500	50 – 100	500	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας
Ροδακινιά Νεκταρινιά Βερικοκιά Κερασιά Δαμασκηινιά	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	200 – 500	50 – 100	500	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων
		200 – 500	50 – 100	500	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας
Φουντουκιά	Ακάρεα (<i>Eriophyes</i> sp., <i>Phytoptus avelanae</i>)	200 – 500	50 – 100	500	Εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες
		200 – 500	50 – 100	500	Εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες
Αμυγδαλιά	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	320	100 – 120	384	Ψεκασμός φυλλώματος. Εφαρμογή κατά το στάδιο σχηματισμού των ανθοφόρων οφθαλμών (Απρίλιο) & κατά την πτώση των πετάλων (τέλος ανθοφορίας).
		200 – 500	50 - 150	750	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας
Ελιά (ποικιλία πράσινη ελιά Χαλκιδικής)	Ακάρεα της οικογένειας <i>Eriophyidae</i>	200 – 500	50 - 150	750	Εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 30 ημέρες
Λωτός Αβοκάντο Παπάγια Μάγκο	Ωίδιο	200 – 500	50 - 150	750	Εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	γρ./δεκ. μέγιστη	
Αμπέλι (οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες)	Ωίδιο (<i>Uncinula necator</i>)	200 – 400		600	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθένειών Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκατ. Κατά την άνθηση, μετά το δέσιμο των ραγών και κάθε 15-20 μέρες μέχρι το στάδιο του «γαλίσματος» των ραγών ανάλογα πάντοτε με την ένταση της προσβολής. Λίγο πριν τη διόγκωση των σφραλαμών.
	Ερίνωση (<i>Eriophyes vitis</i>)	100 – 200 1000	50 – 150	300 1500	8 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες
Φράουλα (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca macularis, Podosphaera aphanis</i>) Άκαρι (<i>Eriophyes sp., Aculops lycopersici</i>)	--	50 – 100	500 500 – 750	8 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 – 14 ημέρες
	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca macularis, Podosphaera aphanis</i>)	--	50 – 100	500	6 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημέρες
Καρότα (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου) Παντζάρι Ραπάνια Λαγόχορτο Παστινάκι	Ωίδιο (<i>Erysiphe spp, Oidium spp.</i>)	--	50 – 100	300 – 400	8 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 10 ημέρες

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	γρ./δεκ. μέγιστη	
Σκόρδο Κρεμμύδι	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i>)	--	50 – 100	300 – 400	8 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 10 ημέρες
Τομάτα Μελιτζάνα Πιπεριά (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i> <i>Oidium</i> spp. <i>Erysiphe cichoracearum</i>) Ακάρια Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) <i>Eriophyes</i> sp. Παραμορφωτικό άκαρι (<i>Aculops lycopersici</i>)	--	50 – 100	300	8 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 10 ημέρες
Κολοκυνθοειδή: -Αγγούρι -Αγγουράκι -Κολοκυθάκι, - Κολοκύθα -Πεπόνι -Καρπούζι (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	Ωίδιο (<i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Sphaerotheca fuliginea</i> , <i>Podospheera xanthii</i>)		50 – 100	300	8 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 10 ημέρες
Κράμπι (Λάχανο) Κουνουπίδι Μπρόκολο Λαχανάκι Βρυξέλλων (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	Ωίδιο (<i>Erysiphe</i> spp., <i>Sphaerotheca</i> spp.) Τετράνυχος (<i>Tetranychus</i> sp.)	--	50 – 100	300	8 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 15 ημέρες
Φασόλια (φρέσκα με λοβό και χωρίς λοβό) (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	Ωίδιο (<i>Oidium</i> spp., <i>Erysiphe</i> spp)	--	50 – 100	300 – 400	8 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 10 ημέρες

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιερ. περίοδο
		γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	γρ./δεκ. μέγιστη		
Μαρούλι και λοιπά σαλατικά, Σπανάκι Λυκοτριβόλο Σκαρόλα Κιχώριο Αντίδι κατασαρό Ραδίκι	Οΐδιο (<i>Oidium</i> spp, <i>Erysiphe cichorasearum</i>) Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	--	50 – 100	400	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ή της προσβολής	8 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 10 ημέρες
		--	50 - 100	300 – 400		
Μπιτζέλια (αρακάς) (φρέσκα με λοβό και χωρίς λοβό) (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	Οΐδιο (<i>Oidium</i> spp., <i>Erysiphe</i> spp)	--	50 – 100	500	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ή της προσβολής	8 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 10 ημέρες
		--	50 – 100	500	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας	
Φασόλια ξηρά (όσπρια)	Οΐδιο (<i>Oidium</i> spp., <i>Erysiphe</i> spp)	--	50 – 100	300 – 400	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας	8 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 10 ημέρες
		--	50 – 100	500		
Μπιτζέλια ξηρά (αρακάς- ρεβίθι) (όσπρια)	Οΐδιο (<i>Leveillula taurica</i>)	--	50 – 100	500	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημερες και 14 ημερες για τη σόγια
Πατάτα	Οΐδιο (<i>Leveillula taurica</i>)	--	50 – 100	750 – 1000	Εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημερες	
Ηλιανθος	Οΐδιο (<i>Erysiphe</i> spp)	--	50 – 100			
Σόγια	Οΐδιο (<i>Erysiphe</i> spp)	--	60 – 100			
Ζαχαρότευλα	Οΐδιο (<i>Erysiphe betae</i>)	--	20 – 60			

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	γρ./δεκ. μέγιστη	
Ζαχαρότευπλα	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	240 – 480	40 – 100	480	3 εφαρμογές
Σιτάρι Κριθάρι Βρώμη Σίκαλη	Ωίδιο (<i>Erysiphe graminis</i>)	--	20 – 60	750 – 1000	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημέρες
Λυκίσκος	Ωίδιο (<i>Podospheera macularis</i>) Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	--	100 – 200	750 – 1200	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ή της προσβολής
Καπνός	Ωίδιο (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	--	50 – 100	400	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας
Καλλωπιστικά-Ανθοκομικά: Τριανταφυλλιά	Ωίδιο (<i>Oidium</i> spp. <i>Sphaerotheca</i> spp. <i>Podospheera pannosa</i>) Άκαρι (<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i>)	200 – 300	50 – 100	300	Μόλις οι βλαστοί αποκτήσουν μήκος 10-15 εκατ. και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
Δασικά δένδρα Λεύκα (φυτώριο)	Ωίδιο	--	50 – 100	500	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας

Παρατηρήσεις

1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με το στάδιο ανάπτυξης του φυτού.
2. Η δόση / HL να συνδυαστεί κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπερβαίνεται η μέγιστη επιτρεπτή δόση / στρ.
3. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
4. Στις καλλιέργειες και στις περιοχές που εφαρμόζονται, να ακολουθούνται τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.
5. Η χρήση του σκευάσματος μπορεί να ενταχτεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών
6. Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18°C.
7. Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20°C
8. Διακοπή ψεκασμών το λιγότερο 2-3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή των ζαχαρότευτλων.
9. Στα καλλωπιστικά (πλην τριανταφυλλιάς) να διενεργείται δοκιμή μικρής έκτασης (σε 1-2 φυτά) πριν από τη γενικευμένη χρήση, για την αποφυγή φαινομένων φυτοτοξικότητας.

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Ελιά	90 ημέρες
Υπόλοιπες καλλιέργειες	M.E

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: M2

Στην καλλιέργεια του αμπελιού να μην εφαρμόζεται πολύ κοντά στη συγκομιδή καθώς αφήνει σημάδια πάνω στους καρπούς

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκάστηκα υγρό στα φυτά

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μέσα σε 4 εβδομάδες από την εφαρμογή πολτού, γιατί προκαλεί φυτοτοξικότητα.

Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 30 °C) μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στα φυτά.

Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα στα κολοκυνθοειδή, καθώς και σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς (όπως STARKING, DELICIOUS κ.α.), αχλαδιάς (όπως D'ANJOU κ.α.) και βερικοκιάς κάτω από συνθήκες υψηλής ηλιοφάνειας και υψηλών θερμοκρασιών.

10. Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με παραφινικό λάδι καθώς και με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P102+P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

P234 Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

«Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση»

«Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μπότες κατά την εφαρμογή»

«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια σε περίπτωση που εισέλθουν στον αγρό μετά την εφαρμογή»

Sp1 ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα

SPe3 Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη ασφαλείας από ακαλλιέργητη γη:

5 μέτρων σε αμπέλια, τροπικά δένδρα, ελιές, λυκίσκος, καλλωπιστικά όταν η εφαρμογή γίνεται με συμβατικά ακροφύσια

10 μέτρων σε άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες και σε δασικά δένδρα λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή γίνεται με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή **5 μέτρων** με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75% ή **3 μέτρων** με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90% .

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την επικέτα αν είναι δυνατό).

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Μην χορηγήσετε τίποτα από το στόμα και μην προκαλέσετε εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό Αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Πρώτων Βοηθειών: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο και μακριά από εστίες φωτιάς. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για 3 (τρία) χρόνια.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακίδια, σάκοι) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η άδεια παράλληλου εμπορίου χορηγείται στο προϊόν Kumulus S 80WG που είναι αδειοδοτημένο στην Ελλάδα με εμπορικό όνομα Kumulus S 80WG και αριθμό έγκρισης 60493 και με κάτοχο άδειας την εταιρεία BASF.

Το προϊόν αναφοράς στην Κύπρο, βάσει του οποίου χορηγείται η σχετική άδεια, είναι το Kumulus S 80WG με αριθμό άδειας 197.

Η εταιρεία AKG Paphitis Chemicals Ltd, οφείλει να τηρεί αρχείο (Αρχείο Εισαγωγής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Παράλληλου Εμπορίου) με τις ποσότητες του σκευάσματος Kumulus S 80WG που εισάγονται στην Κύπρο (θα περιλαμβάνει όλα τα παραστατικά στοιχεία των εισαγωγών ανά παρτίδα σκευάσματος).

Το αρχείο θα είναι άμεσα διαθέσιμο για έλεγχο από την αρμόδια Αρχή.

Για κάθε φορτίο του σκευάσματος Kumulus S 80WG που εισάγεται στην Κύπρο θα πρέπει να χορηγείται η σχετική «Άδεια για Εισαγωγή Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος Παράλληλου Εμπορίου». Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η εισαγωγή του σκευάσματος στη χώρα.

Η ετικέτα του σκευάσματος θα φέρει ευανάγνωστα τη φράση «**ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**» με τα πλέον έντονα και μεγάλα γράμματα.

Η άδεια παράλληλου εμπορίου θα ανακληθεί:

- σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας του προϊόντος αυτού στην Ελλάδα για λόγους ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας.

- σε περίπτωση κακού χειρισμού της άδειας παράλληλου εμπορίου από την εταιρεία AKG Paphitis Chemicals Ltd, με στόχο την εισαγωγή ή τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων άλλων από αυτά για τα οποία χορηγήθηκε η παρούσα άδεια.

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 18/01/2024



Σφραγίδα

(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας