



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021  
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. 4572-P (Έντυπο 03), για χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου σε φυτοπροστατευτικό προϊόν

χορηγείται άδεια παράλληλου εμπορίου στο φυτοπροστατευτικό προϊόν BENTA 480SL με τα ακόλουθα στοιχεία:

**A) Γενικά στοιχεία άδειας**

1. Αριθμός Άδειας:

4002-P

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

10/04/2023

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/05/2026

2. Κάτοχος της άδειας:

Solato Trading Ltd

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Solato Trading Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Solato Trading Ltd

## Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

2. Μορφή:

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

5. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες	50 κ.εκ. έως 1L	HDPE
2.	Δοχεία	5L έως 20L	HDPE

## Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

4. Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

## Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

### 1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Το BENTA 480 SL είναι ένα διαλυτό συμπυκνωμένο σκεύασμα για χρήση ως ζιζανιοκτόνο για μεταφυτρωτική εφαρμογή σε καλλιέργειες αραβόσιτου και ρυζιού για τον έλεγχο των πλατύφυλλων ζιζανίων.

Το BENTA 480 SL περιέχει bentazone ως δραστικό συστατικό.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Καθολικός ψεκασμός με καλή διαβροχή των ζιζανίων

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι την μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

#### **Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο καθαρισμός του βυτίου και όλων των εξαρτημάτων. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	Κ.εκ./δεκ. μέγιστη		
<b>Αραβόσιτος</b>	<b>Πλατύφυλλα Ζιζάνια</b> <u>Ευαίσθητα πλατύφυλλα:</u> Αγριοπιπεριά ( <i>Polygonum persicaria</i> ) Τραχύ βλήτο ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) (στο ρύζι) Σκίρπο ( <i>Scirpus spp.</i> )	15 – 40	200	Εφαρμόζεται νωρίς μεταφυτρωτικά όταν η καλλιέργεια είναι στο στάδιο των 1-5 πραγματικών φύλλων. (BBCH 10-15)	1
<b>Ρύζι</b>	<u>Μετρίως ευαίσθητα πλατύφυλλα:</u> Τραχύ βλήτο ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ), (στον αραβόσιτο) Πεντάνευρο ( <i>Alisma plantago aquatica</i> ) <i>Bidens spp</i> Στύφνος ( <i>Solanum nigrum</i> )	30 – 50	200	Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά από το 3 <sup>ο</sup> φύλλο της καλλιέργειάς έως το τέλος του αδελφώματος. (BBCH 13-29)	1
<b>Παρατηρήσεις:</b> 1. Πριν την εφαρμογή στο ρύζι, θα πρέπει να μειώνεται η στάθμη του νερού στα τηγάνια ως 2-3 εκ. και να διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα ως και 2-3 ημέρες μετά την εφαρμογή. Δεν ελέγχονται ζιζάνια που κατά το χρόνο της εφαρμογής βρίσκονται κάτω από το νερό. 2. Για καλύτερα αποτελέσματα τα ζιζάνια να βρίσκονται σε νεαρό στάδιο ανάπτυξης, τριών έως πέντε φύλλων.					

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Αραβόσιτος, ρύζι	<b>M.E (Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής)</b>

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το χ φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: C3**

Για να αποτρέψετε ή να καθυστερήσετε την ανάπτυξη ανθεκτικότητας των ζιζανίων, εναλλάσσετε την εφαρμογή του εν λόγω ζιζανιοκτόνου με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης και υιοθετήστε κατάλληλες γεωργικές πρακτικές ελέγχου των ζιζανίων, όπως η αμειψισπορά, οι μέθοδοι μηχανικής καταπολέμησης κ.λπ. Πρέπει να εφαρμόζονται τακτικές εκτιμήσεις για την παρακολούθηση με την πάροδο του χρόνου κάθε πιθανής εξέλιξης της ευαισθησίας των ζιζανίων στο BENTA 480 SL και να ενημερώνονται οι αρμόδιες τοπικές αρχές. *Για να αποφύγετε δυσμενείς επιπτώσεις στις καλλιέργειες που καλλιεργούνται σε παρακείμενες περιοχές, μην ψεκάζετε το προϊόν σε συνθήκες ανέμου και χρησιμοποιήστε ακροφύσια που μειώνουν τη μετατόπιση*

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

----

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

---

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις

10. Συνδυαστικότητα:

---

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

**ΠΡΟΣΟΧΗ**



12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

**GHS07**

**H302** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

**H412** Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**EUH208** Περιέχει Bentazone. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**EUH401** Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

### 13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

- P405+P102** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
- P264** Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- P280** Φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτική ενδυμασία.  
Φοράτε κατάλληλα γάντια, φόρμα εργασίας και μπότες κατά την ανάμιξη/φόρτωση καθώς και κατά την εφαρμογή.  
Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι, εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό.
- P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- Sp1** Μη ρυπαίνεται το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
- Spe3** Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή αφήστε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% από μη γεωργική γη.

### 14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

- P301+P312:** Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- P330:** Ξεπλύνετε το στόμα.
- Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα, στον καθαρό αέρα.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.
- Σε περίπτωση εισπνοής επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
- Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία
- ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401**

### Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης και θερμότητας, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

### ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

## **Z. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:**

### **ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**

Η άδεια παράλληλου εμπορίου χορηγείται στο προϊόν Benta 480SL που είναι αδειοδοτημένο στην Ελλάδα με εμπορικό όνομα Benta 480SL και αριθμό έγκρισης 70290 και με κάτοχο άδειας την εταιρεία Sharda Cropchem España S.L.

Το προϊόν αναφοράς στην Κύπρο, βάσει του οποίου χορηγείται η σχετική άδεια, είναι το Benta 480SL με αριθμό άδειας 3946.

Η εταιρεία Solato Trading Ltd, οφείλει να τηρεί αρχείο (Αρχείο Εισαγωγής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Παράλληλου Εμπορίου) με τις ποσότητες του σκευάσματος Benta 480SL που εισάγονται στην Κύπρο (θα περιλαμβάνει όλα τα παραστατικά στοιχεία των εισαγωγών ανά παρτίδα σκευάσματος).

Το αρχείο θα είναι άμεσα διαθέσιμο για έλεγχο από την αρμόδια Αρχή.

Για κάθε φορτίο του σκευάσματος Benta 480SL που εισάγεται στην Κύπρο θα πρέπει να χορηγείται η σχετική «Άδεια για Εισαγωγή Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος Παράλληλου Εμπορίου». Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η εισαγωγή του σκευάσματος στη χώρα.

Η ετικέτα του σκευάσματος θα φέρει ευανάγνωστα τη φράση «**ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**» με τα πλέον έντονα και μεγάλα γράμματα.

Η άδεια παράλληλου εμπορίου θα ανακληθεί:

- σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας του προϊόντος αυτού στην Ελλάδα για λόγους ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας.
- σε περίπτωση κακού χειρισμού της άδειας παράλληλου εμπορίου από την εταιρεία Solato Trading Ltd, με στόχο την εισαγωγή ή τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων άλλων από αυτά για τα οποία χορηγήθηκε η παρούσα άδεια.

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021

Ημερομηνία: .....10/04/2023.....

.....  
(Μάκης Αντωνιάδης)  
για Διευθύντρια  
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα