



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4192 (Έντυπο 01), για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,
την επιστολή του αιτητή για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ιταλία και
την αίτηση με αρ. 506 (έντυπο 09) για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σχέση με εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **PACLOT NEW** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3634

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

27/04/2021

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/05/2024

2. Κάτοχος της άδειας:

PROPLAN - Plant Protection Company, SL

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

L. Lambrou Agro Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

L. Lambrou Agro Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

2. Μορφή:

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	20 κ.εκ. έως 10 λίτρα	HDPE
2	Φιάλη μέσα σε κουτί	20 κ.εκ. έως 500 κ.εκ.	HDPE Κουτί χάρτινο

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Ρυθμιστής ανάπτυξης. Δρα παρεμποδίζοντας την σύνθεση γιββερελλίνης. Απορροφάται από τα φύλλα, τους βλαστούς και τις ρίζες των φυτών και περιορίζει την ανάπτυξη των φυτών. Ελαττώνει το μήκος των βλαστών και την απόσταση μεταξύ τους, ευνοεί το σχηματισμό πλευρικών βλαστών και ανθών. Αυξάνει την καρποφορία, βελτιώνει την ποιότητα των καρπών και διευκολύνει την συγκομιδή.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

- Ψεκάσμος φυλλώματος (Μηλιά, Αχλαδιά, Αμπέλι)
- Εφαρμογή στις ρίζες των φυτών, μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηλιά)

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Ανακινήστε καλά το σκεύασμα πριν ανοίξετε τη συσκευασία του. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Τρόπος παρασκευής για εφαρμογή μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης: προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο σύστημα της στάγδην άρδευσης, με τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Συνιστάται η εφαρμογή να ξεκινά μετά από πότισμα.

Καθαρισμός ψεκαστικών: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, δύο (2) φορές με καθαρό νερό.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	κ.εκ σκ./δεκ. μέγιστη		
Μηλιά Αχλαδιά	<ul style="list-style-type: none"> - Περιορισμός της ανάπτυξης των βλαστών - Αύξηση της καρποφορίας - Βελτίωση της ποιότητας των καρπών - Διευκόλυνση της συγκομιδής 	20	50 – 100	20	Ψεκασμοί φυλλώματος κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των καρπών (από BBCH 73)	4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών
Ροδακινιά Νεκταρινιά Δαμασκηινιά	<ul style="list-style-type: none"> - Περιορισμός της ανάπτυξης των βλαστών - Αύξηση της καρποφορίας - Βελτίωση της ποιότητας των καρπών - Διευκόλυνση της συγκομιδής 	--	250 – 500 κ.εκ. ανά δέντρο	80	Εφαρμογή στις ρίζες των φυτών, μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης, από την αρχή της βλάστησής έως την ρόδινη κορυφή (BBCH 10-57)	1 εφαρμογή
Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια)	<ul style="list-style-type: none"> - Περιορισμός της ανάπτυξης των βλαστών. - Αποφυγή της πτώσης των ανθέων - Αύξηση της καρποφορίας - Διευκόλυνση της συγκομιδής 	100 – 125	15 – 20	20 – 25	Ψεκασμός φυλλώματος, 2 εβδομάδες πριν την αρχή της άνθησης (BBCH 53-57)	1 εφαρμογή

Παρατηρήσεις:

1. Μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε τεχνητά στραγγιζόμενα εδάφη στις καλλιέργειες των μηλοειδών και των πυρηνόκαρπων.
2. Πολύ μεγάλα και ώριμα ή πολύ εύρωστα δένδρα ενδέχεται να μην ελεγχθούν ικανοποιητικά.
3. Μην το χρησιμοποιείτε όταν τα δέντρα βρίσκονται υπό συνθήκες stress ούτε σε πολύ νεαρά και πρόσφατα φυτεμένα δένδρα που απαιτούν έντονη βλαστική ανάπτυξη.
4. Μην το εφαρμόζετε όταν φυσάει, για να αποφευχθεί η διασπορά ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες καλλιέργειες.
5. Μην το εφαρμόζετε σε οπωρώνες όπου συγκαλλιεργούνται ετήσια φυτά.
6. Σε καλλιέργειες όπου παρατηρείται κάποια καθυστέρηση στην έκπτυξη των οφθαλμών του προηγούμενου έτους, θεωρείται σκόπιμο να ελαττωθεί η δοσολογία κατά το δεύτερο έτος ή ακόμα και να μη χρησιμοποιηθεί καθόλου το PACLOT NEW έως ότου τα φυτά αποκτούν την επιθυμητή ευρωστία.

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά, Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο)	Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής
Μηλιά, Αχλαδιά	60 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: ---

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκάστικό υγρό από τα φύλλα

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

10. Συνδυαστικότητα:

Σε οινοποιήσιμα σταφύλια μη συνδυάζεται το προϊόν με μυκητοκτόνα της οικογένειας των τριαζολών.

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS08



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

- P405+102** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
- P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- P201** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- P501** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- P280** Φορέστε προστατευτικά γάντια/προστατευτικό ρουχισμό.
- SP1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).
- SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης **10 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπουνί. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 1401

E. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Να φυλάσσεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

Z. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία: 27/04/2021

Σφραγίδα

.....
(Μάκης Αντωνιάδης)
για Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας