



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011  
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. 4471-P (Έντυπο 03) για χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου σε φυτοπροστατευτικό προϊόν και την αίτηση με αρ. 4202-P για ανανέωση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος παράλληλου εμπορίου

χορηγείται άδεια παράλληλου εμπορίου στο φυτοπροστατευτικό προϊόν EL PASO με τα ακόλουθα στοιχεία:

**A) Γενικά στοιχεία άδειας**

1. Αριθμός Άδειας:

3906-P

Ημερομηνία ανανέωσης άδειας:

30/04/2022

Ημερομηνία λήξης άδειας:

30/04/2024

2. Κάτοχος της άδειας:

L. Lambrou Agro Ltd

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

L. Lambrou Agro Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

L. Lambrou Agro Ltd

## Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

2. Μορφή:

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

5. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες / Δοχεία	50κ.εκ., 500κ.εκ., 1Λ, 5Λ	PET , PE , COEX

## Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

4. Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

#### Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Ακαρεοκτόνο και εντομοκτόνο που δρα δια επαφής και από στομάχου.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας καλά και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη		
<b>Μελιτζάνα</b> (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	<i>Tetranychus sp</i> <i>Panonychus ulmi</i>	100 – 125	100 – 160	100 – 200	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών (2 – 3 ανά φύλλο)  <u>Υπαίθρου</u> : Η εφαρμογή να γίνεται μέχρι τέλος της άνθησης	Μία εφαρμογή
<b>Τομάτα</b> (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	<i>Tetranychus sp</i> <i>Panonychus ulmi</i> Παραμορφωτικό Άκαρι ( <i>Aculops lycopersici</i> )					
<b>Κολοκυθάκια</b> (Θερμοκηπίου)	<i>Tetranychus sp</i> Whiteflies <i>Bemisia sp</i> <i>Trialeurodes sp</i>	100 – 125	100 – 160	100 – 200	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών (2 – 3 ανά φύλλο)	
<b>Αγγούρια</b> (Θερμοκηπίου)	<i>Tetranychus sp</i> <i>Panonychus ulmi</i> Whiteflies <i>Bemisia sp</i> <i>Trialeurodes sp</i>	100 – 125	100 – 160	100 – 200		
<b>Πιπεριά</b> (Θερμοκηπίου)	<i>Tetranychus sp</i> Whiteflies <i>Bemisia sp</i> <i>Trialeurodes sp</i>	100 – 125	100 – 160	100 – 200	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών (2 – 3 ανά φύλλο)	
<b>Φράουλα</b> (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	<i>Tetranychus sp</i> <i>Panonychus ulmi</i>	100 – 125	100 – 200	100 – 200		
<b>Φασόλια με λοβό</b> (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	<i>Tetranychus sp</i> <i>Panonychus ulmi</i>	150 – 200	<u>Υπαίθρου</u> 80 – 100	100 – 200		
			<u>Θερμοκηπίου</u> 100 – 160			

<b>Δαμασκηιά</b>	<i>Tetranychus sp</i> <i>Panonychus ulmi</i>	100 – 125	100 – 160	100 - 150		
<b>Ροδακινιά</b> <b>Νεκταρινιά</b>	<i>Tetranychus sp</i> <i>Panonychus ulmi</i>	100 – 125	100 – 160	100 - 150	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών (2 – 3 ανά φύλλο)	Μία εφαρμογή
<b>Εσπεριδοειδή</b>	<i>Tetranychus sp</i> <i>Panonychus ulmi</i> Τζιτζικάκια ( <i>Empoasca sp</i> )	100	100 – 200	100 – 200		
<b>Μηλοειδή</b> (Μηλιά, Αχλαδιά)	<i>Tetranychus sp</i> <i>Panonychus ulmi</i>	100 – 125	100 – 160	100 – 200		
<b>Αχλαδιά</b>	<i>Psylla sp</i>					
<b>Αμπέλι</b>	<i>Tetranychus sp</i> <i>Panonychus ulmi</i> Τζιτζικάκια ( <i>Empoasca sp</i> )	80 – 100	100 – 120	100		
<b>Καλλωπιστικά</b> (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	<i>Tetranychus sp</i> <i>Panonychus ulmi</i>	100 – 125	100 – 160	100 – 200		

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Μελιτζάνα, Κολοκυθάκια, Φράουλα, Φασόλια με λοβό, Αγγούρια, Πιπεριά, Τομάτα,	7 ημέρες
Δαμασκηιά, Εσπεριδοειδή, Ροδακινιά, Νεκταρινιά	14 ημέρες
Μηλοειδή	21 ημέρες
Αμπέλι	28 ημέρες
Καλλωπιστικά	Μ. Ε

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 21A**

Να μην εφαρμόζεται περισσότερο από μία φορά ανά καλλιεργητική περίοδο

**Απαγορεύονται οι εφαρμογές σε υψηλές καλλιέργειες με υψηλό κίνδυνο ψεκαστικού νέφους, π.χ. φερόμενος σε ελκυστήρα ψεκαστήρας με εκτόξευση υποβοηθούμενη από ρεύμα αέρος και ψεκαστήρας χειρός.**

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

---

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

---

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

24 ώρες

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής .

10. Συνδυαστικότητα:

---

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS07



GHS09

## 12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

- H317** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- H332** Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
- H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

## 13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

- P405+P102** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
  - P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
  - P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
  - P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
  - SP1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
  - SPe3** Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς θα πρέπει να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη 40 μέτρων (εκ των οποίων **20 μέτρα** φυτική ζώνη ανάσχεσης (vegetated buffer strip) από επιφανειακά ύδατα και να χρησιμοποιείται ακροφύσια 95% μειωμένης διασποράς
  - SPe3** Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα, να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** μέχρι μη γεωργική γη.  
Φοράτε προστατευτική ενδυμασία όταν χειρίζεστε το σκεύασμα.  
Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
- EUH 401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

## 14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

- P302+P352** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι
  - P304+ P340** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
  - P305+ P351+ P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
  - P301+P310** Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα λερωμένα ρούχα. Ξεπλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό και σαπούνι και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401**

## Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο

**ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με σκίσιμο ή τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:**

**ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**

Η άδεια παράλληλου εμπορίου χορηγείται στο προϊόν EI Paso που είναι εγκεκριμένο στην Βουλγαρία με εμπορικό όνομα Danitron 5SC και αριθμό έγκρισης 01115-PPP-3 και με κάτοχο άδειας την εταιρεία Nichino Europe

Το προϊόν αναφοράς στην Κύπρο βάση του οποίου χορηγείται η σχετική άδεια είναι το Kendo με αριθμό άδειας 1668.

Η εταιρεία L. Lambrou Agro Ltd, οφείλει να τηρά αρχείο (Αρχείο Εισαγωγής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Παράλληλου Εμπορίου) με τις ποσότητες του σκευάσματος EI Paso που εισάγονται στην Κύπρο (θα περιλαμβάνει όλα τα παραστατικά στοιχεία των εισαγωγών ανά παρτίδα σκευάσματος).

Το αρχείο θα είναι άμεσα διαθέσιμο για έλεγχο από την αρμόδια Αρχή.

Για κάθε φορτίο του σκευάσματος EI Paso που εισάγεται στην Κύπρο θα πρέπει να χορηγείται η σχετική «Άδεια για Εισαγωγή Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος Παράλληλου Εμπορίου». Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η εισαγωγή του σκευάσματος στη χώρα.

Η ετικέτα του σκευάσματος θα φέρει ευανάγνωστα τη φράση «**ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**» με τα πλέον έντονα και μεγάλα γράμματα.

Η άδεια παράλληλου εμπορίου θα ανακληθεί:

- σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας του προϊόντος αυτού στην Βουλγαρία για λόγους ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας.

- σε περίπτωση κακού χειρισμού της άδειας παράλληλου εμπορίου από την εταιρεία L. Lambrou Agro Ltd, με στόχο την εισαγωγή ή τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων άλλων από αυτά για τα οποία χορηγήθηκε η παρούσα άδεια.

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία: .....10/05/2022..

.....  
(Ανδρούλα Γεωργίου)  
Διευθύντρια  
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα