



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021  
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 3773, ημερομηνίας 24/02/2016 για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος και

την επιστολή του αιτητή με ημ. 02/03/2016 για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ελλάδα και

τις αιτήσεις με αρ. 4022 και 4576 (Έντυπο 08) για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν GIBRUN 5SL... με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3241

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

31/08/2023

Ημερομηνία λήξης άδειας:

15/07/2026

2. Κάτοχος της άδειας:

AIFAR SPA

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

A&E STYLIANOU TECHNOCHIMIKI LTD

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

A&E STYLIANOU TECHNOCHIMIKI LTD

## Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Gibrun 5SL

2. Μορφή: SL (Πυκνό διάλυμα)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: Gibberellic acid: 5% β/ο (= 52,60 g/L)  
βοηθητικές ουσίες : 94,62% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: AIFAR SPA

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: AIFAR SPA

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: 1. AIFAR SPA  
2. ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε.

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη μέσα σε κουτί	20 κ.εκ., 50 κ.εκ., 80 κ.εκ., 100 κ.εκ., 125κ.εκ., 150 κ.εκ., 200 κ.εκ.	Φιάλη από HDPE, κουτί χάρτινο.
2	Φιάλη	20 κ.εκ., 50 κ.εκ., 80 κ.εκ., 100 κ.εκ., 125κ.εκ., 150 κ.εκ., 200 κ.εκ., 250 κ.εκ., 300 κ.ε., 400 κ.εκ., 500κ.εκ., 750 κ.εκ., 800 κ.εκ., 1Λ, 1.25Λ, 1.5Λ	Φιάλη από HDPE
3	Δοχείο	3Λ, 5Λ, 10Λ,15Λ και 20Λ	Δοχείο από HDPE.

## Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Gibberellic acid

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 93 % (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: AIFAR SPA

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: AIFAR SPA

## Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

### 1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Φυτορρυθμιστική ουσία (ρυθμιστής ανάπτυξης), η οποία επηρεάζει την ποσότητα, την ποιότητα και το χρόνο συγκομιδής ανάλογα με την καλλιέργεια. Διεγείρει τη διαίρεση και την επιμήκυνση των κυττάρων.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες  
ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος

### 4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας καλά και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

#### **Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Συνιστάται τριπλό ξέπλυμα με νερό και απορρυπαντικό.



5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	κ.εκ./δεκ. μέγιστη		
Εσπεριδοειδή (Κλημεντίνες)	1. Για αύξηση της καρπόδεσης και της παραγωγής	20	150	30	1. Μέχρι 2 εφαρμογές στην πλήρη άνθηση μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 65-71). 2. Μία εφαρμογή όταν οι καρποί αλλάζουν χρώμα (BBCH 81).	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες (βλέπε Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής)
	2. Για παράταση του χρόνου συγκομιδής.					
Αμπέλι (Επιτραπέζιες, άσπερμες ποικιλίες)	Για αύξηση του μήκους του σαμπτιού και του μεγέθους των ραγών.	1 – 40	30 – 100	1 – 12	6 εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης μέχρις ότου οι ράγες αποκτήσουν μέγεθος 3 mm. (BBCH 60-77).	6 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 2 – 3 ημέρες (βλέπε Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής)
		8 – 20	80 – 100	8 – 16	Εφαρμογές από τη διόγκωση των ταξιανθιών μέχρις ότου οι ράγες αποκτήσουν μέγεθος 3 mm. (BBCH 55-75).	4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες (βλέπε Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής)
Αγκινάρα	Πρωίμηση και αύξηση της παραγωγής	20	80	16	Εφαρμογές από την εμφάνιση μέχρι την πλήρη ανάπτυξη της κεφαλής (BBCH 40-49)	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες (βλέπε Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής)

**Παρατηρήσεις:**

1) Στις επιτραπέζιες ένσπερμες ποικιλίες αμπελλιού, οι δύο πρώτες εφαρμογές (στη διόγκωση των ταξιανθιών και όταν έχουν πέσει το 40% των πυλιδίων) να γίνονται με δόση 8 κ.εκ./δεκάριο., η τρίτη εφαρμογή (στην έναρξη ανάπτυξης των καρπών) με δόση 12 κ.εκ./ δεκάριο και η τέταρτη εφαρμογή (όταν οι ράγες αποκτήσουν μέγεθος 3 mm) με δόση 16 κ.εκ./ δεκάριο.

2) Οι δόσεις εφαρμογής στο Αμπέλι μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες και τις συνθήκες ανάπτυξης.

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Δεν Απαιτείται	

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Ομάδα Τρόπου Δράσης: ----

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

----

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

----

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Δεν θα πρέπει να εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα:

---

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

---

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

--

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

**P102+405** Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.

**P270**

Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό».

**SP1**

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).

**EUH401**

«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».



#### 14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Απομακρύνετε προηγουμένως τους φακούς επαφής. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση κατάποσης: μην προκαλείτε εμετό. Μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα αν ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του. Συμβουλευτείτε γιατρό σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

Σε περίπτωση εισπνοής: μετακινείστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση δυσφορίας ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία..

**Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401**

#### E. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.

#### ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

#### Z. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: .....15/09/2023.....



Σφραγίδα

(Ανδρούλα Γεωργίου)  
Διευθύντρια  
Τμήματος Γεωργίας