



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011  
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4262 (Έντυπο 04) για χορήγηση άδειας σε φυτοπροστατευτικό προϊόν, για το οποίο υποβλήθηκε επιστολή πρόσβασης στα στοιχεία που υποβλήθηκαν για το πανομοιότυπο αδειοδοτημένο προϊόν Deltagri, με αριθμό άδειας 3080, την αίτηση με αρ. 629 (έντυπο 09) για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος, ως προς τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας και τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος και τις αιτήσεις με αρ. 3858 και 4326 (Έντυπο 08) για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **DELMUS** ως ακολούθως:

**A) Γενικά στοιχεία άδειας**

1. Αριθμός Άδειας:

3688

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

17/10/2022

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/10/2024

2. Κάτοχος της άδειας:

Arysta LifeScience Benelux Sprl

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

## B) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

Delmus

2. Μορφή:

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

deltamethrin: 2,5 % β/ο  
βοηθητικές ουσίες: 97,19 % β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Arysta LifeScience Benelux Sprl

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

1. Arysta LifeScience Ougree Production Sprl
2. Arysta LifeScience India Limited
3. Arysta Lifescience S.A.S
4. Chemark Zrt
5. IQV S.A
6. SBM Formulation
7. Schirm GmbH
8. STI Soflotechnica Italiana S.p.a
9. UPL Europe Ltd, H.B
10. Cerexagri (UPL Group), Bassens, Γαλλία
11. Cerexagri (UPL Group), Marseille, Γαλλία
12. UPL Ltd, India
13. UPL Ltd, Vapi, India
14. UPL Ltd, Gujarat, India
15. Laoting Yollo Bio-Technology Cp Ltd,

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. Arysta LifeScience Ougree Production Sprl
2. Arysta LifeScience India Limited
3. Arysta Lifescience S.A.S
4. Chemark Zrt
5. IQV S.A
6. SBM Formulation
7. Schirm GmbH
8. STI Soflotechnica Italiana S.p.a
9. UPL Europe Ltd, H.B
10. Cerexagri (UPL Group), Bassens, Γαλλία
11. Cerexagri (UPL Group), Marseille, Γαλλία
12. UPL Ltd, India
13. UPL Ltd, Vapi, India
14. UPL Ltd, Gujarat, India
15. Laoting Yollo Bio-Technology Cp Ltd,
16. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ, Ύψατο Θηβών
17. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Μάνδρα Αττικής
18. Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ Θεσ/νίκης

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

| A/A | Είδος           | Μέγεθος                                   | Υλικό           |
|-----|-----------------|---|-----------------|
| 1   | Φιάλες          | 100κ.εκ., 250κ.εκ.,<br>500κ.εκ, 1Λ και 5Λ | COEX HDPE/ EVOH |
| 2   | Δοχεία          | 5Λ και 10Λ                                | COEX HDPE/ EVOH |
| 3   | Φιάλες / Δοχεία | 500κ.εκ., 1Λ και 5Λ                       | PET             |

### Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

### Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες



ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

## 5. Φάσμα Δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής   | Εχθρός που ελέγχεται   | Δόσεις                      |                                 |                        | Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής                   | Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|---|--|
|   |  | κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.) | κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη |   |  |
| <b>Εσπεριδοειδή</b><br>-Πορτοκαλιά<br>-Λεμονιά<br>-Μανταρινιά<br>-Γκρέιπ-φρούτ<br>-Νερατζιά           | <b>Αφίδες</b><br><i>(Myzus persicae)</i>   | 30 – 50                     | 100                             | 30 – 50                | Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών | 1  |
|   | <b>Λεκάνιο</b><br><i>(Saissetia oleae)</i><br><b>Μύγα της Μεσογείου</b><br><i>(Ceratitis capitata)</i>   | 50                          |                                 | 50                     |   |  |
| <b>Ακρόδρυα</b><br>- Αμυγδαλιά<br>- Φιστικιά<br>- Φουντουκιά<br>- Καρυδιά<br>- Καστανιά               | <b>Αφίδες</b><br><i>(Hyalopterus spp.)</i>   | 30                          | 140                             | 42 – 50                | Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών | 2 με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 14 ημερών    |
|   | <b>Καρπόκαψα καρυδιάς</b><br><i>(Laspeyresia romonella)</i><br><b>Καρπόκαψα καστανιάς</b><br><i>(Laspeyresia splendana)</i><br><b>Ευρύτομο</b><br><i>(Eurytoma plotnicovi)</i> | 50                          | 100                             |                        |   |  |
|   |  |                             |                                 | 50                     | Με την έναρξη των πτήσεων των ακμαίων         |  |
| <b>Μηλοειδή</b><br>- Μηλιά<br>- Αχλαδιά<br>- Κυδωνιά<br>- Μουσμουλιά                                  | <b>Καρπόκαψα της μηλιάς</b><br><i>(Laspeyresia romonella)</i><br><b>Αφίδες</b><br><i>(Aphis pomi, Dysaphis plantaginea)</i><br><b>Ψύλλα μηλιάς</b><br><i>(Psylla mali)</i>     | 30 – 50*                    | 100 – 140                       | 30 – 50                | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών        | 2 με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 14 ημερών    |
|   | <b>Φυλλοδέτες</b><br><i>(Adoxophyes orana, Archips rosanus)</i>  | 35                          |                                 | 35 – 50                |   |  |
|   | <b>Ψύλλα αχλαδιάς</b><br><i>(Psylla pyri)</i>  | 50                          |                                 | 100                    |   |  |
| <b>Πυρηνόκαρπα</b><br>-Ροδακινιά<br>-Νεκταρινιά<br>-Βερικοκιά<br>-Δαμασκηλιά<br>-Κερασιά<br>-Βυσσινιά | <b>Φυλλοδέτες</b><br><i>(Adoxophyes orana, Archips rosanus),</i><br><b>Ανάρσια</b> <i>(Anarsia lineatella)</i>   | 35                          | 100 – 140                       | 35 – 49                | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών        | 1  |
|   | <b>Ραγολέπιδα</b><br><i>(Rhagoletis cerasi)</i>  | 40 – 50                     |                                 | 40 – 70                |   |  |
|   | <b>Μύγα της μεσογείου</b><br><i>(Ceratitis capitata)</i>   | 50                          |                                 | 50 – 70                |   |  |
|   | <b>Αφίδες</b><br><i>(Myzus persicae, Myzus cerasi, Hyalopterus pruni)</i><br><b>Καρπόκαψα της Δαμασκηλιάς</b><br><i>(Laspeyresia funebrana)</i>                                | 30 – 50                     |                                 | 30 – 70                |   |  |

|   |  |   |                              |                            |  |  |
|---|--|---|------------------------------|----------------------------|--|--|
| <b>Αμπέλι **</b>  | <b>Ευδεμίδα</b><br>( <i>Lobesia botrana</i> )  | 50<br>(1 <sup>η</sup> γενεά)<br>50 – 70<br>(2 <sup>η</sup> και 3 <sup>η</sup><br>γενεά) | 100                          | 50 – 70                    | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών   | 3 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 14 ημερών  |
|   | <b>Κοχυλίδα</b><br>( <i>Clysia ambiguella</i> )  | 50 – 70   |                              | 50 – 70                    |  |  |
|   | <b>Τζιτζικάκια</b><br>( <i>Empoasca spp.</i> )   | 50  |                              | 50                         |  |  |
| <b>Φράουλα</b><br>(Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)  | <b>Αφίδες</b><br>( <i>Aphis spp.</i> )   | 50  | 50 – 100                     | 25 – 50                    | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών   | 3 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 14 ημερών  |
| <b>Ελιά</b>   | <b>Δάκος</b> ( <i>Bactrocera oleae</i> )   | 50  | 100 – 140                    | 50 – 70                    | Σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες  | 1  |
|   | <b>Λεκάνιο</b> ( <i>Saissetia oleae</i> )  |   |                              |                            | Με την εμφάνιση των προσβολών  |  |
|   | <b>Βαμβακάδα</b> ( <i>Euphyllura spp.</i> )  | 30 – 50   |                              | 30 – 70                    |  |  |
|   | <b>Πυρηνοτρήτης</b><br>( <i>Prays oleae</i> )  | 30<br>(ανθόβια)<br><br>50<br>(καρπόβια)   |                              | 30 – 70                    | Στην έναρξη της άνθησης (ανθόβια γενεά) και αμέσως μετά την καρπόδεση (καρπόβια γενεά) μεταξύ ωοθεσίας και εκκόλαψης των ωών και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες |  |
| <b>Κρεμμύδι Πράσο Σκόρδο</b>  | <b>Θρίπας</b> ( <i>Thrips tabaci</i> )<br><b>Κοφτοσκούληκα</b> ( <i>Agrotis spp.</i> )   | -   | 40 – 50                      | 30 – 50                    | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών   | 3 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 14 ημερών  |
| <b>Σολανώδη</b><br><br>-Τομάτα<br>-Πιπεριά<br>-Μελιτζάνα<br>(Υπαίθρου)<br><br>-Πιπεριά<br>(Θερμοκηπίου) | <b>Πράσινο σκουλήκι</b><br>( <i>Helicoverpa armigera</i> )<br><b>Σποντόπτερα</b> ( <i>Spodoptera spp.</i> )<br><b>Δορυφόρος</b><br>( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> ,<br><b>Αφίδες</b><br>( <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i> ,<br><i>Anuraphis cardui</i> , <i>Hyperomyzus lactucae</i> ) | 50  | 60 – 100 (Υ)<br>60 – 140 (Θ) | 30 – 50 (Υ)<br>30 – 70 (Θ) | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών   | <b>Υπαίθρου:</b><br>3 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 14 ημερών<br><br><b>Θερμοκηπίου:</b><br>4 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 7 ημερών |
|   | <b>Βρωμούσα</b> ( <i>Nezara viridula</i> )   | 30  |                              | 18 – 30 (Υ)<br>18 – 42 (Θ) |  |  |
|   | <b>Αλευρώδης</b><br>( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )   | 70 (Θ)  |                              | 42 – 70 (Θ)                |  |  |
|   | <b>Κοφτοσκούληκα</b> ( <i>Agrotis spp.</i> )   | -   |                              | 30 – 50 (Υ)                |  |  |

|   |   |    |                            |                            |  |   |
|---|---|----|----------------------------|----------------------------|--|---|
| <b>Σολανώδη</b><br>-Τομάτα<br>-Μελιτζάνα<br>(Θερμοκηπίου)   | <b>Πράσινο σκουλήκι</b><br><i>(Helicoverpa armigera)</i><br><b>Σποντόπτερα</b><br><i>(Spodoptera spp.)</i><br><b>Δορυφόρος</b><br><i>(Leptinotarsa decemlineata)</i><br><b>Αφίδες</b><br><i>(Myzus persicae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui, Hyperomyzus lactucae)</i>  | 50 | 60 – 100 (Θ)               | 30 – 50 (Θ)                | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών | 4 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 7 ημερών  |
|   | <b>Βρωμούσα</b> <i>(Nezara viridula)</i>  | 30 | 60 – 140 (Θ)               | 18 – 42 (Θ)                |  |   |
| <b>Κολοκυνθοειδή</b><br>-Αγγούρι<br>-Αγγουράκι<br>-Κολοκύθι<br>-Πεπόνι<br>-Καρπούζι<br>(Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) | <b>Πράσινο σκουλήκι</b><br><i>(Helicoverpa armigera)</i><br><b>Σποντόπτερα</b><br><i>(Spodoptera spp.)</i><br><b>Αφίδες</b><br><i>(Aphis spp., Hyperomyzus lactucae)</i>  | 50 | 60 – 100(Υ)<br>60 – 140(Θ) | 30 – 50 (Υ)<br>30 – 70 (Θ) | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών | 3 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 7 ημερών  |
|   | <b>Κοφτοσκούληκα</b><br><i>(Agrotis spp.)</i>   | -  | 60 – 100 (Υ)               | 30 – 50 (Υ)                |  |   |
| <b>Λάχανο</b><br>(εκτός από το κινέζικο)<br><br><b>Κουνουτίδι</b><br><br><b>Μπρόκολο</b>                          | <b>Πιερίδα</b> <i>(Pieris spp.)</i><br><b>Μαμέστρα</b> <i>(Mamestra brassicae)</i><br><b>Πλούζια</b> <i>(Plusia gamma)</i><br><b>Πράσινο σκουλήκι</b><br><i>(Helicoverpa armigera)</i><br><b>Σποντόπτερα</b><br><i>(Spodoptera littoralis)</i><br><b>Αφίδες</b><br><i>(Myzus persicae, Brevicoryne brassicae)</i><br><b>Κοφτοσκούληκα</b> <i>(Agrotis spp.)</i> | -  | 50                         | 30 – 50                    | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών | 2 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 14 ημερών |
|   | <b>Πλουτέλλα</b> <i>(Plutella xylostella)</i>   |    |                            | 50                         |  |   |
| <b>Ψυχανθή</b><br>-Φασόλια<br>-Κουκιά<br>-Φακή<br>-Ρεβίθια  | <b>Πράσινο σκουλήκι</b><br><i>(Helicoverpa armigera)</i><br><b>Αφίδες</b><br><i>(Myzus persicae, Aphis spp.)</i><br><b>Κοφτοσκούληκα</b><br><i>(Agrotis spp.)</i>   | -- | 50 – 100                   | 30 – 50                    | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών | 2 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 14 ημερών |

|   |   |    |          |         |  |   |
|---|---|----|----------|---------|--|---|
| <b>Μαρούλι</b><br>(Υπαίθρου)                            | <b>Πράσινο σκουλήκι</b><br>( <i>Helicoverpa armigera</i> )<br><b>Σποντόπτερα</b><br>( <i>Spodoptera exigua</i> )<br><b>Άλτης</b><br>( <i>Chrysodeixis chalcites</i> ),<br><b>Αφίδες</b><br>( <i>Hyperomyzus lactucae</i> , <i>Aphis</i> spp.,<br><i>Nasonovia ribis-nigri</i> ) | 50 | 50 – 100 | 25 – 50 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών | 3 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 7 ημερών  |
|   | <b>Κοφτοσκούληκα</b><br>( <i>Agrotis</i> spp.)  | -- |          | 30 – 50 |  |   |
| <b>Μαϊντανός</b><br><b>Φύλλα Σέλινου</b><br><b>Ρόκα</b> | <b>Αφίδες</b> ( <i>Aphis</i> spp.)<br><b>Σποντόπτερα</b> ( <i>Spodoptera exigua</i> )<br><b>Μαμέστρα</b> ( <i>Mamestra</i> spp.)<br><b>Άλτης</b> ( <i>Chrysodeixis chalcites</i> )  | 50 | 70       | 35      | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών | 2 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 14 ημερών |
|   | <b>Κοφτοσκούληκα</b> ( <i>Agrotis</i> spp.)   | -- |          | 30 – 50 |  |   |
| <b>Μπιζέλια Φρέσκα</b>                                  | <b>Αφίδα των μπιζελιών</b><br>( <i>Acyrtosiphon pisum</i> )<br><b>Σιτόνα</b> ( <i>Sitona</i> spp.)  | -- | 100      | 25      | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών | 2 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 14 ημερών |
|   | <b>Αφίδα των κουκιών</b><br>( <i>Aphis fabae</i> )<br><b>Κάμπια των μπιζελιών</b><br>( <i>Laspeyresia nigricana</i> )<br><b>Θρίπας</b><br>( <i>Thrips angusticeps</i> )<br><b>Κοφτοσκούληκα</b> ( <i>Agrotis</i> spp.)  |    |          | 30 – 50 |  |   |
| <b>Αγκινάρα</b>   | <b>Κασσίδα</b><br>( <i>Cassida</i> spp.)  | -- | 100      | 50      | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών | 3 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 7 ημερών  |
|   | <b>Προντένια</b><br>( <i>Spodoptera litura</i> )<br><b>Αφίδες</b><br>( <i>Anuraphis cardui</i> , <i>Myzus persicae</i> )  |    |          | 30 – 50 |  |   |
| <b>Πατάτα</b>   | <b>Δορυφόρος</b><br>( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> )  | -- | 60       | 50      | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών | 3 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 14 ημερών |
|   | <b>Σποντόπτερα</b><br>( <i>Spodoptera littoralis</i> )  |    |          | 30 – 50 |  |   |

|   |   |    |          |         |  |  |
|---|---|----|----------|---------|--|--|
| <b>Καπνός</b>                                     | <b>Θρίπας</b><br>( <i>Thrips tabaci</i> )<br><b>Κοφτοσκούληκα</b><br>( <i>Agrotis spp.</i> )  | -- | 50 – 100 | 30 – 50 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών | 3 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 7 ημερών       |
| <b>Ζαχαρότευτλα</b><br><b>Παντζάρι</b>            | <b>Αφίδες</b><br>( <i>Aphis fabae, Myzus persicae</i> )<br><b>Μύγα των τεύτλων</b><br>( <i>Pegomya spp.</i> )<br><b>Άλτης</b><br>( <i>Chaetocnema tibialis</i> )<br><b>Σποντόπτερα</b><br>( <i>Spodoptera spp.</i> )<br><b>Κοφτοσκούληκα</b><br>( <i>Agrotis spp.</i> )   | -- | 50       | 30 – 50 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών | 1  |
|   | <b>Κασσίδα</b><br>( <i>Cassida nebulosa</i> )   | -- |          | 50      |  |  |
| <b>Αραβόσιτος***</b>                              | <b>Πυραλίδα</b><br>( <i>Ostrinia nubilalis</i> )<br><b>Σεζάμια</b><br>( <i>Sesamia nonagrioides</i> )<br><b>Πράσινο σκουλήκι</b><br>( <i>Helicoverpa armigera</i> )<br><b>Σποντόπτερα</b><br>( <i>Spodoptera spp.</i> )<br><b>Αφίδες</b><br>( <i>Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae</i> )<br><b>Κοφτοσκούληκα</b><br>( <i>Agrotis spp.</i> ) | -- | 60       | 30 – 50 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών | 3 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 14 – 21 ημερών |
|   | <i>Diabrotica virgifera</i>   | -- |          | 50      |  | 3 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 7-14 ημερών    |
| <b>Σιτηρά</b><br>(Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη) | <b>Αφίδες</b><br>( <i>Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae</i> )<br><b>Κοφτοσκούληκα</b><br>( <i>Agrotis spp.</i> )  | -- | 40 – 60  | 30 – 50 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών | 1  |
| <b>Μηδική</b>                                     | <b>Αφίδα των μπιζελιών</b><br>( <i>Acyrtosiphon pisum</i> )<br><b>Σκαθάρι των μπιζελιών</b><br>( <i>Apion pisi</i> )<br><b>Φυτονόμος</b><br>( <i>Hypera postica</i> )   | -- | 40       | 25      | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών | 2 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 14 ημερών      |



|  |  |    |          |           |  |   |
|--|--|----|----------|-----------|--|---|
| Βαμβάκι                                    | <b>Ρόδινο σκουλήκι</b><br><i>(Pectinophora gossypiella)</i><br><b>Πράσινο σκουλήκι</b><br><i>(Helicoverpa armigera)</i>                    |    |          | 50 – 70   | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών | 2 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 14 ημερών |
|  | <b>Αλευρώδης</b><br><i>(Bemisia tabaci)</i><br><b>Τζιτζικάκια</b><br><i>(Empoasca spp.)</i>  | -- | 30 – 50  | 50        |  |   |
|  | <b>Σποντόπτερα</b><br><i>(Spodoptera spp.)</i><br><b>Αφίδα</b><br><i>(Aphis gossypii)</i><br><b>Κοφτοσκούληκα</b><br><i>(Agrotis spp.)</i> |    |          | 30 – 50   |  |   |
| Καλλωπιστικά<br>(Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) | <b>Αφίδες</b><br><i>(Myzus spp.)</i><br><b>Θρίπες</b><br><i>(Thrips tabaci)</i>  | 50 | 50 – 100 | 25 – 50   | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών | 3 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 7 ημερών  |
|  | <b>Φυλλοδέτες</b><br><i>(Archips spp., Adoxophyes spp., Pandemis spp.)</i>   | 35 |          | 17,5 – 35 |  |   |
|  | <b>Αλευρώδης</b><br><i>(Trialeurodes vaporariorum)</i>   | 70 | 70       | 50        |  |   |

### Παρατηρήσεις

- \* **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Στα μηλοειδή η δόση των 50κ.εκ. σκευάσματος /100 Λίτρα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 lt/δεκάριο) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50κ.εκ. σκευάσματος στο δεκάριο. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει υπέρβαση του Μέγιστου Επιτρεπόμενου Ορίου Υπολειμμάτων.
- \*\* Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν.
- \*\*\* Η εφαρμογή του Delmus στο καλαμπόκι οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia spp.* και *Sesamia spp.* στην περίπτωση που η προσβολή αυτή υπάρχει

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

| Καλλιέργειες  | Χρόνος Ασφάλειας |
|---|------------------|
| Βαμβάκι, Ζαχαρότευτλα, Παντζάρι Εσπεριδοειδή, Ακρόδρυα, Αραβόσιτος, Σιτηρά  | 30 ημέρες        |
| Μηδική  | 14 ημέρες        |
| Αμπέλι, Ελιά, Πατάτα, Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο, Λάχανο, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Φασόλια, Κουκιά, Φακή, Ρεβίθια, Μπιζέλια, Καπνός, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά, Βυσσινιά, Φύλλα Σέλινου, Μαϊντανός | 7 ημέρες         |
| Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Μαρούλι, Φράουλα, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Ρόκα, Αγκινάρα  | 3 ημέρες         |

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 3A**

- Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.
- Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς.
- Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.
- Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με το Delmus. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων με τη γρήγορη μέθοδο της αντικειμενοφόρου πλάκας, **ειδικό σύστημα μικροδοκιμής**, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
- Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.
- **Για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, το αμπέλι και άλλες υπαίθριες καλλιέργειες με ύψος μεγαλύτερο από 50 cm απαιτείται χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%**

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:






9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας

10. Συνδυαστικότητα:

----

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| GHS02   | GHS07   | GHS08   | GHS09  | GHS05   |
| <b>ΚΙΝΔΥΝΟΣ</b>   |   |   |  |   |

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

**H226** Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

**H302** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

**H304** Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

**H315** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

**H318** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

**H336** Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

### 13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

- P102** Μακριά από παιδιά
- P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο
- P270** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν
- P210** Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες/ φλόγες/ θερμές επιφάνειες- Μην καπνίζετε
- P261** Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα
- P264** Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά τον χειρισμό
- P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο.
- P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα
- P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον
- «Οι εργάτες να μην εισέρχονται στο πεδίο εφαρμογής πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια.»
- «Οι εργάτες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια αν εισέλθουν στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή.»
- Sp1** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του
- Spe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:
- **5 μέτρων** για όλες τις υπαίθριες καλλιέργειες εκτός από τις δενδρώδεις και τα αμπέλια ή καθόλου απέκαστη ζώνη προστασίας με τη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%
  - 15 μέτρων** για τις δενδρώδεις καλλιέργειες με τη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%
- Δεν απαιτείται απέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά νερά για τα αμπέλια με τη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%.
- Spe3** Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** για τις υπαίθριες καλλιέργειες και καλλιέργειες με ύψος μικρότερο από 50 cm (ή καθόλου απέκαστη ζώνη προστασίας με χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%) από την μη γεωργική γη.
- Δεν απαιτείται απέκαστη ζώνη προστασίας από την μη γεωργική γη για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, το αμπέλι κ.α. καλλιέργειες με ύψος μεγαλύτερο από 50 εκ. με τη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%.
- Spe8** **Επικίνδυνο για τις μέλισσες.** Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικοινωνίας μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.
- Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες.**
- EUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

#### 14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

- Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
  - Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι
  - Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
  - Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΕΜΕΤΟ.

#### Πληροφορίες για το γιατρό: Θεραπευτικά μέτρα:

Επιτόπιος χειρισμός: συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία. Μετά από επαφή με τα μάτια, ενστάλαξη τοπικά αναισθητικών σταγόνων π.χ. 1% amethocaine hydrochloride. Χορηγήστε αναλγητικά αν χρειάζεται. Δεν υπάρχει αντίδοτο.

Αντιμετώπιση σπασμών: Χορηγήστε diazepam: για ενήλικες 5-10 mg ενδοφλεβίως. Χορηγήστε όσο χρειάζεται ώστε να ηρεμήσει πλήρως ο παθών. Για παιδιά 2.5mg ενδοφλεβίως.

#### Αντενδείξεις: ατροπίνη και παράγωγα αδρεναλίνης

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

#### Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, και καλά αεριζόμενο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως

#### ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα με κατάλληλο μηχανισμό (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

#### Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία: 17/10/2022..



(Ανδρούλα Γεωργίου)  
Διευθύντρια  
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα