



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011  
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4367 (έντυπο 04), για χορήγηση άδειας σε φυτοπροστατευτικό προϊόν, για το οποίο υποβλήθηκε επιστολή πρόσβασης στα στοιχεία που υποβλήθηκαν για το πανομοιότυπο αδειοδοτημένο προϊόν Halozan με αριθμό άδειας 2981 και την αίτηση με αρ. 3994 (έντυπο 08) για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **SALOKTON** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3788

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

31/05/2021

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/05/2024

2. Κάτοχος της άδειας:

Sharda Cropchem España S.L

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

L. Lambrou Agro Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

L. Lambrou Agro Ltd

## Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

2. Μορφή:

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κουτί με εσωτερική σακούλα	100γρ., 200γρ., 500γρ., 2x 500γρ., και 1Kg	Κουτί χάρτινο με εσωτερικό σακίδιο πολυαιθυλενίου.
2	Σακούλα	5Kg, 10Kg, 20Kg και 25Kg	Σακούλα πολυαιθυλενίου ή σύνθετο υλικού PE/PET, τυπωμένη

## Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

## Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

### 1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Κοχλιολειματοκτόνο για την καταπολέμηση σαλιγκαριών και γυμνοσαλιάγκων.  
Δρα από στομάχου.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες  
ερασιτέχνες χρήστες



### 3. Τρόπος Εφαρμογής:

Σκορπίζεται με κατάλληλους μηχανικούς διανομείς ή πεταχτά με το χέρι γύρω από τα φυτά και τα δένδρα. Εφαρμόζεται και στη γραμμή σποράς σε πλάτος 20εκ. ή σε λωρίδες γύρω από τις καλλιέργειες για να εμποδίσει τη μετανάστευση των σαλιγκαριών από άλλες περιοχές

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

-----

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόση κιλά /δεκ. max.	Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
Γενικές εφαρμογές σε όλες τις καλλιέργειες	Κοχλίες (σαλιγκάρια)  Λείμακες (γυμνοσάλιαγκες)	0,7 – 1 Kg	Εφαρμογή μόλις εμφανιστούν οι κοχλίες και οι λείμακες ή με τα πρώτα συμπτώματα στα φυτά, κατά προτίμηση το απόγευμα, σε υγρό έδαφος	3
<p><b>Παρατηρήσεις:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Οι μεγαλύτερες δόσεις συνιστώνται όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός σαλιγκαριών και σοβαρή προσβολή. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες η ποσότητα του σκευάσματος ανά δέντρο είναι περίπου 30gr.</li> <li>• Η εφαρμογή του φαρμάκου γίνεται την άνοιξη ή το φθινόπωρο όταν τα σαλιγκάρια είναι σε δραστηριότητα.</li> <li>• Να αποφεύγεται η εφαρμογή όταν αναμένεται βροχή.</li> <li>• Σε συνθήκες θερμοκηπίου να αποφεύγεται το πότισμα για λίγες μέρες μετά την εφαρμογή του δολώματος.</li> </ul>				



6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
---	---

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- Χρησιμοποιείται μόνο του.
- Μην το εφαρμόζεται αντίθετα στον άνεμο
- Η δράση του δεν επηρεάζεται από βροχή ή από υγρές συνθήκες.
- Κατά την εφαρμογή το προϊόν να μην έρχεται σε επαφή με τα εδάφιμα μέρη των φυτών που είναι έτοιμα προς κατανάλωση.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

1. κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την περιοχή εφαρμογή του δολώματος για 14 ημέρες
2. κρατήστε τα κοτόπουλα μακριά από την περιοχή εφαρμογή του δολώματος για 7 ημέρες

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα:

Να χρησιμοποιείται μόνο του

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

