



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4655 (Έντυπο 05), ημερομηνίας 06/12/2023 για ανανέωση της άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το Άρθρο 43 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας από το κράτος μέλος για την αξιολόγηση,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **TOUCHDOWN PREMIUM 36 SL**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

2604

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

16/12/2023

Ημερομηνία λήξης άδειας:

Θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης βάσει του Άρθρου 43

2. Κάτοχος της άδειας:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια)

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον
κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια)

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Touchdown Premium 36 SL

2. Μορφή: Πυκνό διάλυμα (SL)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Glyphosate: 36 % β/ο
(υπό μορφή αμμωνιακού άλατος)
Βοηθητικές ουσίες: 70,1 % (β/β)

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

- 1) Syngenta Chemicals BV, Seneffe, Βέλγιο
- 2) Phyteurop, Montreuil-Bellay, Γαλλία
- 3) Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co., Nantong Jiangsu, Κίνα
- 4) Sichuan Leshan Fuhua Tongda Agro-chemical Technology Co., Ltd., Sihuan Province, Κίνα
- 5) Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd., Zhejiang, Κίνα

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

- 1) Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ, Οινόφυτα, Ελλάδα
- 2) Syngenta Chemicals BV, Seneffe, Βέλγιο
- 3) Phyteurop, Montreuil-Bellay, Γαλλία
- 4) Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co., Nantong Jiangsu, Κίνα
- 5) Sichuan Leshan Fuhua Tongda Agro-chemical Technology Co., Ltd., Sihuan Province, Κίνα
- 6) Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd., Zhejiang, Κίνα

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	100 κ.εκ έως 1 λίτρο	PET, HDPE, HDPE/PA, f-HDPE
2	Δοχεία	5 έως 20 λίτρα	PET, HDPE

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:
2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:
3. Παρασκευαστής της δ.ο.:
4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων και πολυετών αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Απορροφάτε από το φύλλωμα των ζιζανίων και μεταφέρεται γρήγορα σε ολόκληρο φυτό. Στο βιοχημικό επίπεδο εμποδίζει την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό/δεκάριο, χωρίς να έρθουν σε επαφή τα σταγονίδια με τα διάφορα μέρη των καλλιεργειών

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Ζιζάνιο που ελέγχεται	Δόσης	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
	Ογκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	Κ.ΕΚ. σκ./δεκ. μέγιστη	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής εφαρμογών
Εσπεριδοειδή: - Πορτοκαλιά - Μανταρινά - Λεμονά - Γκρέιπ-φρουτ - Κίτρινα	Επήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	150 – 200	Οταν τα ζιζάνια βρίσκονται στη ζωηρή βλάστηση
Μηλοειδή: - Μηλιά - Αχλαδιά	Πολυετή αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια Κύπερη (Cyperus sp.)	500 – 750	
Πυρηνόκαρπα: -Βερικοκιά -Ροδοκινά - Κερασία	Βέλιουρας (Sorghum halepense)	20 – 40	Οταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή
Αμπέλια (επιπραπέζια και οινοποιήσιμα)		500	
Ελιές (ελαιοποιήσιμες & επιπραπέζιες συγκομιζόμενες μόνο από το δέντρο)	Αγριάδα (Cynodon dactylon) Περικοκλάδα (Convolvulus arvensis)	750	

Πεδίο Εφαρμογής	Ζιζάνιο που ελέγχεται	Δόσεις	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	Κ.ΕΚ. σκ./δεκ. μέγιστη	Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο	Μέγιστος αρ.
Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για στοπούρα	Επήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	150 – 200			Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στη ζωηρή βλαστηση	1
	Πολυετή αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια Κύπερη (<i>Cyperus sp.</i>)	500 – 600			Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή	
	Βέλιουρας (<i>Sorghum halepense</i>)	500				
	Άγριάδα (<i>Cynodon dactylon</i>)	20 – 40		600	Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στη ζωηρή βλαστηση	
	Περικοκλάδα (<i>Convolvulus arvensis</i>)				Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή	
	Επήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια				Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή	
Ακαλλιέργητες εκτάσεις	Πολυετή αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια Ξυλώδεις θάμνοι, δέντρα, βάτα, κλπ.	600			Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο κοντά στην άνθηση ή κατά την άνθηση	

Παρατηρήσεις:

- Για την αγριάδα, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15 – 30 εκατοστά.
- Στις πολυετείς καλλιέργειες ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος, αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφύλλες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιπρέπεται μόνο σε εγκατεστημένες καλλιέργειες από το δεύτερο (2ο) έτος από την φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.
- Για τις επιπραπέζιες ελιές επιπρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δέντρο. Δεν επιπρέπεται εφαρμογή στις πεσμένες στο έδαφος ελιές.

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Μηλιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά Κερασιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Γκρέιπ Φρουτ, Κιτριά, Αμπέλι, Ελιές	7 ημέρες
Αγροί μετά την συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά, Ακαλλιέργητες εκτάσεις	Μη Εφαρμόσιμο

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: G

Να χρησιμοποιείτε κατάλληλες γεωργικές τεχνικές ώστε το σκεύασμα ή το ψεκασμένο έδαφος να μην έρχεται σε επαφή με τα διάφορα μέρη (καρποί, φύλλωμα, βλαστοί, κορμοί κ.α.) των καλλιέργειών και ιδιαίτερα των πυρηνοκάρπων.

- Δεν επιτρέπεται η βόσκηση ψεκασμένων ζιζανίων.
- Να μην γίνεται ψεκασμός, αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες.
- Δεν επιτρέπεται ο ψεκασμός με χρήση χειροκίνητων ψεκαστήρων για τις εφαρμογές σε ακαλλιέργητες εκτάσεις και αγρούς μετά την συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία glyphosate, ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 9 (πρώην G) κατά HRAC.

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κ.λ.π.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας στη δραστική ουσία του σκευάσματος.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Αφήστε να περάσουν μετά τον ψεκασμό τουλάχιστον επτά (7) ημέρες για τα ετήσια ζιζάνια ή δεκατέσσερις (14) ημέρες για τα πολυετή ζιζάνια πριν από την κατεργασία του εδάφους ή την επαναφύτευση

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:


Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

13. Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος».

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό»

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Spe3 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους για τις εφαρμογές από 500 – 750 κ.εκ. να αφήσετε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% ή χρησιμοποιείστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 75%.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη, την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εάν δεν αναπνέει κανονικά ή καθόλου, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός επιμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύνετε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια σας και την περιοχή κάτω από τα βλέφαρα με πολύ νερό για 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους. Επισκεφτείτε αμέσως γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, προστατευόμενο από τη ζέστη, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 16/02/2024



(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα