



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011  
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4427-P (Έντυπο 03) για χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου σε φυτοπροστατευτικό προϊόν,

χορηγείται άδεια παράλληλου εμπορίου στο φυτοπροστατευτικό προϊόν SPYRENOX με τα ακόλουθα στοιχεία:

**A) Γενικά στοιχεία άδειας**

1. Αριθμός Άδειας:

3857-P

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

11/02/2021

Ημερομηνία λήξης άδειας:

Θα καθορισθεί μετά την επανέγκριση του προϊόντος αναφοράς

2. Κάτοχος της άδειας:

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

## Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Spyrenox

2. Μορφή: Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

1. Cymoxanil: 2,85 % β/β
2. Copper: 16,00 % β/β
3. Fosetyl Al: 30,00 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: μέχρι 38,36 % β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: SIPCAM OXON S.P.A.

5. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλα μέσα σε κουτί	0.4 kg έως 5kg 5 kg (2 x 2.5 kg)	Σακούλες από χαρτί/ PET επιμεταλλωμένο/PE, ή σακούλες από πολυεστέρα/πολυαιθυλένιο. Οι σακούλες μέσα σε χάρτινο κουτί
2.	Σακούλες		Σακούλες από χαρτί/ PET επιμεταλλωμένο/PE, ή Σακούλες από πολυεστέρα/πολυαιθυλένιο
3.	Σάκοι	10Kg, 20Kg. 25Kg	Σάκοι χάρτινοι με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου ή αλουμινίου

## Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

1. Cymoxanil
2. Copper (from copper oxychloride)
3. Fosetyl Al

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

1. 97% (β/β) min
2. 57% (β/β) min
3. 98% (β/β) min

3. Παρασκευαστής των δ.ο.:

<b>Cymoxanil</b> – SIPCAM OXON S.P.A.
<b>Copper:</b> Isagro SpA
<b>Fosetyl Al:</b> SIPCAM OXON S.P.A.

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

<b>Cymoxani:</b> SIPCAM OXON S.P.A. Taizhou Bailly Chemical Co. Ltd., Κίνα
<b>Copper:</b> Isagro SpA
<b>Fosetyl Al:</b> Zhejiang Jiahua Chemical Co Ltd Shandong Dacheng Pesticide Co Ltd

## Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

### 1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Τοπικό διασυστηματικό μυκητοκτόνο που δρα εξ επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση, παρεμποδίζοντας την βλάστηση των σπορίων. Η ανάπτυξη των μυκήτων επηρεάζεται ως αποτέλεσμα της τοπικής διασυστηματικής δράσης του.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

### 3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμοί φυλλώματος

### 4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε στο ψεκαστικό την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε με νερό αναδεύοντας συνεχώς.

## 5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Ασθένεια που ελέγχεται	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	γρ./δεκ. μέγιστη		
<b>Αμπέλι</b>	<b>Περονόσπορος</b> ( <i>Plasmopara viticola</i> )	--	40 – 100	400 – 450	Μετά το πλήρες ξεδίπλωμα του 1 <sup>ου</sup> φύλλου. Ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται ανά 10-12 ημέρες μέχρι την αρχή του γυαλίσματος	3 - 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 – 12 ημέρες
<b>Πατάτα</b>	<b>Περονόσπορος</b> ( <i>Phytophthora infestans</i> )  <b>Αλτερνάρια</b> ( <i>Alternaria solani</i> )	--	60 – 80	400 – 450	Με το ξεδίπλωμα του 1 <sup>ου</sup> φύλλο του κύριου στελέχους (> 4 cm). Ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται ανά 10 – 12 ημέρες μέχρι το τέλος της ανθοφορίας της πρώτης ταξιανθίας	4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 – 12 ημέρες
<b>Τομάτα</b>	<b>Περονόσπορος</b> ( <i>Phytophthora infestans</i> )  <b>Αλτερνάρια</b> ( <i>Alternaria solani</i> )	--	60 – 80	400 – 450	Όταν το 1 <sup>ο</sup> αληθινό φύλλο στον κύριο βλαστό είναι τελείως ξετυλιγμένο. Ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται ανά 10 - 12 ημέρες μέχρις ότου το 10% των καρπών παρουσιάζουν ώριμο χρώμα.	4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 – 12 ημέρες
<b>Παρατηρήσεις:</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>Χρησιμοποιείτε την ελάχιστη δόση σε συνθήκες χαμηλής έντασης της μόλυνσης.</li> <li>Σε ποικιλίες του αμπελιού που ενδέχεται να παρουσιάσουν ευαισθησία στα φύλλα (βλ. μοσχάτο), πραγματοποιούνται το μέγιστο τρεις επεμβάσεις ανά έτος.</li> <li>Σε περίπτωση χρήσης μετά από βροχή, εφαρμόζετε τη μέγιστη δόση στις αρχικές φάσεις της περιόδου επώασης του παθογόνου.</li> <li>Το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιείται προληπτικά σε διαστήματα 10 – 12 ημερών.</li> <li>Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά δεκάριο (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό)</li> </ol>						

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Αμπέλι	40 ημέρες
Τομάτα, Πατάτα	20 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Ομάδα Τρόπου Δράσης: Cymoxanil: **27**  
Copper: **M1**  
Fosetyl Al: **33**

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

----

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

----

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή μέχρι να στεγνώσει εντελώς η καλλιέργεια στην οποία εφαρμόστηκε ψεκασμός.

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα:

Μη προοριζόμενο για χρήση σε μίγματα δοχείου

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:



## 12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

<b>H317</b>	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση
<b>H400</b>	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
<b>H410</b>	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

## 13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

<b>P405+102</b>	Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά
<b>P270</b>	Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
<b>P273</b>	Να αποφεύγεται η απελευθέρωση στο περιβάλλον.
<b>P280</b>	Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
<b>P302+P352</b>	Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα. Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.
<b>P333+P313</b>	Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εξάνθημα συμβουλευτείτε / επισκεφθείτε ιατρό.
<b>P391</b>	Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
<b>SP1</b>	Μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή την συσκευασία του. (Μη καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη μόλυνση του αγροτικού περιβάλλοντος και των δρόμων).
<b>Προφυλάξεις για τους χειριστές:</b> Κατά την διάρκεια εφαρμογής του σκευάσματος οι χειριστές θα πρέπει να φοράνε κατάλληλα γάντια .	
<b>EUH401</b>	<i>Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</i>

## 14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Γενικές πληροφορίες: Συμπτώματα δηλητηρίασης μπορούν να εμφανιστούν ακόμη και μετά από πολλές ώρες. Απαραίτητη η ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες μετά το ατύχημα. Δείξτε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στο γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας σε περίπτωση συμπτωμάτων. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλυνθείτε αμέσως καλά με νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε με καθαρό νερό διατηρώντας ανοικτά τα βλέφαρα για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν συμβουλευθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν συμβουλευθείτε γιατρό.

Πληροφορίες για το Γιατρό:

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401**

## E. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Διατηρήστε το κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε θερμοκρασία <40 °C σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας και άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής τους.

**ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

**Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:**

**ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**

Η άδεια παράλληλου εμπορίου χορηγείται στο προϊόν Spyrenox που είναι εγκεκριμένο στη Ελλάδα με εμπορικό όνομα VITENE TRIPLIO R και αριθμό έγκρισης 60438 και με κάτοχο άδειας την εταιρεία SIPCAM OXON S.p.A..

Το προϊόν αναφοράς στην Κύπρο βάση του οποίου χορηγείται η σχετική άδεια είναι το Vitene Triplio R με αριθμό άδειας 3170.

Η εταιρεία Spyros Stavrinides Chemicals Ltd, οφείλει να τηρά αρχείο (Αρχείο Εισαγωγής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Παράλληλου Εμπορίου) με τις ποσότητες του σκευάσματος Spyrenox που εισάγονται στην Κύπρο (θα περιλαμβάνει όλα τα παραστατικά στοιχεία των εισαγωγών ανά παρτίδα σκευάσματος).

Το αρχείο θα είναι άμεσα διαθέσιμο για έλεγχο από την αρμόδια Αρχή.

Για κάθε φορτίο του σκευάσματος Spyrenox που εισάγεται στην Κύπρο θα πρέπει να χορηγείται η σχετική «Άδεια για Εισαγωγή Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος Παράλληλου Εμπορίου». Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η εισαγωγή του σκευάσματος στη χώρα.

Η ετικέτα του σκευάσματος θα φέρει ευανάγνωστα τη φράση «**ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**» με τα πλέον έντονα και μεγάλα γράμματα.

Η άδεια παράλληλου εμπορίου θα ανακληθεί:

- σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας του προϊόντος αυτού στη Ελλάδα για λόγους ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας.
- σε περίπτωση κακού χειρισμού της άδειας παράλληλου εμπορίου από την εταιρεία Spyros Stavrinides Chemicals Ltd, με στόχο την εισαγωγή ή τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων άλλων από αυτά για τα οποία χορηγήθηκε η παρούσα άδεια.

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011

Ημερομηνία: ..11/02/2021.....

.....  
(Ανδρούλα Γεωργία)  
Διευθύντρια  
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα