



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4459 (έντυπο 01), για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος με βάση τη διαδικασία της αμοιβαίας αναγνώρισης και

την επιστολή του αιτητή για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ιταλία,

χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν QUIMERA 50 WG με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3895

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

09/06/2021

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/12/2025

2. Κάτοχος της άδειας:

INDUSTRIAS AFRASA, S.A.

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

L. LAMBROU AGRO LTD

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

L. LAMBROU AGRO LTD

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

Quimera 50 WG

2. Μορφή:

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Kresoxim-methyl: 50% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 48% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

INDUSTRIAS AFRASA, S.A.

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

INDUSTRIAS AFRASA, S.A.

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

INDUSTRIAS AFRASA, S.A.

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Θερμοκολλημένα σακκίδια	20 γραμ. έως 5 κιλά	Polyester / Aluminium / Polyethylene
2.	Κουτί με εσωτερικό σακίδιο θερμοκολλημένο	20 γραμ. έως 5 κιλά	Polyester / Aluminium / Polyethylene Κουτί χάρτινο

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

Kresoxim-methyl

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

96% (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Zhejiang Corechem Co., Ltd

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Jiangsu Corechem Co., Ltd

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Μη διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση καθώς και αξιόλογη διάρκεια δράσης (περίπου 15 ημέρες). Έχει διελασματική και τοπικά διεισδυτική δράση και η αποτελεσματικότητά του δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη βροχόπτωση, δύο ώρες μετά την εφαρμογή του. Δρα παρεμποδίζοντας τη παραγωγή και την βλάστηση των σπορίων καθώς και την ανάπτυξη του μυκηλίου.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο βυτίο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, υπό συνεχή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόσεις			Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		Υρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	Υρ. σκ./δεκ. μέγιστη	
Μηλιά	Φουζικλάδιο <i>Venturia inaequalis</i> Ωίδιο <i>Podosphaera leucotricha</i>	--	80 – 100	20	3 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 12-14 ημέρες
Αχλαδιά	Φουζικλάδιο <i>Venturia pyrina</i> Καστανή κηλίδωση <i>Stemphylium vesicarium</i>	--	80 – 100	20	3 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 12-14 ημέρες
Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια)	Ωίδιο <i>Uncinula necator</i> Μαύρη σήψη <i>Guignardia bidwellii</i>	--	50 – 100	30	2 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 12-14 ημέρες
Ελιά (Βρώσιμες και ελαιοποιήσιμες ελιές)	Κυκλοκόνιο <i>Spilocaea oleaginea</i>	--	50 – 100	20	2 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 14 ημέρες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:					
1. Να ακολουθούνται οι γενικές συστάσεις των Γεωργικών προειδοποιήσεων όπου υπάρχουν.					
2. Δεν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα στις ποικιλίες αχλαδιάς "Κρυστάλλι" και "Κοντούλα", αμπελιού «Σουλτανίνα» και «Κορινθιακή σταφίδα» και ελιάς «Καλαμιών» και Κορονέικη.					

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Μηλιά, Αχλαδιά, Αμπέλι	35 ημέρες
Ελιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος (έως πριν την άνθηση, BBCH 50-55)

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: Kresoxim-methyl: 11

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή ή ανάμιξη του με μυκητοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης που δεν ανήκουν στην ομάδα των στρομπιλουρίνων και δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των στρομπιλουρίνων.

- Να μην γίνονται περισσότερες από 4 εφαρμογές/ καλλιεργητική περίοδο με σκευάσματα που περιέχουν στρομπιλουρίνες (Qoi).
- Να εφαρμόζεται νωρίς (προληπτικά) και να μην διενεργούνται θεραπευτικές επεμβάσεις, εκτός αν συστήνονται από τις Γεωργικές προειδοποιήσεις.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στην φυλλική επιφάνεια.
Ειδικά στο αμπέλι, 2 ημέρες

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις κυπριακές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS09



GHS08

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H351 Υποπτο για πρόκληση καρκίνου.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα
Φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτικά ενδύματα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.
Σε περίπτωση επανεισόδου στο χώρο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό να φοράτε γάντια.

P501 Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Spe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:
- 10 μέτρων σε Αμπέλι και Ελιά
- 15 μέτρων σε Μηλοειδή
ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε τον παθόντα τον στον καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα με άφθονο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλείτε εμετό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία για διαχείριση τους ως επικίνδυνα απόβλητα.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία: ...09/06/2021..



(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα