



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4238-P (Έντυπο 03) για χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου σε φυτοπροστατευτικό προϊόν και τις αιτήσεις με αρ. 4068-P και 4580-P (Έντυπο 07), για ανανέωση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος παράλληλου εμπορίου,

τροποποιείται η άδεια παράλληλου εμπορίου στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **PROGIBB 40SG** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3675-P

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

31/08/2023

Ημερομηνία λήξης άδειας:

15/07/2026

2. Κάτοχος της άδειας:

A.D Georoniki Ltd

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

A.D Georoniki Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

A.D Georoniki Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

2. Μορφή:

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

5. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	25 g, 50 g, 80 g, 100 g, 250 g, 500g,	HDPE
2	Φάκελος	25 g (1 φάκελος των 25 g)	Φύλλο laminate αποτελούμενο από αλουμίνιο και LDPE, με εξωτερική στρώση χαρτιού
3	Χαρτοκυτίο που περιέχει φακέλους	25 g (10 φάκελοι των 2,5 g) 50 g (20 φάκελοι των 2,5 g) 100 g (40 φάκελοι των 2,5 g) 250 g (100 φάκελοι των 2,5 g) 250 g (20 φάκελοι των 12,5g)	Φύλλο laminate αποτελούμενο από αλουμίνιο και LDPE, με εξωτερική στρώση χαρτιού, εντός χάρτινου κυτίου

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Ρυθμιστής της ανάπτυξης των φυτών. Το προϊόν προωθεί την ανάπτυξη του μίσχου μέσω της επιμήκυνσης του κυττάρου και τη διακοπή της φυτικής νάρκης

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Η εφαρμογή πραγματοποιείται με ψεκασμούς καλύψεως φυλλώματος στην συνιστώμενη δόση

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο ψεκασμού με νερό μέχρι το απαιτούμενο επίπεδο και προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα ProGibb 40 SG. Συστήνεται μόνο ελαφριά ανάδευση για να διαλυθεί το προϊόν. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να βρίσκεται υπό συνεχή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Ξεβγάζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής με νερό ή με άλλα ειδικά προϊόντα, ενώ παράλληλα αφαιρείτε όλα τα αποσπώμενα εξαρτήματα του ψεκαστήρα (π.χ. ακροφύσια) για καλύτερο καθαρισμό.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	γρ. σκ./δεκ. μέγιστη		
Αγκινάρα	Για την πρόβλεψη της συγκομιδής και την αύξηση της απόδοσης	5	50	2,5	Εφαρμόστε όταν είναι ορατά τα πρώτα μπουμπούκια των ανθέων. BBCH41-43	Μία – Δύο εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 – 21 ημέρες
Αμπέλι (επιτραπέζια και σουλτανίνα)	Για τη βελτίωση της ποιότητας των καρπών και της απόδοσης μέσω επιμήκυνσης της συστάδας, λέπτυνσης και αλλαγής μεγέθους των ραγών	7,5	100 – 200	7,5 – 15	Σουλτανίνα εφαρμόστε όταν το μήκος του στελέχους είναι περίπου 4-10 cm μέχρι το 75% των ραγών να είναι 3-6mm. Συστήνονται συνολικά πέντε επεμβάσεις για την επίτευξη των αποτελεσμάτων του πλήρους μεγέθους των ραγών. Δείτε λεπτομερείς πληροφορίες πιο κάτω.	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 2 ημέρες
Αμπέλι (οινοποιήσιμο)	Για τη μείωση των μικρών διαστάσεων της συστάδας, τη βελτίωση του αερισμού και την ενίσχυση της αντιμετώπισης των ασθeneιών και των παρασίτων και, κατά συνέπεια, της ποιότητας του κρασιού	5	50	2,5	Κατευθύνετε τα σωματίδια του ψεκασμού στην περιοχή των τσαμπιών. Εφαρμόστε στο 30-50% πεσμένων ανθέων. BBCH 63-65	1
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Λεμόνια Πορτοκάλια (εκτός Valencia) Μανταρίνια Γκρέϊπ φρούτ	Για τη βελτίωση της καρπόδεσης Για τη βελτίωση της ποιότητας του φλοιού του καρπού και την βελτίωση της συγκομιδής	2,5	80 – 200	2 – 5	Εφαρμόστε από την πτώση των πετάλων μέχρι το ξεκίνημα της πτώσης των καρπών. BBCH 67 και BBCH71	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες
ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (εσωτερική χρήση)	Για επιμήκυνση του στελέχους σε κομμένα άνθη	3,75	100	3,75	Εφαρμόστε όταν οι καρποί ξεκινούν να αλλάζουν χρώμα. BBCH 81	1

Αχλαδιά	Για τη βελτίωση της καρπόδεσης, του βάρους των καρπών και της απόδοσης	1,25 – 2,5	80 – 100	1,25 – 2,5	Εφαρμόστε στο 30-50% της πλήρους άνθησης στην περίπτωση μη παγετού. BBCH 63 – 65 Σε περίπτωση παγετού εφαρμόστε κατά την περίοδο της άνθησης (BBCH57-69) και όχι αργότερα από 48 ώρες μετά τον παγετό. Εφαρμόστε ξανά σε περίπτωση περαιτέρω περιστατικών παγετού. Εφαρμόστε την υψηλή δόση όταν η φυσική καρπόδεση είναι χαμηλή	1-3 (2 ημέρες)
Κερασιά (γλυκιά)	Για τη βελτίωση της ποιότητας των καρπών και της απόδοσης	5	100	5	Εφαρμόστε όταν οι πρώτοι καρποί αλλάζουν χρώμα από πράσινο σε ανοιχτό κίτρινο (χρώμα άχυρου). BBCH 81	1
<p>Παρατηρήσεις: Χρόνοι εφαρμογών για άσπερμα επιπραπέζια σταφύλια: Πέντε εφαρμογές ξεκινούν όταν ο 1ος βραχίονας ξεκινά να κινείται στη συστάδα. (μήκος στελέχους ~ 4-10 εκ, BBCH55-57) δεύτερη εφαρμογή στο 50% ανοιχτών ανθέων (BBCH65) τρίτη εφαρμογή στο 80% των ανοιχτών ανθέων (BBCH68) τέταρτη εφαρμογή στο 50% των ραγών στα 3-6 mm (BBCH73-75) πέμπτη εφαρμογή στο 75% των ραγών στα 3-6 mm (BBCH73-75). Οι πρώτοι τρεις ψεκασμοί γίνονται στα 100 L/δεκάριο και οι τρεις τελευταίοι ψεκασμοί στα 200 L/δεκάριο</p>						

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Δεν θα πρέπει να εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής

10. Συνδυαστικότητα:

Το Pro-Gibb 40 SG, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή ορθή γεωργική πρακτική (EU GAP), δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε δοχείο ανάμειξης

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P102+405 Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
«Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό όταν το χρησιμοποιείτε σε κλειστούς χώρους»
«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό».
Sp1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Γενικά - Σε περίπτωση οποιασδήποτε τυχόν αμφιβολίας, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεβγάλετε το στόμα. Μην προκαλείτε ποτέ έμετο σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους ή βρίσκονται σε σύγχυση. Θα πρέπει να συμβουλευέστε πάντα έναν γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το άτομο που έχει εισπνεύσει το προϊόν στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση όπου τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεβγάλετε σχολαστικά με άφθονο νερό. Τα βλέφαρα θα πρέπει να μένουν ανοιχτά επιτρέποντας το σχολαστικό ξέβγαλμα του βολβού του οφθαλμού. Σε περίπτωση επιδείνωσης του ερεθισμού συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε αμέσως με νερό και σαπούνι.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

E. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Αποθηκεύετε το προϊόν σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος. Φυλάσσετε το μακριά από φαγητά, ποτά και ζωοτροφές. Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 3 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν διατηρείται στην αρχική του συσκευασία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας (σακούλες) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας .

Z. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η άδεια παράλληλου εμπορίου χορηγείται στο προϊόν PROGIBB 40 SG που είναι εγκεκριμένο στην Ελλάδα με εμπορικό όνομα PROGIBB 40 SG και αριθμό έγκρισης 8245 και με κάτοχο άδειας την εταιρεία Valent Biosciences.

Το προϊόν αναφοράς στην Κύπρο βάση του οποίου χορηγείται η σχετική άδεια είναι το PROGIBB 40 SG με αριθμό άδειας 3601.

Η εταιρεία A.D Georponiki Ltd, οφείλει να τηρά αρχείο (Αρχείο Εισαγωγής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Παράλληλου Εμπορίου) με τις ποσότητες του σκευάσματος PROGIBB 40 SG που εισάγονται στην Κύπρο (θα περιλαμβάνει όλα τα παραστατικά στοιχεία των εισαγωγών ανά παρτίδα σκευάσματος).

Το αρχείο θα είναι άμεσα διαθέσιμο για έλεγχο από την αρμόδια Αρχή.

Για κάθε φορτίο του σκευάσματος PROGIBB 40 SG που εισάγεται στην Κύπρο θα πρέπει να χορηγείται η σχετική «Άδεια για Εισαγωγή Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος Παράλληλου Εμπορίου».

Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η εισαγωγή του σκευάσματος στη χώρα.

Η ετικέτα του σκευάσματος θα φέρει ευανάγνωστα τη φράση «**ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**» με τα πλέον έντονα και μεγάλα γράμματα.

Η άδεια παράλληλου εμπορίου θα ανακληθεί:

- σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας του προϊόντος αυτού στην Ελλάδα για λόγους ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας.

- σε περίπτωση κακού χειρισμού της άδειας παράλληλου εμπορίου από την εταιρεία A.D Georponiki Ltd, με στόχο την εισαγωγή ή τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων άλλων από αυτά για τα οποία χορηγήθηκε η παρούσα άδεια.

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 15/09/2023



(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας

