



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021  
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4166 (Έντυπο 01), για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,  
την επιστολή του αιτητή για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ελλάδα και  
τις αιτήσεις με αρ. 4013 και 4521 (Έντυπο 08), για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος και  
την αίτηση με αρ. 690 (Έντυπο 09) για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε σχέση με τα εργοστάσια παρασκευής της δ.ο. και συσκευασίας του σκευάσματος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **PROGIBB 40SG** με τα ακόλουθα στοιχεία:

**A) Γενικά στοιχεία άδειας**

1. Αριθμός Άδειας:

3601

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

31/08/2023

Ημερομηνία λήξης άδειας:

15/07/2026

2. Κάτοχος της άδειας:

Sumitomo Chemical Agro Europe SAS

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:  
(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

4. Διανομέας / Διανομείς:

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

## Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

2. Μορφή:

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	25 g, 50 g, 80 g, 100 g, 250 g, 500g,	HDPE
2	Φάκελος	25 g (1 φάκελος των 25 g)	Φύλλο laminate αποτελούμενο από αλουμίνιο και LDPE, με εξωτερική στρώση χαρτιού
3	Χαρτοκιτίο που περιέχει φακέλους	25 g (10 φάκελοι των 2,5 g) 50 g (20 φάκελοι των 2,5 g) 100 g (40 φάκελοι των 2,5 g) 250 g (100 φάκελοι των 2,5 g) 250 g (20 φάκελοι των 12,5g)	Φύλλο laminate αποτελούμενο από αλουμίνιο και LDPE, με εξωτερική στρώση χαρτιού, εντός χάρτινου κιτίου

## Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

1. Abbvie Inc., Η.Π.Α.
2. JiangXi New Reypnon Biochemical Co., Ltd, Κίνα
3. Jiangsu Fengyuan Bioengineering Co., Ltd, Κίνα
4. Sichuan Lomon Biotechnology Co. Ltd, Κίνα

#### Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Ρυθμιστής της ανάπτυξης των φυτών. Το προϊόν προωθεί την ανάπτυξη του μίσχου μέσω της επιμήκυνσης του κυττάρου και τη διακοπή της φυτικής νάρκης

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες  
ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Η εφαρμογή πραγματοποιείται με ψεκασμούς καλύψεως φυλλώματος στην συνιστώμενη δόση

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο ψεκασμού με νερό μέχρι το απαιτούμενο επίπεδο και προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα ProGibb 40 SG. Συστήνεται μόνο ελαφριά ανάδευση για να διαλυθεί το προϊόν. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να βρίσκεται υπό συνεχή ανάδευση.

##### **Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Ξεβγάζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής με νερό ή με άλλα ειδικά προϊόντα, ενώ παράλληλα αφαιρείτε όλα τα αποσπώμενα εξαρτήματα του ψεκαστήρα (π.χ. ακροφύσια) για καλύτερο καθαρισμό.

## 5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	γρ. σκ./δεκ. μέγιστη		
<b>Αγκινάρα</b>	Για την πρόβλεψη της συγκομιδής και την αύξηση της απόδοσης	5	50	2,5	Εφαρμόστε όταν είναι ορατά τα πρώτα μπουμπούκια των ανθέων. BBCH41-43	Μία – Δύο εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 – 21 ημέρες
<b>Αμπέλι</b> (επιτραπέζια και σουλτανίνα)	Για τη βελτίωση της ποιότητας των καρπών και της απόδοσης μέσω επιμήκυνσης της συστάδας, λέπτυνσης και αλλαγής μεγέθους των ραγών	7,5	100 – 200	7,5 – 15	Σουλτανίνα εφαρμόστε όταν το μήκος του στελέχους είναι περίπου 4-10 cm μέχρι το 75% των ραγών να είναι 3-6mm. Συστήνονται συνολικά πέντε επεμβάσεις για την επίτευξη των αποτελεσμάτων του πλήρους μεγέθους των ραγών. Δείτε λεπτομερείς πληροφορίες πιο κάτω.	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 2 ημέρες
<b>Αμπέλι</b> (οινοποιήσιμο)	Για τη μείωση των μικρών διαστάσεων της συστάδας, τη βελτίωση του αερισμού και την ενίσχυση της αντιμετώπισης των ασθενείων και των παρασίτων και, κατά συνέπεια, της ποιότητας του κρασιού	5	50	2,5	Κατευθύνετε τα σωματίδια του ψεκασμού στην περιοχή των τσαμπιών. Εφαρμόστε στο 30-50% πεσμένων ανθέων. BBCH 63-65	1
<b>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ</b> Λεμόνια Πορτοκάλια (εκτός Valencia) Μανταρίνια Γκρέϊπ φρούτ	Για τη βελτίωση της καρπόδεσης	2,5	80 – 200	2 – 5	Εφαρμόστε από την πτώση των πετάλων μέχρι το ξεκίνημα της πτώσης των καρπών. BBCH 67 και BBCH71	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες
	Για τη βελτίωση της ποιότητας του φλοιού του καρπού και την βελτίωση της συγκομιδής	2,5 – 5	80 – 300	2 – 15	Εφαρμόστε όταν οι καρποί ξεκινούν να αλλάζουν χρώμα. BBCH 81	1
<b>ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ</b> (εσωτερική χρήση)	Για επιμήκυνση του στελέχους σε κομμένα άνθη	3,75	100	3,75	Εφαρμόστε μέσα σε 1 βδομάδα από τη μεταφύτευση	1

Αχλαδιά	Για τη βελτίωση της καρπόδεσης, του βάρους των καρπών και της απόδοσης	1,25 – 2,5	80 – 100	1,25 – 2,5	Εφαρμόστε στο 30-50% της πλήρους άνθησης στην περίπτωση μη παγετού. BBCH 63 – 65 Σε περίπτωση παγετού εφαρμόστε κατά την περίοδο της άνθησης (BBCH57-69) και όχι αργότερα από 48 ώρες μετά τον παγετό. Εφαρμόστε ξανά σε περίπτωση περαιτέρω περιστατικών παγετού. Εφαρμόστε την υψηλή δόση όταν η φυσική καρπόδεση είναι χαμηλή	1-3 (2 ημέρες)
Κερασιά (γλυκιά)	Για τη βελτίωση της ποιότητας των καρπών και της απόδοσης	5	100	5	Εφαρμόστε όταν οι πρώτοι καρποί αλλάζουν χρώμα από πράσινο σε ανοιχτό κίτρινο (χρώμα άχυρου). BBCH 81	1
<p><b>Παρατηρήσεις:</b>  Χρόνοι εφαρμογών για άσπερμα επιτραπέζια σταφύλια: <b>Πέντε εφαρμογές</b>. Οι εφαρμογές ξεκινούν όταν ο 1ος βραχίονας ξεκινά να κινείται στη συστάδα. (μήκος στελέχους ~ 4-10 εκ, BBCH55-57)  δεύτερη εφαρμογή στο 50% ανοιχτών ανθέων (BBCH65)  τρίτη εφαρμογή στο 80% των ανοιχτών ανθέων (BBCH68)  τέταρτη εφαρμογή στο 50% των ραγών στα 3-6 mm (BBCH73-75)  πέμπτη εφαρμογή στο 75% των ραγών στα 3-6 mm (BBCH73-75).  Οι πρώτοι τρεις ψεκασμοί γίνονται στα 100 L/δεκάριο και οι τρεις τελευταίοι ψεκασμοί στα 200 L/δεκάριο</p>						

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

---

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

---

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

---

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Δεν θα πρέπει να εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής

10. Συνδυαστικότητα:

Το Pro-Gibb 40 SG, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή ορθή γεωργική πρακτική (EU GAP), δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε δοχείο ανάμειξης

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

---

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

**H412** Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

**EUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

### 13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

**P102+405** Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.

**P270** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

«Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό όταν το χρησιμοποιείτε σε κλειστούς χώρους»

«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό».

**Sp1** ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

### 14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

**Γενικά** - Σε περίπτωση οποιασδήποτε τυχόν αμφιβολίας, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεβγάλετε το στόμα. Μην προκαλείτε ποτέ έμετο σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους ή βρίσκονται σε σύγχυση. Θα πρέπει να συμβουλευέστε πάντα έναν γιατρό.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε το άτομο που έχει εισπνεύσει το προϊόν στον καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση όπου τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεβγάλετε σχολαστικά με άφθονο νερό. Τα βλέφαρα θα πρέπει να μένουν ανοιχτά επιτρέποντας το σχολαστικό ξέβγαλμα του βολβού του οφθαλμού. Σε περίπτωση επιδείνωσης του ερεθισμού συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε αμέσως με νερό και σαπούνι.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401**

### Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Αποθηκεύετε το προϊόν σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος. Φυλάσσετε το μακριά από φαγητά, ποτά και ζωοτροφές. Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 3 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν διατηρείται στην αρχική του συσκευασία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

### ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας (σακούλες) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας .

### Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 01/09/2023



(Ανδρούλα Γεωργίου)  
Διευθύντρια  
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα