



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4358 (Έντυπο 01), για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

την επιστολή του αιτητή για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Γαλλία και την αίτηση με αρ. 4400 (έντυπο 08) για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

Τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν „**TREBON 30 EC**” με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3794

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

31/12/2022

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/12/2024

2. Κάτοχος της άδειας:

Belchim Crop Protection NV/SA

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Trebon 30 EC

2. Μορφή: Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
Etofenprox: 28,75% β/ο ή 30,09% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 69,3% β/β
Περιέχει: Aromatic hydrocarbon (aromatic solvent)

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: MITSUI CHEMICALS AGRO, INC

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:
1. IQV
2. PLOSS CHEMICALS GmbH
3. Kwizda Agro GmbH
4. Utsonomiya Chemical Industry Co., Ltd

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:
1. IQV
2. PLOSS CHEMICALS GmbH
3. Kwizda Agro GmbH
4. Utsonomiya Chemical Industry Co., Ltd

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη	20 κ.εκ. έως 1 λίτρο	HDPE/Adhesive/EVOH
2.	Δοχεία	1 λίτρο έως 5 λίτρων	HDPE/Adhesive/EVOH

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Etofenprox

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 98% β/β min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: MITSUI CHEMICALS AGRO, INC

4. Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.: Mitsui Chemicals Inc. (Tokyo)

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Μη εστερικό πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο με άμεση δράση, επαφής και στομάχου. Δρα στο νευρικό σύστημα του εντόμου-στόχου και συγκεκριμένα στη ροή των ιόντων νατρίου στις μεμβράνες των νευρικών αξόνων.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής: ψεκασμός φυλλώματος

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση κατά την διάρκεια του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Καθαρίστε με τριπλό ξέπλυμα αμέσως μετά τη χρήση. Ξεπλύνετε το βυτίο και τα εξαρτήματά του ψεκαστικού μηχανήματος τρεις φορές με καθαρό νερό μέχρι ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος να έχουν απομακρυνθεί.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη		
Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια)	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i>) (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)	40	---	20 - 40	Ψεκασμός φυλλώματος, μετά την άνθηση, με την έναρξη της προσβολής . BBCH 69 - 89	1 εφαρμογή
	Τζιτζικάκια (<i>Scaphoideus titanus</i> , <i>Empoasca viti</i> , <i>Metcalfa pruinosa</i>)	30		20 - 40		
Ελαιοκράμβη (ανοιξιάτικη) ήμερο σινάπτι	Φυτοφάγα - κολεόπτερα (<i>Meligethes aeneus</i>)	20		10 - 30	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής BBCH 11-61	1 εφαρμογή
Ελαιοκράμβη (χειμωνιάτικη)	Φυτοφάγα - κολεόπτερα (<i>Meligethes aeneus</i>)	20		10 - 30	Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής BBCH 11-61	2 εφαρμογές (μεγ. 1 εφαρμογή κατά την άνοιξη και δεύτερη εφαρμογή με μεσοδιάστημα 90-120 ημέρες)
Καλλιέργειες για σποροπαραγωγή (λαχανικών, αρωματικών, φαρμακευτικών βότανων, ανθοκομικών)	Φυτοφάγα - κολεόπτερα (<i>Bruchus pisi</i> , <i>Epitrix sp</i>)	20		10 - 30	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής BBCH 11-30	1 εφαρμογή

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Αμπέλι	14
Ελαιοκράμβη (ανοιξιάτικη και χειμωνιάτικη)	Δεν εφαρμόζεται (καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής BBCH 11-61)
Καλλιέργειες για σποροπαραγωγή	Δεν εφαρμόζεται

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 3A

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται:

- Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.
- Εφαρμογή μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς.
- Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με TREBON 30 EC.
- Εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις πυρεθρίνες.
- Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα του.

10. Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GHS05



GHS07



GHS08



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

- H304** Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- H315** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- H318** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- H336** Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
- H362** Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.
- H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμες σοβαρές, δυσμενείς επιπτώσεις.
- EUH401** «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

- P102+P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- P260** Μην αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς/εκνεφώματα.
- P263** Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας.
- P270** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο
*Φοράτε κατάλληλα γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.
Οι εργάτες να φορούν γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας όταν εισέρχονται στο χώρο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.*
- P501** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς
- SP1** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από αυλές αγροκτημάτων ή περιφερειακές οδούς.
- Spe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήστε μια αφέκαστη ζώνη ασφαλείας από τα επιφανειακά ύδατα:
20 μέτρων σε Ελαιοκράμβη (ανοιξιάτικο) και καλλιέργειες για σποροπαραγωγή
50 μέτρων σε Ελαιοκράμβη (χειμωνιάτικο)
50 μέτρων που να συμπεριλαμβάνει 20 μέτρα φυτικής ανάσχεσης, στο αμπέλι
- Spe3** Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από μη γεωργική γη στο αμπέλι.
- SPe8** **Επικίνδυνο για τις μέλισσες.** Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν (η εφαρμογή να γίνεται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα).

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

- P201** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- P301+P310+P331** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων/γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
- P305+P351+P338+P310** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων/γιατρό.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ενδύματα και πλύντε το δέρμα με σαπούνι και άφθονο νερό. Συμβουλευθείτε γιατρό.
- Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατείστε ήρεμο.
- ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του όταν φυλάσσεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία: 09/02/2023..



(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας