

101. Διπλαδένια
Mandevilla splendens



101. Διπλαδένια *Mandevilla splendens*

Χρόνος Άνθησης: Καλοκαίρι- Φθινόπωρο

Απαιτήσεις σε νερό: **

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλές φυτό με φύλλα πράσινα γυαλιστερά και λουλούδια χωνοειδή, κοκκινωπά.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Ευπαθές φυτό στους παγετούς. Ανθεκτικό στα υδροσταγονίδια της θάλασσας. Προτιμά ηλιαζόμενες θέσεις.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Χρήση ως αναρριχητικό.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

102. Χαμομήλι
Matricaria chamomila



102. Χαμομήλι *Matricaria chamomila*

Χρόνος Άνθησης: Άνοιξη

Απαιτήσεις σε νερό: ***

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Όρθια ή απλωτή μονοετής πόα ύψους μέχρι 0,5 μέτρα. Φύλλα πράσινα, πτεροσχιδή, επιμήκη. Άνθη λευκά δισκοειδή με κίτρινη κωνική ανθοδόχη.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Ευδοκιμεί σε ηλιόλουστες θέσεις και αμμώδη εδάφη, με καλή αποστράγγιση.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Φύτευση μεμονωμένα ή κατά ομάδες.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

103. Μελαλεύκη
Melaleuca armilaria



103. Μελαλεύκη *Melaleuca armilaria*

Χρόνος Άνθησης: Τέλος Φθινοπώρου - Μέσα Χειμώνα

Απαιτήσεις σε νερό: **

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλές δέντρο, ύψους μέχρι 14 μέτρων. Φύλλα βαθυπράσινα, μικρά και πολύ στενά. Άνθη λευκά ως κιτρινωπά, τοποθετημένα σε ταξιανθίες.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Ευδοκιμεί σε περιοχές με ήπιο κλίμα για αυτό και απαντάται σε περιοχές με υψόμετρο μέχρι 200 μέτρα.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Χρήση κυρίως σε αστικά πάρκα.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

104. Μελιά
Melia ajedarach



104. Μελιά Melia ajedarach

Χρόνος Άνθησης: Άνοιξη

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Φυλλοβόλο δέντρο, ύψους 15 περίπου μέτρων με ομπρελλοειδή κόμη. Φύλλα σύνθετα, σκουροπράσινα και λουλούδια μικρά, χρώματος λιλά. Καρποί στρογγυλοί αρχικά πράσινοι και μετά κιτρινωποί οι οποίοι παραμένουν στο δέντρο μέχρι την επόμενη Άνοιξη.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Γενικότερα ανθεκτικό φυτό. Ευδοκίμει σε περιοχές με υψόμετρο 0 - 1000 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Μοναχικό σε κήπους ή δεντροστοιχίες σε δρόμους πόλεων και πάρκα. Κατάλληλο για δημιουργία σκιάς.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Μέτριο ως πολύ τοξικό (φύλλα και καρποί).

105. Μέλισσα
Melissa officinalis



105. Μέλισσα *Melissa officinalis*

Χρόνος Άνθησης: Τέλος Άνοιξης- Αρχές Φθινοπώρου

Απαιτήσεις σε νερό: ***

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής, αρωματικός θάμνος, ύψους μέχρι 1 μέτρου. Φύλλα πράσινα, τριχωτά πριονωτά με ευχάριστη μυρωδιά κίτρου και λουλούδια λευκά.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Ευδοκιμεί σε εδάφη πλούσια, καλά σταγγιζόμενα και το καλοκαίρι θέλει αρκετό νερό. Είναι φυτό που εξαπλώνεται γρήγορα σε ημισκιερά σημεία του κήπου.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Φύτευση μεμονωμένα ή κατά ομάδες.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

106. Μέντα
Mentha piperita



106. Μέντα *Mentha piperita*

Χρόνος Άνθησης: Καλοκαίρι

Απαιτήσεις σε νερό: ***

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής, αρωματικός θάμνος ύψους μέχρι 0,9 μέτρα. Φύλλα πράσινα, λογχοειδή, χωρίς τρίχες. Έντονη καυστική οσμή. Λουλούδια λευκά, ρόδινα ή κυανοπορφυρά.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Χρειάζεται απαραίτητως ηλιοφάνεια για πολλές ώρες την ημέρα, συχνά ποτίσματα τις ζεστές μέρες και τακτικές λιπάνσεις.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Χρησιμοποιείται σε κήπους και πάρκα, μεμονωμένα ή κατά ομάδες.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

107. Δυόσμος
Mentha viridis



107. Δυόσμος *Mentha viridis*

Χρόνος Άνθησης: Καλοκαίρι- Φθινόπωρο

Απαιτήσεις σε νερό: ***

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής, αρωματικός θάμνος ύψους μέχρι 1 μέτρου. Φύλλα πράσινα, λογχοειδή, τριχωτά στην κάτω επιφάνεια. Λουλούδια λευκά, ρόδινα ή κυανοπορφυρά.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Χρειάζεται απαραίτητως ηλιοφάνεια για πολλές ώρες την ημέρα, συχνά ποτίσματα τις ζεστές μέρες και τακτικές λιπάνσεις.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Φύτευση μεμονωμένα ή κατά ομάδες.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

108. Μεσημβριάνθεμον
Mesembryanthemum edulis



108. Μεσημβριάνθεμον *Mesembryanthemum edulis*

Χρόνος Άνθησης: Άνοιξη- Καλοκαίρι

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ξυλώδες, αειθαλές, έρπων καλλωπιστικό φυτό ύψους 25 cm. Άνθη διαφόρων χρωμάτων ανάλογα με την ποικιλία τα οποία ανοίγουν το μεσημέρι και κλείνουν το βράδυ.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Φυτό ανθεκτικό στη ξηρασία και στα υδροσταγονίδια της θάλασσας.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Κάλυψη αμμωδών παράλιων εκτάσεων.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

109. Μετροσίδερος
Metrosideros excelsa



109. Μετροσίδερος *Metrosideros excelsa*

Χρόνος Άνθησης: Τέλος Άνοιξης - Μέσα Καλοκαιριού

Απαιτήσεις σε νερό: **

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής θάμνος/ μικρό δέντρο με φύλλα επιμήκη, γκριζωπά, χνουδωτά. Άνθη χρώματος κόκκινου, τοποθετημένα σε ταξιανθίες σαν βούρτσες. Το φυτό μεγαλώνοντας έχει την τάση να απλώνει.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Φυτό ευαίσθητο στις χαμηλές θερμοκρασίες για αυτό και φυτεύεται κυρίως σε παραθαλάσσιες περιοχές. Ανθεκτικό στους ανέμους και την ξηρασία.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Χρήση κυρίως ως φρακτικό αλλά και ως μεμονωμένο σε κήπους. Λόγω της ανθεκτικότητας του σαν φυτό, χρησιμοποιείται επίσης και στο αστικό πράσινο.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

110. Μουριά
Morus alba



110. Μουριά Morus alba

Χρόνος Άνθησης: Τέλος Άνοιξης- αρχές Καλοκαιριού

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Φυλλοβόλο δέντρο, ύψους 15 μέτρων με φύλλα πράσινα ωοειδή. Άνθη μικρά, κιτρινοπράσινα και καρποί εδώδιμοι (τα γνωστά μούρα- βαβάτσιννα) με χρώμα άσπρο, ιώδες, κοκκινωπό ή μαυριδερό (Καλοκαίρι).

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Αναπτύσσεται σε ηλιόλουστες ή ημισκιερές τοποθεσίες. Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 0 -1400 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Χρήση σε πάρκα, χώρους στάθμευσης και πλατείες σε βαθιά εδάφη.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

111. Μυρτιά
Myrtus communis



111. Μυρτιά *Myrtus communis*

Χρόνος Άνθησης: Τέλος Άνοιξης -Τέλος Καλοκαιριού

Απαιτήσεις σε νερό: ***

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής θάμνος, ύψους 3 - 5 μέτρων με αρωματικά, γυαλλιστερά φύλλα και άνθη (λευκά).

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Αναπτύσσεται σε θέσεις ηλιαζόμενες ή ημισκιερές. Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 0 - 900 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φυτικός φράκτης. Κατάλληλο για φυτοδοχεία. Κλαδεύεται σε σχήματα.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

112. Ματσικόριδο
Narcissus tazetta



112. Ματσικόριδο Narcissus tazetta

Χρόνος Άνθησης: Χειμώνας

Απαιτήσεις σε νερό: ***

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πολυετής πόα, ύψους μέχρι 30 εκατοστών. Από τη βάση του φυτού εκφύεται δέσμη γραμμοειδών φύλλων από το κέντρο των οποίων βγαίνουν ένα ή περισσότερα ανθικά στελέχη με λευκά αρωματικά άνθη.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Αναπτύσσεται καλύτερα σε ηλιόλουστες θέσεις και εδάφη με καλή αποστράγγιση.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Σχηματίζει πολύ ωραία ανθικά πλαίσια αν φυτευθεί πυκνά σε απλή ή διπλή γραμμή.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

113. Πικροδάφνη
Nerium oleander



113. Πικροδάφνη Nerium oleander

Χρόνος Άνθησης: Μέσα Άνοιξης - Μέσα Καλοκαιριού

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής θάμνος, ύψους μέχρι 5 μέτρων, με μεγάλα, επιμήκη, δερματώδη φύλλα. Άνθη χωνοειδή, διαφόρων χρωμάτων ανάλογα με την ποικιλία.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Αναπτύσσεται ικανοποιητικά σε ηλιόλουστες συνθήκες. Μέτριος προς γρήγορος ρυθμός ανάπτυξης. Ευδοκίμει σε περιοχές με υψόμετρο 0 -900 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Κατάλληλο για δημιουργία φυτικών πλαισίων ή φύτευση κατά ομάδες. Μπορεί να διαμορφωθεί και ως μικρό δέντρο.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Πολύ τοξικό (όλα τα μέρη).

114. Βασιλικός
Ocimum basilicum



114. Βασιλικός *Ocimum basilicum*

Χρόνος Άνθησης: Τέλος Άνοιξης - Φθινόπωρο

Απαιτήσεις σε νερό: ***

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Μονοετής, σπάνια πολυετής αρωματικός θάμνος ύψους 0,3 μέχρι 1 μέτρα. Φύλλα πράσινα, σχεδόν χωρίς τρίχες. Λουλούδια λευκά, σπάνια ρόδινα.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Ευδοκιμεί σε γόνιμα εδάφη, σε φωτεινά έως ηλιαζόμενα σημεία του κήπου.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Φύτευση μεμονωμένα ή κατά ομάδες. Κατάλληλο για φυτοδοχεία.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

115. Ελιά
Olea europa



115. Ελιά Olea europa

Χρόνος Άνθησης: Μέσα Άνοιξης - Αρχές Καλοκαιριού

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλές, αιωνόβιο δέντρο, ύψους πέραν των 10 μέτρων, με κόμη στρογγυλωπή. Φύλλα γκριζοπράσινα, δερματώδη και άνθη μικρά, πολυάριθμα.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Απαιτεί ηλιόλουστες συνθήκες, αντέχει τα φτωχά, ξηρά, ασβεστούχα εδάφη. Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 0 -1000 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Φύτευση σε δεντροστοιχίες, πάρκα, κήπους, πλατείες.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

116. Δίκταμος
Origanum dictamnus



116. Δίκταμος *Origanum dictamnus*

Χρόνος Άνθησης: Καλοκαίρι

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής αρωματικός θάμνος ύψους μέχρι 0,3 μέτρα. Φύλλα ωοειδή, με πυκνό τρίχωμα. Λουλούδια ρόδινα.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Προτιμά δροσερό περιβάλλον και είναι ευαίσθητο στις ψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Φύτευση μεμονωμένα ή κατά ομάδες.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

117. Πίγανη
Origanum dubium



117. Ρίγανη *Origanum dubium*

Χρόνος Άνθησης: Καλοκαίρι

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής, αρωματικός θάμνος ύψους μέχρι 1 μέτρου. Φύλλα ελαφρώς χνουδωτά. Λουλούδια λευκά, πολυάριθμα.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Ευδοκιμεί σε εδάφη με καλή αποστράγγιση. Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 200-1000 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Κατάλληλο για κάλυψη επιφανειών και για συνθέσεις με άλλα είδη.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

118. Ματζουράνα
Origanum majorana



118. Ματζουράνα *Origanum majorana*

Χρόνος Άνθησης: Μέσα Άνοιξης - Μέσα Φθινοπώρου

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής, αρωματικός θάμνος ύψους μέχρι 1 μέτρου. Βλαστοί ελαφρώς ρόδινοι και φύλλα ελαφρώς χνουδωτά. Λουλούδια λευκά πολυάριθμα.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Ευδοκιμεί σε εδάφη με καλή αποστράγγιση. Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 0 -900 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Κατάλληλο για κάλυψη επιφανειών και για συνθέσεις με άλλα είδη. Ιδανικό για βραχόκηπο.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

119. Παρκινσόνια
Parcinsonia acuelata



119. Παρκινσόνια *Parcinsonia acuelata*

Χρόνος Άνθησης: Τέλος Άνοιξης - Αρχές Καλοκαιριού

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλές δέντρο, ύψους 3 - 6 μέτρων με αγκάθια και φύλλα σαν βελόνες. Λουλούδια κιτρινωπά, με κόκκινο στίγμα.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Πολύ γρήγορος ρυθμός ανάπτυξης. Αναπαράγεται πάρα πολύ εύκολα με αποτέλεσμα να χρειάζεται έλεγχο έτσι ώστε να μην γίνει **ζιζάνιο**. Δυνατό να αναπτυχθεί σε πολύ ξηρά αμμώδη εδάφη. Ανθεκτικό στους θαλάσσιους ανέμους. Ευδοκίμει σε περιοχές με υψόμετρο 0 -200 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Μεμονωμένο σε κήπους και δρόμους. Λόγω των αγκαθιών του, χρησιμοποιείται ως φρακτικό σε αγρούς.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

120. Πασσιφλόρα
Passiflora edulis



120. Πασσιφλόρα *Passiflora edulis*

Χρόνος Άνθησης: Μέσα Άνοιξης- Αρχές Φθινοπώρου

Απαιτήσεις σε νερό: ***

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Φυλλοβόλο, αναρριχητικό φυτό, ύψους 4-6 μέτρων. Λουλούδια λευκά που μοιάζουν με ρολόϊ και κιτρινοπορτοκαλί εδώδιμους καρπούς (Φθινόπωρο).

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Ευαίσθητο στις χαμηλές θερμοκρασίες. Ευδοκίμει σε περιοχές με υψόμετρο 0- 400 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Χρήση ως αναρριχητικό.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

121. Αμπαρρόριζα (Κιούλι)
Pelargonium graveolens



121. Αμπαρρόριζα (Κιούλι) *Pelargonium graveolens*

Χρόνος Άνθησης: Άνοιξη- Αρχές Φθινοπώρου

Απαιτήσεις σε νερό: **

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πολυετής θάμνος, ύψους μέχρι 90 εκ. Φύλλα αρωματικά, με κοντούς μίσχους και άνθη ρόδινα με μωβ νευρώσεις.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Φυτό ευαίσθητο στους παγετούς. Αναπτύσσεται και ανθοφορεί ικανοποιητικά σε ηλιόλουστες συνθήκες.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Φυτεύεται μεμονωμένα ή κατά ομάδες σε κήπους. Κατάλληλο και για χρήση ως φυτό γλάστρας.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

122. Γεράνι
Pelargonium zonale



122. Γεράνι *Pelargonium zonale*

Χρόνος Άνθησης: Άνοιξη- Καλοκαίρι- Φθινόπωρο

Απαιτήσεις σε νερό: **

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής θάμνος, ύψους μέχρι 50 εκ. περίπου. Φύλλα καρδιόσχημα και άνθη πολυάριθμα σε σφαιρικές ταξιανθίες διαφόρων χρωμάτων (ανάλογα με την ποικιλία).

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Φυτό ευαίσθητο στους παγετούς. Αναπτύσσεται και ανθοφορεί ικανοποιητικά σε ηλιόλουστες συνθήκες.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Δημιουργία ανθικών πλαισίων λόγω της συνεχούς άνθισης του. Δημιουργεί ωραία αντίθεση όταν φυτεύεται ομαδικά σε χλοοτάπητες.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

123. Πετούνια
Petunia hybrida



123. Πετούνια *Petunia hybrida*

Χρόνος Άνθησης: Άνοιξη- Καλοκαίρι- Φθινόπωρο

Απαιτήσεις σε νερό: ***

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ετήσιο, ανθοφόρο φυτό, ύψους μέχρι 20 εκ. Φύλλα πράσινα, πολύ λεπτά και άνθη χωνοειδή, διαφόρων χρωμάτων ανάλογα με την ποικιλία.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Φυτό γρήγορης ανάπτυξης. Από τα λίγα ετήσια φυτά που αντέχει τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Αντέχει επίσης και τους ανέμους.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Κατάλληλο για βραχόκηπους. Κατάλληλο φυτό για να σχηματίσει πολύχρωμους τάπητες με ωραία σχέδια. Μπορεί επίσης να φυτευθεί σε κρεμαστές γλάστρες.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

124. Φοίνικας ο κανάριος
Phoenix canariensis



124. Φοίνικας ο κανάριος *Phoenix canariensis*

Χρόνος Άνθησης: Άνοιξη

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Φοίνικας ύψους 15-30 μέτρων, με χοντρό κορμό, φύλλα με βαθύ πράσινο χρώμα και μή εδώδιμους καρπούς με πορτοκαλο- κόκκινο χρώμα.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Κυριότερος εχθρός του Κανάριου φοίνικα είναι ο ρυγχοφόρος (*Rhynchophorus ferrugineus*). Αντέχει σε θερμοκρασίες μέχρι -7°C.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Κατάλληλα για παραθαλάσσιες φυτεύσεις. Μεμονωμένα ή σε δεντροστοιχίες τόσο σε πάρκα, δημόσιους χώρους, κήπους.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

125. Χουρμαδιά
Phoenix dactylifera



125. Χουρμαδιά *Phoenix dactylifera*

Χρόνος Άνθησης: Τέλος Άνοιξης - Αρχές Καλοκαιριού

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Φοίνικας ύψους 20-30 μέτρων, με σχετικά λεπτό κορμό και εδώδιμους καρπούς (φθινόπωρο) με κίτρινο-πορτοκαλί χρώμα. Οι καρποί παράγονται μόνο από θηλυκά δέντρα νοουμένου ότι πλησίον βρίσκονται άλλα αρσενικά που βοηθούν στη γονιμοποίηση.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Κυριότερος εχθρός της χουρμαδιάς είναι ο ρυγχοφόρος (*Rhynchophorus ferrugineus*). Αντέχει σε θερμοκρασίες μέχρι -10°C. Απαιτεί πλούσιο φωτισμό και νερό. Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 0- 600 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Κατάλληλο για παραθαλάσσιες φυτεύσεις. Φυτεύεται μεμονωμένα ή σε δεντροστοιχίες τόσο σε πάρκα, δημόσιους χώρους, κήπους.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

126. Ρομπελίνια
Phoenix roebelinii



126. Ρομπελίνια *Phoenix roebelinii*

Χρόνος Άνθησης: Άνοιξη

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Μικρού έως μέτριου μεγέθους φοίνικας, ύψους 2-3 μέτρων και φύλλα μήκους 60-120 εκ. Καρποί μικροί και βρώσιμοι.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Πολύ αργής ανάπτυξης φοίνικας. Αναπτύσσεται ικανοποιητικά τόσο σε σκιερούς χώρους όσο και σε χώρους με άπλετο ηλιακό φως. Ανθεκτικό στη ξηρασία και σε διάφορους εντομολογικούς εχθρούς (κυρίως στο ρυγχοφόρο- *Rhynchophorus ferrugineus*).

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Κατάλληλο για παραθαλάσσιες φυτεύσεις. Φυτεύεται μεμονωμένα ή σε δεντροστοιχίες τόσο σε πάρκα, δημόσιους χώρους, κήπους.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

127. Φόρμιο
Phormium tenax



127. Φόρμιο Phormium tenax

Χρόνος Άνθησης: Καλοκαίρι- Αρχές Φθινοπώρου

Απαιτήσεις σε νερό: **

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής θάμνος, ύψους 1-2 μέτρων με πολλά λογχοειδή, δερματώδη φύλλα.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Αναπτύσσεται καλύτερα σε ηλιαζόμενες θέσεις. Ανθεκτικό στα υδροσταγονίδια της θάλασσας και στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Κατάλληλο για μεμονωμένες φυτεύσεις. Ιδανικό για χρήση σε παραθαλάσσιες περιοχές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε φυτοδοχεία.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

128. Φωτίνια
Photinia x fraseri «Red Robin»



128. Φωτίνια Photinia x fraseri «Red Robin»

Χρόνος Άνθησης: Άνοιξη

Απαιτήσεις σε νερό: ***

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής θάμνος, ύψους 3-6 μέτρων, με φύλλα ελλειπτικά, ζωηρά, πράσινα τα οποία όταν είναι νεαρά έχουν ένα κόκκινο-μπρούτζινο χρώμα. Λευκά, αρωματικά λουλούδια σε ομπρελοειδής ταξιανθίες. Καρποί κόκκινοι, οι οποίοι γίνονται στη συνέχεια μαύροι.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Αναπτύσσεται ικανοποιητικά σε ηλιόλουστες θέσεις. Ανθεκτικό στους παγετούς. Απαιτεί καλό αερισμό.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Φυτεύεται μεμονωμένα ή κατά ομάδες σε κήπους. Μπορεί να διαμορφωθεί και ως μικρό δέντρο.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

129. Τραχεία πεύκη
Pinus brutia



129. Τραχεία πεύκη *Pinus brutia*

Χρόνος Άνθησης: Άνοιξη

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κωνοφόρο, ύψους 25-40 μέτρων. Φύλλα βελονοειδή, επιμήκη, ανά δύο. Ακανόνιστή μορφή κόμης.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Προσβάλλεται από την κάμπια των πεύκων (*Thaumetopoea pityocampa*). Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 0 - 1400 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Φυτεύεται μεμονωμένα ή σε ομαδικές φυτεύσεις σε κήπους και πάρκα. Κατάλληλο ως φρακτικό.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

130. Ήμερη πεύκη
Pinus pinea



130. Ήμερη πεύκη *Pinus pinea*

Χρόνος Άνθησης: Άνοιξη

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κωνοφόρο ύψους 15-25 μέτρων με σφαιρική μορφή κόμης. Βελόνες μακριές - σκουροπράσινες.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Δεν προσβάλλεται από την κάμπια των πεύκων (*Thaumetopoea pityocampa*). Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 0 - 1400 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Μεμονωμένο ή σε ομαδικές φυτεύσεις σε κήπους και πάρκα σε βαθιά εδάφη. Κατάλληλο ως φρακτικό.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

131. Πιστακία η ατλαντική (Τρεμιθιά)
Pistachia atlantica



131. Πιστακία η ατλαντική (Τρεμιθιά) *Pistachia atlantica*

Χρόνος Άνθησης: Τέλος Χειμώνα Μέσα Άνοιξης

Απαιτήσεις σε νερό: ***

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Φυλλοβόλο δέντρο, ύψους μέχρι 20 μέτρων, με πλατιά κόμη. Φύλλα πτεροειδή, άνθη κοκκινωπά σε ταξιανθίες και καρποί σφαιρικοί εδώδιμοι.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Αναπτύσσεται ικανοποιητικά σε ηλιόλουστες θέσεις και εδάφη με καλή αποστράγγιση. Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 0 -1500 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Χρήση σε πλατείες, πάρκα, κήπους με βαθιά εδάφη. Απαιτεί μεγάλους χώρους, για αυτό και θεωρείται ακατάλληλο για μικρούς κήπους.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

132. Πιστακία η σχίνος (Σχινιά)
Pistacia lentiscus



132. Πιστακία η σχίνος (Σχινιά) *Pistacia lentiscus*

Χρόνος Άνθησης: Τέλος Χειμώνα - Αρχές Άνοιξης

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής θάμνος ύψους μέχρι 4 μέτρων, με φύλλα πτεροειδή, άνθη κόκκινα σε ταξιανθίες και καρποί σφαιρικοί εδώδιμοι.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Αργός ρυθμός ανάπτυξης. Αναπτύσσεται ικανοποιητικά σε ηλιαζόμενες αλλά και ημισκιερές θέσεις. Ανθεκτικό στους παγετούς και ανέμους. Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 0 -800 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Ιδανικό για δημιουργία φρακτών και μαζικές φυτεύσεις πρανών. Κατάλληλο για παραθαλάσσιους κήπους.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

133. Πιττόσπορο
Pittosporum tobira



133. Πιττόσπορο *Pittosporum tobira*

Χρόνος Άνθησης: Μέσα Άνοιξης - Αρχές Καλοκαιριού

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής θάμνος ύψους 5 μέτρων, φύλλα ωοειδή με βαθύ πράσινο χρώμα, γυαλιστερά. Άνθη μυρωδάτα, άσπρα τα οποία αργότερα γίνονται κιτρινωπά.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Ανθεκτικό στους θαλάσσιους ανέμους και στη σκιά. Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 0 -900 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Κατάλληλο για δημιουργία φρακτών προστασίας από τη θάλασσα και ψαλιδιζόμενες μπορντούρες.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Μέτριο ως πολύ τοξικό (καρποί).

134. Λιθόσπαστο
Plantago maritima



134. Λιθόσπαστο *Plantago maritima*

Χρόνος Άνθησης: Άνθηση Μάρτιο μέχρι Οκτώβριο.

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πολυετής πόα ύψους μέχρι 0,15 μέτρα με φύλλα μακρόστενα, σαρκώδη. Λουλούδια κιτρινοκάστανα, σε πυκνή, μακρόστενη ταξιανθία σαν στάχυ.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Ευδοκιμεί σε παραθαλάσσιες περιοχές και αμμώδη εδάφη.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Κατάλληλο για βραχόκηπους και παραθαλάσσιες φυτεύσεις.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

135. Πλάτανος
Platanus orientalis



135. Πλάτανος *Platanus orientalis*

Χρόνος Άνθησης: Άνοιξη

Απαιτήσεις σε νερό: ***

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Φυλλοβόλο δέντρο, ύψους μέχρι 30 μέτρων. Φύλλα μεγάλα, παλαμοσχιδή. Άνθη σφαιρικά, τοποθετημένα σε ταξιανθίες. Πυραμιδοειδή μορφή κόμης.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Παρόλο ότι συναντάται σε όχθες ποταμών, εντούτοις μπορεί να αντέξει την ξηρασία. Προτιμά ηλιαζόμενες θέσεις και ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 0 -1700 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Κατάλληλο για δημιουργία πυκνής σκιάς. Κατάλληλο για φύτευση κοντά στη θάλασσα αλλά και μεμονωμένο σε χλόη.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

136. Πλουπάγκο
Plumbago auriculata



136. Πλουπάγκο *Plumbago auriculata*

Χρόνος Άνθησης: Καλοκαίρι- Φθινόπωρο-Χειμώνα (μερικές φορές)

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλές αναρριχητικό φυτό, με επιμήκη φύλλα και άνθη γαλάζια σαν χωνάκια.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Απαιτεί ηλιόλουστες θέσεις και δεν αντέχει τους παγετούς. Τα φθινόπωρο απαιτεί έντονο κλάδεμα. Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο από 0-500 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Χρήση ως αναρριχητικό και ως φρακτικό.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

137. Πλουμέρια (Ινδικό γιασεμί)
Plumeria alba



137. Πλουμέρια (Ινδικό γιασεμί) *Plumeria alba*

Χρόνος Άνθησης: Καλοκαίρι

Απαιτήσεις σε νερό: **

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Φυλλοβόλος θάμνος ή μικρό δέντρο, ύψους 6 περίπου μέτρων. Φύλλα μεγάλα, επιμήκη και άνθη μεγάλα, αρωματικά, λευκού χρώματος.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Αναπτύσσεται ικανοποιητικά σε ηλιόλουστες συνθήκες και ελαφριά εδάφη. Δεν αντέχει τη ξηρασία. Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 0 - 300 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Φυτεύεται κυρίως μεμονωμένα σε κήπους, πάρκα και πλατείες.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

138. Λεύκη
Populus alba



138. Λεύκη Populus alba

Χρόνος Άνθησης: Τέλος Χειμώνα - Αρχές Άνοιξης

Απαιτήσεις σε νερό: ***

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Φυλλοβόλο δέντρο, ύψους 15 - 20 μέτρων, με άσπρο - γκρι κορμό και φύλλα με άσπρο επίχρισμα στην κάτω επιφάνεια. Κολονοειδής μορφή κόμης.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Πολύ γρήγορος ρυθμός ανάπτυξης. Ευδοκίμει σε περιοχές με υψόμετρο 0 -1450 μέτρων. Το ξύλο του είναι ευπαθές και σπάζει εύκολα από ισχυρούς ανέμους.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Δημιουργία δεντροστοιχιών σε μεγάλες λεωφόρους και πάρκα. Κατάλληλο για παραθαλάσσιες περιοχές, απαιτεί εκτεταμένο χώρο για να αναπτυχθεί και επομένως είναι ακατάλληλο για μικρούς κήπους.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

139. Πολύγαλα
Polygala myrtifolia



139. Πολύγαλα *Polygala myrtifolia*

Χρόνος Άνθησης: Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο.

Απαιτήσεις σε νερό: **

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής θάμνος ύψους 1-1,5 μέτρων, όρθιας ανάπτυξης. Φύλλα επιμήκη, ανοιχτοπράσινα και φούξια άνθη με άσπρα νεύρα.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Αναπτύσσεται σε ηλιόλουστες θέσεις. Φυτό ευαίσθητο στο κρύο.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Φυτεύεται σε ομάδες και ελεύθερους φράχτες. Κατάλληλο και για παραθαλάσσιες φυτεύσεις.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

140. Πορτουλάκα (Μεταξάκι)
Portulaca grandiflora



140. Πορτουλάκα (Μεταξάκι) *Portulaca grandiflora*

Χρόνος Άνθησης: Καλοκαίρι- Φθινόπωρο

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Έρπον, ετήσιο φυτό ύψους μέχρι 10 εκ. με σαρκώδη, μικρά φύλλα. Πολυάριθμα, στρογγυλά άνθη, διαφόρων χρωμάτων.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Φυτό ανθεκτικό στη ξηρασία και στους ανέμους.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Κατ' εξοχήν φυτό βραχόκηπων. Κατάλληλο για δημιουργία χαμηλών, ανθικών πλαισίων καθώς και σε φυτοδοχεία ως κρεμαστό φυτό.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

141. Προυνιά
Prunus cerasifera “Pissardii”



141. Προυνιά *Prunus cerasifera* “Pissardii”

Χρόνος Άνθησης: Άνοιξη

Απαιτήσεις σε νερό: ***

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Φυλλοβόλο δέντρο με κόκκινο-βυσσινί φύλλα και ρόδινα άνθη. Σφαιρική μορφή κόμης.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Φυτό ανθεκτικό στο ψύχος και στη σκιά.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Φυτεύεται μοναχικά η σε μικρές ομάδες σε κήπους. Είναι κατάλληλο για μικρές εκτάσεις γιατί δεν μεγαλώνει πολύ.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

142. Πτιλόστεμο
Ptilostemon chamaepeuce



142. Πτιλόστεμο *Ptilostemon chamaepeuce*

Χρόνος Άνθησης: Τέλος Άνοιξης- Καλοκαίρι

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ενδημικός θάμνος, ύψους μέχρι 80 cm με πολλούς βλαστούς, στενά μακριά φύλλα και πορφυρά άνθη.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Ανθεκτικό στη ξηρασία. Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 0 -1600 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Φυτεύεται κυρίως σε βραχώδης θέσεις, πρανή αλλά και άλλες θέσεις του κήπου.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

143. Καλλωπιστική Ροδιά
Runica granatum var. *pleniflora*



143. Καλλωπιστική Ροδιά *Punica granatum* var. *pleniflora*

Χρόνος Άνθησης: Άνοιξη- Καλοκαίρι

Απαιτήσεις σε νερό: **

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Φυλλοβόλος θάμνος ή μικρό δέντρο, με στενά- επιμήκη φύλλα και άφθονα διπλά άνθη, κόκκινου χρώματος και σχετικά μεγάλου μεγέθους.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Απαιτεί ηλιόλουστες θέσεις και ελαφριά εδάφη. Ευδοκίμει σε περιοχές με υψόμετρο 0 -1200 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Χρησιμοποιείται μεμονωμένα ή κατά ομάδες σε κήπους και πάρκα. Κατάλληλο για δημιουργία φράκτη.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

144. Πυράκανθος
Pyracantha coccinea



144. Πυράκανθος *Pyracantha coccinea*

Χρόνος Άνθησης: Άνοιξη- Αρχές Καλοκαιριού

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής, ακανθώδης θάμνος, με πυκνή κόμη και ακανθωτά κλαδιά. Φύλλα επιμήκη και άφθονα άνθη, λευκού χρώματος. Καρποί μικροί, σφαιρικοί, κίτρινο- πορτοκαλί χρώματος (Φθινόπωρο).

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Απαιτεί ηλιόλουστες θέσεις αλλά δυνατό να επιβιώσει και σε ημισκιά. Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 0 -1700 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Κατ' εξοχήν φυτό φρακτών. Κλαδεύεται σε σχήματα, καλύπτει τοίχους και μπορεί να διαμορφωθεί σε δέντρο.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Χαμηλή ως μέτρια (καρποί).

145. Περνιά
Quercus coccifera



145. Περνιά *Quercus coccifera*

Χρόνος Άνθησης: Άνοιξη

Απαιτήσεις σε νερό: *


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής θάμνος ή μικρό δέντρο ύψους μέχρι 10 μέτρων με πλατιά, ακανόνιστη κόμη. Φύλλα σκληρά, δερματώδη, αγκαθωτά. Καρπός (βαλανίδι) κυλινδρικός, καστανός (Φθινόπωρο).

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Φυτό ανθεκτικό στις ψηλές θερμοκρασίες και τη ξηρασία. Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 100-1300 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Φυτεύεται σε παρόδιες φυτείες και κήπους. Επίσης μπορεί να φυτευτεί σε πρηνή εδάφη (με κλίση) που διαβρώνονται.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

146. Ψευδοακακία
Robinia pseudoacacia



146. Ψευδοακακία *Robinia pseudoacacia*

Χρόνος Άνθησης: Άνοιξη - Αρχές Καλοκαιριού

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Φυλλοβόλο δέντρο, ύψους 10-20 μέτρων, αραιή ελλειψοειδής μορφή κόμης με αγκάθια και άσπρα λουλούδια.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Ανθεκτικό φυτό στο ψύχος. Ευδοκιμεί σε όλα τα υψόμετρα.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Χρήση σε πάρκα και κατά μήκος δρόμων σε δεντροστοιχίες. Κατάλληλο για φύτευση σε εδάφη με κλίσεις π.χ πρανή.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Μέτριο ως πολύ τοξικό (εσωτερικός φλοιός, νέοι βλαστοί και σπόροι).

147. Τριανταφυλιά η δαμασκηνή
Rosa damascena



147. Τριανταφυλιά η δαμασκηνή *Rosa damascena*

Χρόνος Άνθησης: Μέσα Άνοιξης- Αρχές Καλοκαιριού

Απαιτήσεις σε νερό: **

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Φυλλοβόλος θάμνος, ύψους μέχρι 3 μέτρα με ωοειδή ή επιμήκη πριονωτά φύλλα. Λουλούδια ρόδινα, εύοσμα.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 0-1700 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Φύτευση μεμονωμένα ή κατά ομάδες.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

148. Δεντρολίβανο (Λασμαρί)
Rosmarinus officinalis



148. Δεντρολίβανο (Λασμαρί) *Rosmarinus officinalis*

Χρόνος Άνθησης: Τέλος Φθινοπώρου - Άνοιξη

Απαιτήσεις σε νερό: **

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής αρωματικός θάμνος με στενά, πράσινα φύλλα. Άνθη ποικίλων χρωμάτων (μπλε, ροζ, λευκό κ.τ.λ) ανάλογα με την ποικιλία.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Αναπτύσσεται σε θέσεις ηλιόλουστες. Αντέχει τους παγετούς, κατάλληλο για ξηρά, βραχώδη εδάφη. Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 0 -1400 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Κατάλληλο για δημιουργία χαμηλών πλαισίων. Αν κλαδεύεται χαμηλά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εδαφοκαλυπτικό. Κατάλληλο για φύτευση σε βραχόκηπους.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

149. Ρούσκος
Ruscus aculeatus



149. Ρούσκος *Ruscus acuelatus*

Χρόνος Άνθησης: Τέλος Χειμώνα - Αρχές Άνοιξης

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής θάμνος, ύψους μέχρι 1 μέτρου. Φύλλα οξύληκτα, άνθη πολύ μικρά, ανά δύο. Καρποί μικροί, κόκκινου χρώματος.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Φυτό ευαίσθητο στις χαμηλές θερμοκρασίες. Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 0 - 1100 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Χρησιμοποιείται σε κήπους και πάρκα, μοναχικό ή κατά ομάδες.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

150. Κοράλλι
Russelia juncea



150. Κοράλλι *Russelia juncea*

Χρόνος Άνθησης: Άνοιξη-Καλοκαίρι- Φθινόπωρο

Απαιτήσεις σε νερό: ***

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ημιαειθαλής θάμνος με ύψος μέχρι 1,5 μέτρο και αντίστοιχη διάμετρο. Έχει ορθόκλαδη ανάπτυξη και φέρει βελονοειδή φύλλα. Πλούσια ανθοφορία, με μικρά, χαρακτηριστικά σωληνοειδή άνθη χρώματος κόκκινου ή λευκού.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Φυτό ευαίσθητο στο κρύο και προτιμά ηλιαζόμενες περιοχές και θέσεις φύτευσης.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Μεμονωμένο ή κατά ομάδες σε κήπους.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

151. Ιτιά η κλαίουσα
Salix babylonica



151. Ιτιά η κλαίουσα *Salix babylonica*

Χρόνος Άνθησης: Άνοιξη

Απαιτήσεις σε νερό: ***

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Φυλλοβόλο δέντρο, ύψους μέχρι 12 μέτρων και πλάτους επίσης το ίδιο. Το φυτό έχει χαρακτηριστικό κρεμοκλαδές σχήμα και μακρείς βλαστούς με φύλλα λεπτά, ανοικτά πράσινα.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Φυτό ανθεκτικό στο ψύχος. Αναπτύσσεται καλύτερα σε ηλιαζόμενες θέσεις. Το ξύλο του σπάζει εύκολα. Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 0 -1400 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Ακατάλληλο για μικρούς κήπους λόγω του μεγάλου μεγέθους που αποκτά. Φυτεύεται μεμονωμένα σε μεγάλους κήπους.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

152. Φασκόμηλο Α (Σπατζιά)
Salvia fruticosa



152. Φασκόμηλο Α (Σπατζιά) *Salvia fruticosa*

Χρόνος Άνθησης: Μέσα Άνοιξης- Αρχές Καλοκαιριού

Απαιτήσεις σε νερό: **

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής, αρωματικός θάμνος ύψους μέχρι 1,2 μέτρα. Φύλλα τεφροπράσινα, ελαφρώς τριχωτά. Λουλούδια ρόδινα ή πορφυρά.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 0 - 1500 μέτρων. Ευαίσθητο σε ψηλή εδαφική υγρασία.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Κατάλληλο για κάλυψη επιφανειών και σε συνθέσεις με άλλα είδη.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

153. Φασκόμηλο Β (Σπατζιά, Τσαϊ του βουνού)
Salvia officinalis



153. Φασκόμηλο Β (Σπατζιά, Τσάϊ του βουνού) *Salvia officinalis*

Χρόνος Άνθησης: Άνοιξη

Απαιτήσεις σε νερό: **

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής, αρωματικός θάμνος ύψους μέχρι 1,2 μέτρα. Φύλλα τεφροπράσινα, πολύ τριχωτά. Λουλούδια ρόδινα ή πορφυροιώδη.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 0 - 1500 μέτρων. Ευαίσθητο σε ψηλή εδαφική υγρασία.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Κατάλληλο για κάλυψη επιφανειών και σε συνθέσεις με άλλα είδη.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

154. Ζαμπούκος
Sambucus nigra



154. Ζαμπούκος *Samolus nigra*

Χρόνος Άνθησης: Μέσα Άνοιξης-Μέσα Καλοκαιριού

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Μαλακόξυλος, φυλλοβόλος θάμνος ύψους μέχρι 10 μέτρα. Φύλλα πράσινα, σύνθετα, επιμήκη, λογχοειδή. Λουλούδια λευκά, σε τροχοειδή στεφάνη με 5 λοβούς.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Προτιμά γόνιμα εδάφη και ηλιαζόμενες ή ημισκιαζόμενες θέσεις. Ευδοκιμεί σε υψόμετρο 0-1200 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Φύτευση μεμονωμένα ή κατά ομάδες.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

155. Λεβαντίνη
Santolina chamaecyparissus



155. Λεβαντίνη *Santolina chamaecyparissus*

Χρόνος Άνθησης: Καλοκαίρι

Απαιτήσεις σε νερό: **

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλές, αρωματικός θάμνος ύψους 0,5 - 0,7 μέτρα. Φύλλα μικρά, γκριζοπράσινου χρώματος και κίτρινα σφαιρικά λουλούδια.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Απαιτεί πολύ ήλιο και αντέχει τους παγετούς. Κατάλληλο για ξηρά, βραχώδη εδάφη.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Ομαδική φύτευση σε πάρκα, κήπους και νησίδες δρόμων. Κατάλληλο για βραχόκηπους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γλάστρες σε ταρατσόκηπους.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

156. Σχίνος η μόλλειος (Αρτιμαθκιά, Αγριοπιπεριά)
Schinus molle



156. Σχίνος η μόλλειος (Αρτιμαθκιά, Αγριοπιπεριά) *Schinus molle*

Χρόνος Άνθησης: Μέσα Άνοιξης- Μέσα Φθινοπώρου

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλές δέντρο, ύψους 10 μέτρων και διαμέτρου 4 μέτρων. Φύλλα ανοικτοπράσινα σύνθετα και λουλούδια μικρά κιτρινωπά - άσπρα, χωρίς ιδιαίτερη καλλωπιστική αξία. Καρποί μικροί, κόκκινοι, σφαιρικοί (Φθινόπωρο).

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Δέντρο επιπολαιόριζο, για αυτό όταν φυτεύονται πρέπει να στηρίζονται με ισχυρούς πασσάλους αλλιώς κυρτώνουν. Ευδοκιμούν σε περιοχές με υψόμετρο 0 - 600 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Χρήση σε πάρκα, κήπους και δεντροστοιχίες.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

157. Μαστιχόδεντρο
Schinus terebinthifolius



157. Μαστιχόδεντρο *Schinus terebinthifolius*

Χρόνος Άνθησης: Αρχές Καλοκαιριού - Αρχές Φθινοπώρου

Απαιτήσεις σε νερό: **

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλές δέντρο, με κόμη πυκνή και οριζόντια κλαδιά. Φύλλα σύνθετα και καρποί κόκκινοι, σε μεγάλα αθροίσματα (τέλος φθινοπώρου-αρχές χειμώνα).

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Απαιτεί ηλιόλουστες θέσεις και αντέχει σε θερμοκρασίες μέχρι 5 °C. Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 0 - 400 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Χρήση σε πάρκα, κήπους και δεντροστοιχίες.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

158. Σέδο
Sedum spectabile



158. Σέδο *Sedum spectabile*

Χρόνος Άνθησης: Τέλος Φθινοπώρου- Μέσα Χειμώνα

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πολυετές φυτό, ύψους μέχρι 50 εκ. Φυλλά σαρκώδη, οδοντωτά και άνθη κόκκινα (σπανιότερα κίτρινα ή λευκά) τοποθετημένα σε ταξιανθίες.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Ανθεκτικό φυτό στη ξηρασία. Ανθεκτικό στις χαμηλές θερμοκρασίες και στις διάφορες μυκητολογικές / εντομολογικές ασθένειες.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Κατάλληλο για χρήση σε βραχόκηπους καθώς και ως εδαφοκαλυπτικό φυτό.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

159. Σεφλέρα Α (Ακτινόφυλλη)
Seflera actinophylla



159. Σεφλέρα Α (Ακτινόφυλλη) *Seflera actinophylla*

Χρόνος Άνθησης: Καλοκαίρι-Φθινόπωρο

Απαιτήσεις σε νερό: ***

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής θάμνος έως και μικρό δέντρο, ύψους 1,5-8 m .
Σύνθετα, λογχοειδή, πράσινα φύλλα με μακριούς μίσχους, τοποθετημένα σε διάταξη δακτυλιοειδή. Άνθη κόκκινα τοποθετημένα σε μακριά ταξιανθία.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Φυτό γρήγορης ανάπτυξης. Αναπτύσσεται καλύτερα σε σκιερά/ ημισκιερά μέρη του κήπου. Ευαίσθητο στον παγετό.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Φυτεύεται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα φυτά αρχιτεκτονικής μορφής σε κήπους. Κατάλληλο επίσης και σε φυτοδοχεία στην είσοδο πολυκατοικιών.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

160. Σεφλέρα Β
Seflera arboricola



160. Σεφλέρα Β *Seflera arboricola*

Χρόνος Άνθησης: Καλοκαίρι- Αρχές Φθινοπώρου

Απαιτήσεις σε νερό: ***

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Θάμνος αειθαλής έως και μικρό δέντρο ύψους μέχρι 4 μέτρων . Σύνθετα, παλαμοειδή, πράσινα φύλλα με μακριούς πράσινους ή κίτρινους μίσχους. Άνθη μικρά, πολυάριθμα, κίτρινα, τοποθετημένα σε μακριές ταξιανθίες.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Αναπτύσσεται καλύτερα σε σκιερά/ ημισκιερά μέρη του κήπου. Ευαίσθητο στον παγετό. Για δημιουργία συμπαγών φυτών θα πρέπει να γίνονται τακτικά κορυφολογήματα.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Φυτεύεται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα φυτά αρχιτεκτονικής μορφής σε κήπους. Κατάλληλο επίσης και σε φυτοδοχεία στην είσοδο πολυκατοικιών.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

161. Σενέκλιο (Σινεράρια)
Senecio cineraria



161. Σενέκιο (Σινεράρια) *Senecio cineraria*

Χρόνος Άνθησης: Τέλος Άνοιξης- Καλοκαίρι

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πολυετές φυτό με φύλλα βελούδινα, λευκόγκριζου χρωματισμού και άνθη κίτρινα.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Ανθεκτικό τόσο στο ψύχος όσο και στις υψηλές θερμοκρασίες. Αναπτύσσεται σε ηλιαζόμενα και ημισκιερά μέρη.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Συνίσταται για βραχώδης κήπους και για παραθαλάσσιες περιοχές. Φυτεύεται σε απλή η διπλή σειρά δημιουργώντας ωραία φυτικά πλαίσια και χρωματική αντίθεση με άλλα ανθοκομικά είδη.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

162. Σιδηρίτης Α (Τσάϊ του βουνού)
Sideritis cypria



162. Σιδηρίτης Α (Τσάϊ του βουνού) *Sideritis cypria*

Χρόνος Άνθησης: Καλοκαίρι

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής, αρωματικός θάμνος, ύψους μέχρι 0,6 μέτρα. Φύλλα ωοειδή, με πυκνό τρίχωμα. Λουλούδια ωχροκίτρινα. Δημιουργεί σταχυοειδή ταξιανθία ύψους 0,3 μέτρα.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 300-900 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Κατάλληλο για βραχόκηπους ή ως εδαφοκαλυπτικό.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

163. Σιδηρίτης Β (Τσάϊ του βουνού)
Sideritis perfoliata



163. Σιδηρίτης Β (Τσάϊ του βουνού) *Sideritis perfoliata*

Χρόνος Άνθησης: Τέλος Άνοιξης- Μέσα Καλοκαιριού

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής, αρωματικός θάμνος ύψους μέχρι 1 μέτρου. Φύλλα ωοειδή, με πυκνό τρίχωμα. Λουλούδια ωχροκίτρινα. Δημιουργεί σταχυοειδή ταξιανθία, ύψους 0,3 μέτρα.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Ευδοκιμεί σε εδάφη με καλή αποστράγγιση.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Κατάλληλο για σκοπούς εδαφοκάλυψης και βραχόκηπους.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

164. Σολάνουμ
Solanum rantonnetii



164. Σολάνουμ *Solanum rantonnetii*

Χρόνος Άνθησης: Άνοιξη- Καλοκαίρι- Φθινόπωρο

Απαιτήσεις σε νερό: **

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ημιφυλλοβόλος, κρεμμοκλαδής θάμνος, ύψους 1-2 μέτρων. Λουλούδια μικρά, χρώματος μωβ-μπλε.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Για πλούσια ανθοφορία πρέπει να φυτεύεται σε ηλιόλουστες θέσεις. Ανθεκτικό φυτό στο κρύο.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Φυτεύεται κυρίως σε συστάδες θάμνου, σε κήπους και πάρκα. Εύκολος σχηματισμός σε μορφή μπάλας.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

165. Σοφόρα
Sophora japonica



165. Σοφόρα *Sophora japonica*

Χρόνος Άνθησης: Καλοκαίρι - Αρχές Φθινοπώρου

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Φυλλοβόλο δέντρο, ύψους 20-25 μέτρων, με στρογγυλή κόμη. Φύλλα σύνθετα και άφθονα, λευκά άνθη σε ταξιανθίες.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Τα άνθη του ελκύουν πάρα πολύ τις μέλισσες. Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 0 - 700 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Χρησιμοποιείται κυρίως σε πεζοδρόμια στις πόλεις καθώς και σε πάρκα. Κατάλληλο για δεντροστοιχίες.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Χαμηλή ως μέτρια τοξικότητα (σπόροι).

166. Σπάρτιο
Spartium junceum



166. Σπάρτιο *Spartium junceum*

Χρόνος Άνθησης: Μέσα Άνοιξης - Μέσα Καλοκαιριού

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής θάμνος, ύψους 2-3 μέτρων με μακριούς λεπτούς βλαστούς σχεδόν χωρίς φύλλα. Άνθη κίτρινα, αρωματικά και καρπούς σαν φασολάκι.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Αναπτύσσεται και ανθίζει ικανοποιητικά σε ηλιόλουστες θέσεις. Ανθεκτικό στους παγετούς και στα υδροσταγονίδια της θάλασσας. Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 0-1500 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Φυτεύεται κυρίως σε πλαγιές λόγω του ότι προστατεύει το έδαφος από τη διάβρωση λόγω του πλούσιου ριζικού συστήματος που διαθέτει. Κατάλληλο για χρήση σε παραθαλάσσιους κήπους.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

167. Στεφανωτή
Stephanotis floribunda



167. Στεφανωτή *Stephanotis floribunda*

Χρόνος Άνθησης: Καλοκαίρι

Απαιτήσεις σε νερό: ***

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής θάμνος, ύψους έως 5 μέτρων με μεγάλα, δερματώδη, φύλλα. Λευκά, αρωματικά λουλούδια.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Αναπτύσσεται ικανοποιητικά σε φωτεινά μέρη χωρίς ωστόσο να υπάρχει απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως. Ευαίσθητο στον παγετό.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Χρήση ως αναρριχητικό.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

168. Στρελλίτσια Α (Λευκό πουλί του παραδείσου)
Strellitsia nicolai



168. Στρελλίτσια Α (Λευκό πουλί του παραδείσου) *Strellitsia nicolai*

Χρόνος Άνθησης: Άνοιξη, Καλοκαίρι, Χειμώνας

Απαιτήσεις σε νερό: ***


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλές φυτό, ύψους 6 μέτρων περίπου, με μεγάλα πράσινα φύλλα. Εντυπωσιακά λευκά άνθη με μωβ αποχρώσεις, που μοιάζουν με πουλί.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Ευαίσθητο στο κρύο και στους ανέμους (σχίσσιμο και κάψιμο φύλλων περιμετρικά). Αναπτύσσεται ικανοποιητικά σε συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας αλλά ανέχεται και την ημισκιά.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Κατάλληλο και για παραθαλάσσιες φυτεύσεις. Φυτεύεται σε βραχόκηπους, ομάδες και γλάστρες.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

169. Στρελλίτσια Β (Πουλί του παραδείσου)
Strellitsia reginae



169. Στρελλίτσια Β (Πουλί του παραδείσου) *Strellitsia reginae*

Χρόνος Άνθησης: Άνοιξη, Καλοκαίρι, Χειμώνας

Απαιτήσεις σε νερό: ***

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλές ποώδες φυτό με μεγάλα πράσινα φύλλα και εντυπωσιακά πολύχρωμα άνθη που μοιάζουν με πουλί.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Ευαίσθητο στο κρύο και στους ανέμους (σχίσσιμο και κάψιμο φύλλων περιμετρικά). Αναπτύσσεται ικανοποιητικά, σε συνθήκες πλήρης ηλιοφάνειας αλλά ανέχεται και την ημισκιά.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Κατάλληλο και για παραθαλάσσιες φυτεύσεις. Φυτεύεται σε βραχόκηπους, ομάδες και γλάστρες.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

170. Πασχαλιά
Syringa vulgaris



170. Πασχαλιά *Syringa vulgaris*

Χρόνος Άνθησης: Τέλος Άνοιξης- Μέσα Καλοκαιριού

Απαιτήσεις σε νερό: ***

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Φυλλοβόλο, μικρό δέντρο ύψους μέχρι 7 μέτρων. Φύλλα καρδιόσχημα και πολυάριθμα άνθη διαφόρων χρωμάτων ανάλογα με την ποικιλία, τοποθετημένα σε ταξιανθίες σαν τσαμπιά.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο από 100- 1700 μέτρων. Για πλούσια ανθοφορία πρέπει να φυτεύεται σε ηλιόλουστες θέσεις. Ανθεκτικό φυτό στο κρύο.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Φυτό κατάλληλο για ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Ωστόσο αν ποτίζεται κανονικά μπορεί να φυτευτεί και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Χρήση ως μεμονωμένο ή κατά ομάδες.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

171. Κατιφές (Ταγέτης)
Tagetes erecta



171. Κατιφές (Ταγέτης)

Tagetes erecta

Χρόνος Άνθησης: Άνοιξη- Φθινόπωρο

Απαιτήσεις σε νερό: ***

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ετήσιο φυτό ύψους μέχρι 90 εκ. ανάλογα με την ποικιλία. Φύλλα στενά, επιμήκη και άνθη σφαιρικά χρώματος πορτοκαλί, χρυσού, κίτρινου.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Ανθεκτικό φυτό στη ξηρασία και ευπαθές στο ψύχος.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Κατάλληλο για βραχόκηπους ή ως εδαφοκαλυπτικό.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

172. Αλμυρίκι
Tamarix parviflora



172. Αλμυρίκι *Tamarix parviflora*

Χρόνος Άνθησης: Άνοιξη

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Φυλλοβόλος θάμνος, ύψους 3-4 μέτρων. Κλαδιά λεπτά, κυρτά και φύλλα πολύ λεπτά, πράσινα, οδοντωτά. Λουλουδια ελαφρώς ρόζ.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Απαιτεί πλήρως ηλιαζόμενες θέσεις. Αποτελεί το πλέον ανθεκτικό φυτό στα υδροσταγονίδια της θάλασσας.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Χρήση κυρίως ως φρακτικό φυτό σε παραλίες και γενικότερα παραθαλάσσιες περιοχές.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

173. Τεκόμα
Tecoma stans



173. Τεκόμα *Tecoma stans*

Χρόνος Άνθησης: Μέσα Φθινοπώρου - Μέσα του Χειμώνα

Απαιτήσεις σε νερό: **

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Θάμνος ή μικρό δέντρο, ημιαειθαλής, με σύνηθες ύψος τα 2 – 4.5 μέτρα. Φύλλα σύνθετα και άνθη έντονα κίτρινα, αρωματικά.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Φυτό γρήγορης ανάπτυξης. Αναπτύσσεται καλύτερα σε συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας. Ευδοκίμει σε περιοχές με υψόμετρο 0 -200 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Φυτεύεται μεμονωμένα ή κατά ομάδες σε κήπους, πάρκα, πλατείες.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

174. Καλλιτρίδα
Tetraclinis articulata



174. Καλλιτρίδα *Tetraclinis articulata*

Χρόνος Άνθησης: Άνοιξη

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κωνοφόρο ύψους 6-15 μέτρων, με πυραμοειδή κόμη και φύλλα λεπιοειδή, ανοιχτοπράσινα. Καρπός ξυλώδης, στρογγυλός κώνος.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Επιδέχεται αυστηρά κλαδέματα. Ανθεκτικό στις ακραίες θερμοκρασίες του νησιού μας. Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 0 - 900 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Άριστο φρακτικό αλλά και χρήση ως ανεμοθραύστης. Μπορεί επίσης να φυτευτεί και ως μεμονωμένος θάμνος.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

175. Τεύκριο
Teucrium fruticans



175. Τεύκριο *Teucrium fruticans*

Χρόνος Άνθησης: Καλοκαίρι

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής θάμνος ύψους μέχρι 2,5 μέτρων με γκριζοπράσινα φύλλα και μπλε-μωβ ή άσπρα λουλούδια.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Αναπτύσσεται ικανοποιητικά σε ηλιόλουστα μέρη αλλά και σε ημισκιά. Αντέχει στα υδροσταγονίδια της θάλασσας.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Εξαιρετικό είδος για κλαδεμένους ή μη φράκτες.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

176. Θηβαίτεια
Thevetia nerifolia



176. Θηβαίτεια *Thevetia nerifolia*

Χρόνος Άνθησης: Τέλος Άνοιξης - Χειμώνα

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής θάμνος ή μικρό δέντρο ύψους 6-10 μέτρων. Φύλλα στενά, επιμήκη και λουλούδια αρωματικά, κιτρινοπορτοκαλλί σε σχήμα χωνιού. Καρποί γωνιώδης, αρχικά κόκκινοι και μετά μαύροι.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Δεν αντέχει τους παγετούς. Αναπτύσσεται ικανοποιητικά σε ηλιόλουστες θέσεις, ενώ αντέχει σε μερική σκιά. Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 0 -300 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Χρήση σε πάρκα και κήπους, μεμονωμένα ή κατά ομάδες.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Πολύ τοξικό (όλα τα μέρη).

177. Θούγια
Thuja occidentalis



177. Θούγια *Thuja occidentalis*

Χρόνος Άνθησης: Άνοιξη

Απαιτήσεις σε νερό: *


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής θάμνος, όρθιας ανάπτυξης. Φύλλα βελόνες, λεπιδωτές, πρασινοκίτρινου χρώματος .

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Αναπτύσσεται σε ηλιόλουστες συνθήκες και είναι ανθεκτικό στο κρύο. Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 0-1300 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Κατάλληλο για μεμονωμένη φύτευση ή σε συστάδες. Κλαδεύεται και αποκτά διάφορα σχήματα. Ιδανικό για δημιουργία ανεμοφρακτών και για χρήση σε μικρούς κήπους.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

178. Θυμάρι Α (Θρουμπί)
Thymus capitatus



178. Θυμαρί Α (Θρουμπί) *Thymus capitatus*

Χρόνος Άνθησης: Τέλος Άνοιξης - Μέσα Φθινοπώρου

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής, αρωματικός θάμνος ύψους μέχρι 0,5 μέτρο. Φύλλα μικρά, πρασινωπά και λουλούδια λευκά-ροζ, πολυάριθμα.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Μπορεί να αναπτυχθεί σε άγονα, πετρώδη εδάφη. Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 0 - 900 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Κατάλληλο για αξιοποίηση άγονων, βραχωδών και επικλινών εδαφών που κινδυνεύουν από διάβρωση.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

179. Θυμαρί Β (Θρουμπί)
Thymus integer



179. Θυμάρι Β (Θρουμπί) *Thymus integer*

Χρόνος Άνθησης: Μέσα Άνοιξης - Αρχές Καλοκαιριού

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής, αρωματικός θάμνος ύψους μέχρι 0,1 μέτρα. Φύλλα μικρά, πρασινωπά και λουλούδια, λευκά-ροζ, πολυάριθμα.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 100 - 1700 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Κατάλληλο για φύτευση σε βραχώδη, βαθιά ή αβαθή εδάφη ή ακόμη σε σχισμές βράχων.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

180. Θυμαρί Γ
Thymus vulgaris



180. Θυμάρι Γ Thymus vulgaris

Χρόνος Άνθησης: Μέσα Άνοιξης - Μέσα Καλοκαιριού

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής θάμνος ύψους 0,1 - 0,8 μέτρα, αρωματικός με φύλλα σταχτόγκριζα με ελαφρώς χνουδωτό το κάτω μέρος. Λουλούδια λευκά πολυάριθμα.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Αναπτύσσεται σε ηλιόλουστα μέρη, ανθεκτικό στους παγετούς, αναπτύσσεται ικανοποιητικά σε φτωχά και ξηρά εδάφη .

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Άριστο εδαφοκαλυπτικό φυτό.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

181. Τιπουάνα Τίπου (Μαχαίριον)
Tiriana tiri



181. Τιπουάνα Τίπου (Μαχαίριον)

Tiruaana tiru

Χρόνος Άνθησης: Τέλος Άνοιξης- Καλοκαίρι

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Φυλλοβόλο έως ημιφυλλοβόλο δέντρο ύψους 7 μέχρι 35 μέτρων. Σχηματίζει πολύ ανοικτή κόμη, σύνθετα φύλλα, κίτρινα άνθη και καρπούς σαν φασόλια.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Αντέχει σε θερμοκρασίες μέχρι -4°C καθώς και σε συνθήκες ξηρασίας. Φυτό ευπαθές στους ανέμους με αποτέλεσμα το ξύλο του σπάζει εύκολα. Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 0 -300 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Χρήση σε κήπους, πάρκα, πλατείες και σε χώρους στάθμευσης.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

182. Τουλπάτσια
Tulbaghia violacea



182. Τουλπάτσια *Tulbaghia violacea*

Χρόνος Άνθησης: Καλοκαίρι- Φθινόπωρο

Απαιτήσεις σε νερό: **

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πολυετές φυτό, ύψους μέχρι 60 εκ. και πλάτους μέχρι 25 εκ. Φύλλα στενά, επιμήκη και χωνοειδή άνθη χρώματος μωβ-λιλά.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Απαιτεί ηλιόλουστες συνθήκες για πλούσια ανθοφορία και προστασία από τον παγετό.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Μοναχικό ή κατά ομάδες σε κήπους, πάρκα, πλατείες και νησίδες δρόμων.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

183. Βιβούρνο Α
Viburnum tinus



183. Βιβούρνο Α *Viburnum tinus*

Χρόνος Άνθησης: Άνοιξη - Καλοκαίρι

Απαιτήσεις σε νερό: **

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής θάμνος, ύψους περίπου 5 μέτρων. Φύλλα ωοειδή, σκληρά. Άνθη μικρά, λευκορόδινα και αρωματικά.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Αναπτύσσεται σε ηλιόλουστες ή ημισκιερές συνθήκες και είναι ανθεκτικό στους παγετούς. Επιδέχεται αυστηρό κλάδεμα. Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 0 -1200 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Κατ' εξοχήν θάμνος πλαισίων. Ενίοτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μεμονωμένα.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

183A. Βιβούρνο Β
Viburnum tinus var. *lucidum*



183Α. Βιβούρνο Β *Viburnum tinus var. lucidum*

Χρόνος Άνθησης: Άνοιξη

Απαιτήσεις σε νερό: **

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Θάμνος αειθαλής γρήγορης ανάπτυξης με γυαλιστερό, ανοιχτό πράσινο φύλλωμα. Κάνει ομπρελοειδείς ταξιανθίες με λευκό-κρεμ χρώμα.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Ανθεκτικό στο ψύχος, στις ημισκιερές θέσεις και στο δυνατό άνεμο. Αναπτύσσεται καλύτερα σε μέτρια και με καλή αποστράγγιση εδάφη.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Συναντάται μεμονωμένο, συστάδες ή ομάδες, σε φράχτες ακόμα και ζαρντινιέρες.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

184. Βίνκα (Δαφνάκι)
Vinca minor



184. Βίνκα (Δαφνάκι) Vinca minor

Χρόνος Άνθησης: Άνοιξη- Καλοκαίρι- Φθινόπωρο

Απαιτήσεις σε νερό: **

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πολυετές φυτό με πράσινα, οβάλ φύλλα και άνθη διαφόρων χρωμάτων, ανάλογα με την ποικιλία.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Φυτό ευαίσθητο στο κρύο και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Ανθοφορεί κανονικά όταν φυτεύεται σε προσήλιες θέσεις.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Χρήση σε ομαδικές φυτεύσεις για σκοπούς εδαφοκάλυψης. Κατάλληλο για χρήση σε φυτοδοχεία.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

185. Κόκκινη Λυγαριά
Vitex trifolia purpurea



185. Κόκκινη Λυγαριά *Vitex trifolia purpurea*

Χρόνος Άνθησης: Καλοκαίρι- αρχές Χειμώνα

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Θάμνος με δίχρωμο φύλλο: από πάνω σκούρο πράσινο και από κάτω μωβ. Τα λουλούδια του φέρουν χρώμα μωβ-ροζ.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Φυτό γρήγορης ανάπτυξης. Ευδοκίμει σε ηλιόλουστες ή ημισκιερές θέσεις.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Κατάλληλο για παραθαλάσσιες φυτεύσεις. Χρήση κυρίως ως φρακτικό.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

186. Φοίνικας *Washingtonia*
Washingtonia filifera



186. Φοίνικας *Washingtonia* *Washingtonia filifera*

Χρόνος Άνθησης: Μέσα Άνοιξης - Αρχές Καλοκαιριού

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Φοίνικας ύψους μέχρι 30 μέτρων. Φύλλα μεγάλα, παλαμοειδή, σύνθετα, με μακρύ μίσχο και σκληρά αγκάθια. Οι άκρες του καλύπτονται με μακριές υπόλευκες ίνες. Κορμός ισοδιαμετρικός.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Αργής ανάπτυξης φοίνικας με κυριότερο εχθρό το ρυγχοφόρο (*Rhynchophorus ferrugineus*) . Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμετρο 0 - 600 μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Κατάλληλο για παραθαλάσσιες φυτεύσεις. Φυτεύεται μεμονωμένα ή σε δεντροστοιχίες τόσο σε πάρκα, δημόσιους χώρους, κήπους.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

187. Γλυσίνια
Wisteria sinensis



187. Γλυσίνια *Wisteria sinensis*

Χρόνος Άνθησης: Μέσα Άνοιξης - Αρχές Καλοκαιριού

Απαιτήσεις σε νερό: **

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αναρριχητικό φυτό ύψους 10 περίπου μέτρων με φύλλα σύνθετα και λουλούδια αρωματικά χρώματος γαλάζιο - βιολετί.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Αναπτύσσεται σε ηλιόλουστες ή ημισκιερές θέσεις, αντέχει τους παγετούς. Κλαδεύεται μετά την άνθηση.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Χρήση ως αναρριχητικό.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Χαμηλή ως μέτρια τοξικότητα (σπόροι).

188. Γιούκα
Yucca aloifolia



188. Γιούκα *Yucca aloifolia*

Χρόνος Άνθησης: Καλοκαίρι- Φθινόπωρο

Απαιτήσεις σε νερό: *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλής θάμνος ύψους 2-2,5 μέτρων, με σκουροπράσινα, αιχμηρά, δερματώδη φύλλα. Λουλούδια άσπρα σε μεγάλη ταξιανθία.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Αναπτύσσεται σε ηλιόλουστες ή ημισκιερές θέσεις, αντέχει τους παγετούς. Κλαδεύεται μετά την άνθηση.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Φύτευση κυρίως μεμονωμένα. Κατάλληλο για κήπους με εξωτικό χαρακτήρα. Κατάλληλο επίσης για βραχόκηπους αλλά και για φυτοδοχεία.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.

189. Ζεμπρίνα
Zembrina pendula



189. Ζεμπρίνα *Zembrina pendula*

Χρόνος Άνθησης: Καλοκαίρι- Φθινόπωρο

Απαιτήσεις σε νερό: ***

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αειθαλές, πολυετές φυτό με επιμήκη φύλλα κόκκινου ή μωβ χρώματος.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Φυτό πολύ γρήγορης ανάπτυξης. Ευαίσθητο στον παγετό. Αρέσκει στη σκιά.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ: Χρησιμοποιείται κυρίως ως εδαφοκαλυπτικό. Κατάλληλο επίσης και για χρήση ως κρεμμαστό φυτό γλάστρας.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.