



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011  
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. 4373-P (Έντυπο 03) για χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου σε φυτοπροστατευτικό προϊόν

χορηγείται άδεια παράλληλου εμπορίου στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **EXALT® 25 SC** με τα ακόλουθα στοιχεία:

**A) Γενικά στοιχεία άδειας**

1. Αριθμός Άδειας:

3805-P

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

06/10/2020

Ημερομηνία λήξης άδειας:

30/06/2025

2. Κάτοχος της άδειας:

A. D Georoniki Ltd

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

A. D Georoniki Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

A. D Georoniki Ltd

## Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

2. Μορφή:

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

5. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη ή δοχείο	0.25L – 15L	HDPE / PET

## Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

4. Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

## Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

### 1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Το EXALT® 25 SC περιέχει την δραστική εντομοκτόνο ουσία spinetoram, της χημικής ομάδας των spinosyns. Δρα διαφοροποιώντας την νικοτινική δράση στο νευρικό σύστημα των εντόμων μέσω ενός νέου σημείου σύναψης του νικοτινικού υποδοχέα. Το συγκεκριμένο σημείο σύναψης διαφέρει από εκείνο στο οποίο δρουν άλλες ομάδες εντομοκτόνων (νεονικοτινοειδή, άλλα νικοτικά δραστικά, αβερμεκτίνες, πυρεθροειδή). Ο θάνατος του εντόμου είναι αποτέλεσμα κατάποσης ή απορρόφησης.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκάσμο καλύψεως φυλλώματος.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Ανακινείστε καλά τη συσκευασία πριν το άνοιγμά της. Γεμίστε το βυτίο με νερό μέχρι τη μέση, αρχίστε την ανακίνηση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Συμπληρώστε το νερό στο βυτίο αναδεύοντας συνεχώς. Ψεκάστε έχοντας την ανάδευση σε λειτουργία. Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό για το ψεκαστικό μίγμα και χρησιμοποιείτε το μίγμα αμέσως μετά την προετοιμασία του.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Όλα τα μέρη του ψεκαστικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανόμενων των ψεκαστήρων πλάτης) πρέπει να πλένονται σχολαστικά στο εξωτερικό και στο εσωτερικό τμήμα τους. Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό, δύο με τρεις φορές, αφαιρώντας τον αφρό και τα ορατά υπολείμματα. Το νερό του ξεπλύματος να εφαρμόζεται στην καλλιέργεια αν είναι δυνατό, σύμφωνα με την ισχύουσα Γεωργική Πρακτική.

## 5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόσεις		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	κ.εκ σκ./δεκ. μέγιστη		
Τομάτα Μελιτζάνα Πιπεριά Πιπεριά Chili (Υπαίθρου)	<b>Θρίπας</b> <i>Frankliniella occidentalis</i> <b>Προνύμφες</b> <b>Λεπιδοπτέρων</b> ( <i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera sp.</i> ) <b>Τούτα</b> <i>Tuta Absoluta</i>	20 – 100	240	Θρίπας: Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Προνύμφες Λεπιδοπτέρων: Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών. Εφαρμογές από το στάδιο του 4ου φύλλου και έως την ωρίμανση των καρπών. <b>BBCH 14-89</b>	1
Τομάτα Μελιτζάνα Πιπεριά Πιπεριά Chili (Θερμοκηπίου)		20 – 150			3 εφαρμογές σε μεσοδιαστήματα 14 ημερών.
<b>ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ</b> με βρώσιμο φλοιό Αγγούρι, Κολοκύθι (Υπαίθρου)	<b>Θρίπας</b> <i>Frankliniella occidentalis</i> <b>Προνύμφες</b> <b>Λεπιδοπτέρων</b> ( <i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera sp.</i> )	30 – 150	240	Θρίπας: Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. <b>Προνύμφες Λεπιδοπτέρων:</b> Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών.  Εφαρμογές από το στάδιο του 4 <sup>ου</sup> φύλλου και έως την ωρίμανση των καρπών. <b>BBCH 11-89</b>	1
<b>ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ</b> με μη βρώσιμο φλοιό Κολοκύθα Καρπούζι Πεπόνι (Υπαίθρου)					3 εφαρμογές σε μεσοδιαστήματα 14 ημερών.
<b>ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ</b> με βρώσιμο φλοιό Αγγούρι Κολοκύθι (Θερμοκηπίου)					
<b>ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ</b> με μη βρώσιμο φλοιό Κολοκύθα Καρπούζι Πεπόνι (Θερμοκηπίου)					

<p><b>ΣΤΑΥΡΑΝΘΗ</b> (Υπαίθρου) <b>Λάχανο (Κραμπί)</b> <b>Μπρόκολο</b> <b>Κουνουπίδι</b> <b>Λάχανο Βρυξελλών</b></p>	<p><b>Προνύμφες</b> <b>Λεπιδοπτέρων</b> (<i>Heliothis armigera</i>, <i>Spodoptera</i> sp., <i>Pieris</i> sp, <i>Plutella</i> sp., <i>Mamestra brassicae</i>)</p> <p><b>Θρίπας</b> <i>Frankliniella occidentalis</i></p>	<p>30 – 100</p>	<p>200</p>	<p><b>Θρίπας:</b> Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.</p> <p><b>Προνύμφες Λεπιδοπτέρων:</b> Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών.</p> <p>Εφαρμογές από το στάδιο των πλήρως αναπτυγμένων κοτυληδόνων και έως ότου οι κεφαλές/ ανθοκεφαλές αποκτήσουν το κανονικό σχήμα και μέγεθος.</p> <p><b>BBCH 10-49</b></p>	<p>1</p>
<p><b>ΦΥΛΛΩΔΗ</b> <b>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</b> (Υπαίθρου) <b>Μαρούλι</b> <b>Λυκοτρίβολο</b> <b>Ρόκα, Σινάπι</b> <b>Αντίδι</b></p>	<p><b>Θρίπας</b> <i>Frankliniella occidentalis</i></p> <p><b>Προνύμφες</b> <b>Λεπιδοπτέρων</b> (<i>Heliothis armigera</i>, <i>Spodoptera</i> sp.)</p>	<p>20 – 100</p>	<p>200</p>	<p><b>Θρίπας:</b> Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.</p> <p><b>Προνύμφες Λεπιδοπτέρων:</b> Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών.</p>	<p>1</p>
<p><b>Σπανάκι</b> <b>Σέσκουλο</b> <b>Αντράκλα</b> (Υπαίθρου)</p>	<p><b>Θρίπας</b> <i>Frankliniella occidentalis</i></p> <p><b>Προνύμφες</b> <b>Λεπιδοπτέρων</b> (<i>Heliothis armigera</i>, <i>Spodoptera</i> sp.)</p>	<p>30 – 100</p>	<p>200</p>	<p>Εφαρμογές από το στάδιο του 1<sup>ου</sup> φύλλου και έως οι κεφαλές αποκτήσουν το κανονικό σχήμα και μέγεθος.</p> <p><b>BBCH 11-49</b></p>	<p>1</p>
<p><b>ΦΥΛΛΩΔΗ</b> <b>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</b> (Θερμοκηπίου) <b>Μαρούλι</b> <b>Λυκοτρίβολο</b> <b>Ρόκα, Αντίδι</b></p>	<p><b>Θρίπας</b> <i>Frankliniella occidentalis</i></p> <p><b>Προνύμφες</b> <b>Λεπιδοπτέρων</b> (<i>Heliothis armigera</i>, <i>Spodoptera</i> sp.)</p>	<p>20 – 100</p>	<p>200</p>	<p>Εφαρμογές από το στάδιο του 1ου φύλλου</p> <p><b>BBCH 11-49</b></p>	<p>3 εφαρμογές σε μεσοδιαστήματα 14 ημερών.</p>
<p><b>Φράουλα</b> (Υπαίθρου)</p>	<p><b>Δροσόφυλλα</b> <i>Drosophila suzukii</i></p> <p><b>Θρίπας</b> <i>Frankliniella occidentalis</i></p>	<p>20 – 100</p>	<p>200</p>	<p><b>Θρίπας:</b> Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.</p> <p><b>Προνύμφες Λεπιδοπτέρων/ Δροσόφυλλα:</b></p> <p>Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών.</p>	<p>1</p>
<p><b>Φράουλα</b> (Θερμοκήπιου)</p>	<p><b>Προνύμφες</b> <b>Λεπιδοπτέρων</b> (<i>Heliothis armigera</i>, <i>Spodoptera</i> sp.)</p>	<p>20 – 150</p>	<p>200</p>	<p>Εφαρμογές από το στάδιο του 1<sup>ου</sup> φύλλου και έως οι κεφαλές αποκτήσουν το κανονικό σχήμα και μέγεθος.</p> <p><b>BBCH 11-89</b></p>	<p>3 εφαρμογές σε μεσοδιαστήματα 28 ημερών.</p>

<b>ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ ΒΟΛΒΩΔΗ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ</b> (Υπαιθρου)	<b>Θρίπας</b> ( <i>Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci</i> )	30 – 100	200	<b>Θρίπας:</b> Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. <b>Προνύμφες Λεπιδοπτέρων/:</b> Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών <b>BBCH 11-89</b>	1
<b>ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ ΒΟΛΒΩΔΗ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ</b> (Θερμοκήπιού)	<b>Προνύμφες Λεπιδοπτέρων</b> <i>Spodoptera sp.</i>	30 – 150			2 εφαρμογές σε μεσοδιαστήματα 14 ημερών.
<b>ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΜΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (BBCH 61 – 69).</b>					

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Σταυρανθή	7 ημέρες
Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Πιπεριά Chili, Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο και μη βρώσιμο φλοιό, Φυλλώδη λαχανικά, Φράουλα,	3 ημέρες
Καλλωπιστικά φυτά, Δένδρα και Θάμνοι, Βολβώδη και Λουλούδια, Τριανταφυλλιά	M.E

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 5**

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, μην εφαρμόζετε το συγκεκριμένο σκεύασμα ή οποιοδήποτε άλλο σκεύασμα που περιέχει spinetoram, για την αντιμετώπιση του *Tuta absoluta* και του *Frankliniella occidentalis*, πάνω από 3 φορές ανά κύκλο καλλιέργειας υπό κάλυψη. Χρησιμοποιείτε το σκεύασμα σε πρόγραμμα εναλλαγής με άλλα εντομοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης για την αποφυγή

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

----

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Μη φυτεύετε μια φυλλώδη καλλιέργεια μικρού κύκλου (περίπου 30 ημέρες μεταξύ σποράς/φύτευσης και συγκομιδής) στον αγρό όπου έχει γίνει εφαρμογή με EXALT 25 SC, τουλάχιστον για 120 ημέρες μετά την εφαρμογή

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

48 ώρες μετά την εφαρμογή

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Το EXALT® 25 SC δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεις που αναγράφονται στην ετικέτα. Συνιστάται δοκιμαστική εφαρμογή του σκευάσματος σε μικρό αριθμό καλλωπιστικών φυτών

10. Συνδυαστικότητα:

---

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS08



GHS09

## 12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

**H361f** Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα.

**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, προκαλεί μακροπρόθεσμες δυσμενείς επιπτώσεις.

**EUH208** Περιέχει σπινετονοράμη και 1,2-βενζισοθειαζολιν-3 (2H) -όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**EUH401** Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης για να αποφύγετε τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.

## 13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

**P405+P102** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

**P270** Μην τρώτε, πίνετε, καπνίζετε όταν χρησιμοποιείται το προϊόν αυτό

**P280** Να φοράτε γάντια, προστατευτικό ιματισμό και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

**P501** Διάθεση του περιεχομένου και της συσκευασίας ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη /φόρτωση και κατά την εφαρμογή

Σε περίπτωση επαναισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια

**SP1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Αποφύγετε τη μόλυνση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης από αγροκτήματα ή δρόμους.]

**SPe2** Για την προστασία των μη υδρόβιων οργανισμών, μην εφαρμόζετε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν με τη δραστική ουσία spinetoram περισσότερο από μία φορά το χρόνο για τις καλλιέργειες υπαίθρου.

**SPe3** Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών,

1. να αφήσετε μια απέκαστη φυτική ζώνη ανάσχεσης **20 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες υπαίθρου:

- τομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά, πιπεριά chilli
- κολοκυνθοειδή με βρώσιμο και μη βρώσιμο φλοιό
- φυλλώδη λαχανικά
- σταυρανθή
- φράουλα
- καλλωπιστικά φυτά, δένδρα και θάμνοι, βολβώδη και λουλούδια (< 50 cm).

2. Να αφήσετε για τις καλλιέργειες των καλλωπιστικών φυτών, δένδρων και θάμνων (> 50 cm)

- μια απέκαστη ζώνη προστασίας 50 μέτρων (συμπεριλαμβανομένης μίας φυτικής ζώνης ανάσχεσης **20 μέτρων**) από τα επιφανειακά ύδατα
- 50 μέτρων φυτική ζώνη ανάσχεσης με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90%

**SPe8** **Επικίνδυνο για τις μέλισσες.** Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην εφαρμόζετε το σκεύασμα κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Μην το χρησιμοποιείτε όταν υπάρχουν ανθισμένα ζιζάνια.

Στην περίπτωση καλλιεργειών θερμοκηπίου: υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής απομακρύνοντας ή καλύπτοντας τις κυψέλες των βομβίνων κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και επαναφέροντας τις μόνο μετά από ένα διάστημα 24-48 ωρών.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν νερόλακκοι που ενδέχεται να περιέχουν υπολείμματα εντομοκτόνου στον χώρο πριν επανεισάγετε τα έντομα επικονίασης.

Μπορεί να βλάψει τα έντομα επικονίασης. Αποφύγετε την περιττή έκθεση, για χρήσεις υπό κάλυψη.

Μπορεί να βλάψει τη μη στοχευόμενη πανίδα για χρήσεις υπό κάλυψη.



#### 14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

**Γενικές πληροφορίες:** Μη δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό, εάν ο παθών έχει σπασμούς ή είναι αναισθητός.

**P308+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:** συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα και αφήστε το να ξεκουραστεί σε άνετη στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Συμβουλευτείτε γιατρό.

**Αντίδοτο:** Συμπτωματική θεραπεία

**Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401**

#### **Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:**

Να φυλάσσεται σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, χωρίς την επίδραση του άμεσου ηλιακού φωτός και ακραίων θερμοκρασιών. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

#### **ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

## **Z. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:**

### **ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**

Η άδεια παράλληλου εμπορίου χορηγείται στο προϊόν Exalt 25 SC που είναι αδειοδοτημένο στην Ιταλία με εμπορικό όνομα Exalt 25 SC και αριθμό έγκρισης 16816 και με κάτοχο άδειας την εταιρεία DOW.

Το προϊόν αναφοράς στην Κύπρο, βάσει του οποίου χορηγείται η σχετική άδεια, είναι το Exalt 25 SC με αριθμό άδειας 3754.

Η εταιρεία A. D Georoniki Ltd, οφείλει να τηρεί αρχείο (Αρχείο Εισαγωγής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Παράλληλου Εμπορίου) με τις ποσότητες του σκευάσματος Exalt 25 SC που εισάγονται στην Κύπρο (θα περιλαμβάνει όλα τα παραστατικά στοιχεία των εισαγωγών ανά παρτίδα σκευάσματος).

Το αρχείο θα είναι άμεσα διαθέσιμο για έλεγχο από την αρμόδια Αρχή.

Για κάθε φορτίο του σκευάσματος Exalt 25 SC που εισάγεται στην Κύπρο θα πρέπει να χορηγείται η σχετική «Άδεια για Εισαγωγή Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος Παράλληλου Εμπορίου». Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η εισαγωγή του σκευάσματος στη χώρα.

Η ετικέτα του σκευάσματος θα φέρει ευανάγνωστα τη φράση «**ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**» με τα πλέον έντονα και μεγάλα γράμματα.

Η άδεια παράλληλου εμπορίου θα ανακληθεί:

- σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας του προϊόντος αυτού στην Ιταλία για λόγους ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας.
- σε περίπτωση κακού χειρισμού της άδειας παράλληλου εμπορίου από την εταιρεία A. D Georoniki Ltd, με στόχο την εισαγωγή ή τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων άλλων από αυτά για τα οποία χορηγήθηκε η παρούσα άδεια.

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περὶ Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου του 2011.

Ημερομηνία: .....06/10/2020.....

Σφραγίδα

.....  
(Ανδρούλα Γεωργίου)  
Διευθύντρια  
Τμήματος Γεωργίας