



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011  
(Ν 141(I)/2011)

**ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 3780-P, ημερομηνίας 06/04/2016 για χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου σε φυτοπροστατευτικό προϊόν και

την αίτηση με αρ. 190 (Έντυπο 09) ημερομηνίας 24/01/2017 για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος, σε σχέση με το διανομέα και την αίτηση με αρ. 4140-P (Έντυπο 07) για ανανέωση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος παράλληλου εμπορίου

**τροποποιείται η άδεια παράλληλου εμπορίου του φυτοπροστατευτικού προϊόντος MASTERTEAM 250SC με τα ακόλουθα στοιχεία:**

**A) Γενικά στοιχεία άδειας**

1. Αριθμός Άδειας:

3224-P

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

31/12/2021

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/12/2025

2. Κάτοχος της άδειας:

Alithino Ltd

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Alithino Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Γ.Τ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΗ ΛΤΔ

## Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

Masterteam 250SC

2. Μορφή:

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Azoxystrobin : 25% β/ο  
βοηθητικές ουσίες: 76,2% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

SINON EU GmbH

5. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες / Δοχεία	100κ.εκ., 200κ.εκ., 250κ.εκ., 500κ.εκ., 1Λ, 5Λ, 20Λ και 25Λ	Πλαστικό HDPE

## Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

Azoxystrobin

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

97,9% β/β min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

SINON CORPORATION

4. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.:

SINON CORPORATION

## Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

### 1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Μυκητοκτόνο της Ομάδας των Στρομπιλουρινών με προστατευτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση.  
Μέρος του σκευάσματος παραμένει στην φυλλική επιφάνεια και το υπόλοιπο απορροφάται και διανέμεται ομοιόμορφα μέσα στο φυτό (με κίνηση διασυστηματική και διελασματική) και είναι αποτελεσματικό σε χαμηλές δόσεις

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες  
ερασιτέχνες χρήστες

### 3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος

### 4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

Το ψεκαστικό διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες από την παρασκευή του αφού προηγηθεί ισχυρή ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα του ψεκασμού με νερό. Πλύνετε το ψεκαστικό δοχείο με κατάλληλο καθαριστικό.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα. / δεκ.)	κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη		
Αμπέλι	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Uncinula necator</i> ) <b>Περονόσπορος</b> ( <i>Plasmopora viticola</i> )	50 – 500	20 – 100	100	Ψεκασμοί φυλλώματος προστατευτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	2 με μεσοδιάστημα 10 – 12 ημέρες
Τομάτα	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Leveillula taurica</i> ) <b>Περονόσπορος</b> ( <i>Phytophthora infestans</i> ) <b>Αλτερνάρια</b> ( <i>Alternaria spp.</i> )	87,5 – 400	20 – 80	70 – 80	Ψεκασμοί φυλλώματος προστατευτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	2 με μεσοδιάστημα 7 – 10 ημέρες
Σιτάρι	<b>Κίτρινη σκωρίαση</b> ( <i>Puccinia striiformis</i> ) <b>Καφέ σκωρίαση</b> ( <i>Puccinia recondite</i> ) <b>Σεπτορίωση</b> ( <i>Leptopshaeria nodorum</i> ) <b>Cladosporium spp.,</b> <b>Alternaria spp.,</b>	---	20 – 30	100	Ψεκασμοί φυλλώματος προστατευτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	2 με μεσοδιάστημα 14 ημέρες
Κριθάρι	<b>Ελμινθοσπόριο</b> ( <i>Pyrenophora teres</i> ) <b>Ρυγχοσπόριο</b> ( <i>Rhyncosporium secalis</i> ) <b>Καφέ Σκωρίαση κριθαριού</b> ( <i>Puccinia hordei</i> ) <b>Ωίδιο</b> ( <i>Erysiphe graminis hordei</i> )				Η πρώτη εφαρμογή να πραγματοποιείται στο στάδιο BBCH 39 και η δεύτερη εφόσον απαιτείται, όχι μετά το στάδιο BBCH 69.	

**Παρατηρήσεις:**

1. Να μην χρησιμοποιείται σε σπορεία και φυτώρια.
2. Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την ένταση της προσβολής. Χρησιμοποιήστε την υψηλότερη δόση ή το συντομότερο διάστημα εφαρμογής εφόσον υπάρχουν συνθήκες ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ανάπτυξη παθογένειας

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Αμπέλι	21 ημέρες
Τομάτα	3 ημέρες
Κριθάρι, Σιτάρι	35 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: azoxystrobin: 11**

- Μην πραγματοποιείτε περισσότερες από 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο, εναλλάσσοντας κάθε εφαρμογή του Masterteam 250SC με τουλάχιστον μία εφαρμογή με προϊόντα διαφορετικής δραστικής ουσίας και μηχανισμού δράσης.
- Μην αυξάνετε τις δόσεις

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

----

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

----

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

----

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

- Να μην χρησιμοποιείται σε σπορεία και φυτώρια τομάτας.
- Ψεκαστικά μέσα που είχαν χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές με το Masterteam 250SC να ξεπλένονται με ιδιαίτερη προσοχή πριν χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς λόγω της φυτοτοξικότητας που παρουσιάζει στις μηλιές. Ακόμα και ίχνη μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε το Masterteam 250SC όταν υπάρχει πιθανότητα το ψεκαστικό νέφος να φθάσει σε γειτονική καλλιέργεια μηλιάς

10. Συνδυαστικότητα:

Για την καλλιέργεια της τομάτας μπορεί να συνδυαστεί με εντομοκτόνα που περιέχουν lambda-cyhalothrin, methomyl, dimethoate και με ακαρεοκτόνα που περιέχουν propargite

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

<b>H410</b>	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
<b>EUH208</b>	Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

<b>P405+P102</b>	Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
<b>P270</b>	Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
<b>Sp1</b>	Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
<b>SPe3</b>	Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian αφέκαστη ζώνη προστασίας <b>5 μέτρων</b> από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια του αμπελιού και μία φυτική ζώνη ανάσχεσης <b>10 μέτρων</b> από την καλλιέργεια της τομάτας.
<b>SPe3</b>	Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εδάφη με ποσοστό άμμου πάνω από 80% καθώς και σε αλκαλικά εδάφη.
<b>EUH401</b>	<i>Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</i>

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση δηλητηρίασης καλέστε γιατρό.  
**Γενική Οδηγία:** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αδιαθεσίας ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.  
**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και χαλαρώστε τα υπόλοιπα ρούχα. Τοποθετήστε το παθόντα σε αναπνευστική θέση και κρατήστε τον ζεστό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν εμφανιστούν συμπτώματα.  
**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Έχετε τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.  
**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική βοήθεια αν εμφανισθούν συμπτώματα.  
**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα με νερό και πιείτε αρκετό νερό. Αν προκληθεί εμετός πιείτε και πάλι νερό. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.  
**Οδηγίες για τον γιατρό:** Η θεραπεία πρέπει να κατευθυνθεί στον έλεγχο των συμπτωμάτων και της κλινικής κατάστασης. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα αναπνευστικά συμπτώματα.  
**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  
**Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων:** 1401

## Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, μακριά από θερμοκρασίες παγετού και θερμοκρασίες που να μην ξεπερνούν τους 25°C.

## ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξέπλυματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

## Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

### **ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**

Η άδεια παράλληλου εμπορίου χορηγείται στο προϊόν Masterteam 250SC που είναι εγκεκριμένο στην Ελλάδα με εμπορικό όνομα Sinstar 250SC και αριθμό έγκρισης 60485 και με κάτοχο άδειας την εταιρεία Sinon Corporation.

Το προϊόν αναφοράς στην Κύπρο βάση του οποίου χορηγείται η σχετική άδεια είναι το Sinstar 250SC με αριθμό άδειας 3199.

Οι εταιρείες Alithino Ltd και Γ.Τ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΗ ΛΤΔ, οφείλουν να τηρούν αρχείο (Αρχείο Εισαγωγής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Παράλληλου Εμπορίου) με τις ποσότητες του σκευάσματος Masterteam 250SC που εισάγονται στην Κύπρο (θα περιλαμβάνει όλα τα παραστατικά στοιχεία των εισαγωγών ανά παρτίδα σκευάσματος).

Το αρχείο θα είναι άμεσα διαθέσιμο για έλεγχο από την αρμόδια Αρχή.

Για κάθε φορτίο του σκευάσματος Masterteam 250SC που εισάγεται στην Κύπρο θα πρέπει να χορηγείται η σχετική «Άδεια για Εισαγωγή Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος Παράλληλου Εμπορίου». Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η εισαγωγή του σκευάσματος στη χώρα.

Η ετικέτα του σκευάσματος θα φέρει ευανάγνωστα τη φράση «**ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**» με τα πλέον έντονα και μεγάλα γράμματα.

Η άδεια παράλληλου εμπορίου θα ανακληθεί:

- σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας του προϊόντος αυτού στην Ελλάδα για λόγους ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας.

- σε περίπτωση κακού χειρισμού της άδειας παράλληλου εμπορίου από τις εταιρείες Alithino Ltd και Γ. Τ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΗ ΛΤΔ, με στόχο την εισαγωγή ή τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων άλλων από αυτά για τα οποία χορηγήθηκε η παρούσα άδεια.

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011

Ημερομηνία: .....02/02/2022.....

.....  
(Ανδρούλα Γεωργίου)  
Διευθύντρια  
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα