



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021  
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4049 (Έντυπο 01) για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος και  
την επιστολή του αιτητή με ημ. 07/2017 για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ιταλία,  
την αίτηση με αρ. 3530 (Έντυπο 8), για παράταση της άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος και την αίτηση με αρ. 399 (έντυπο 09) ημερομηνίας 08/11/20019 για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σχέση με τη ταξινόμηση και σήμανση του  
και τις αιτήσεις με αρ. 3934 και 4468 (Έντυπο 8), για παράταση της άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **CORASIL®** με τα ακόλουθα στοιχεία:

**A) Γενικά στοιχεία άδειας**

1. Αριθμός Άδειας:

3482

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

30/04/2023

Ημερομηνία λήξης άδειας:

15/03/2026

2. Κάτοχος της άδειας:

Nufarm GmbH & Co KG

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

L. Lambrou Agro Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

L. Lambrou Agro Ltd

## Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

Corasil ®

2. Μορφή:

Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Dichlorprop-P: 2,5% β/ο  
Dichlorprop-P σε μορφή 2-αίθυλο έξυλο στέρα: 4,07% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 97,24% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Nufarm SAS, Γαλλία

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Nufarm SAS, Γαλλία

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. Nufarm SAS, Γαλλία  
2. Torre S.r.l, Ιταλία  
3. Athaller Italia Srl, Ιταλία  
4. K&N Ευθυμιάδης ABEE, Ελλάδα

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες / Δοχεία	100κ.εκ., 250κ.εκ., 300κ.εκ., 500κ.ε., 600κ.εκ. , 1Λ, 1.5Λ, 2Λ, 3Λ, 5Λ και 10Λ	HDPE, f-HDPE, COEX

## Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

Dichlorprop-P (σε μορφή 2-αίθυλο έξυλο εστέρα)

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

900gr / Kg

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Nufarm Uk Limited

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Nufarm Uk Limited

## Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Το Corasil® είναι φυτορυθμιστική ουσία που ανάλογα με το χρόνο εφαρμογής μπορεί να προκαλέσει αύξηση στο μέγεθος των καρπών ή μείωση της πτώσης των καρπών κοντά στη συγκομιδή σε καλλιέργειες εσπεριδοειδών.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος.

Να γίνεται καλή διαβροχή, χρησιμοποιώντας 150 – 240 λίτρα ψεκαστικού υγρού / δεκάριο, ανάλογα με το μέγεθος των δένδρων

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο μέχρι τη μέση με νερό, θέστε σε λειτουργία την ανάδευση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του Corasil® και συμπληρώστε με την υπόλοιπη ποσότητα νερού.

### **Καθαρισμός ψεκαστήρα:**

Αμέσως μετά τον ψεκασμό αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

## 5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Ζιζάνιο που ελέγχεται	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη		
Πορτοκαλιά	Αύξηση αντοχής στη πτώση	60	150 – 240	200	Ψεκασμός στην αρχή ωρίμανσης των καρπών, πριν την αλλαγή του χρώματος	1
Πορτοκαλιά Μανταρινία Σατσούμα	Αύξηση μεγέθους καρπών <sup>(1)</sup>	125		300	Όταν οι καρποί αποκτήσουν διάμετρο 20-21 χιλιοστά. Για πιο καθυστερημένες εφαρμογές, χρησιμοποιήσετε δοσολογία 150 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. (2)	
Μανταρινιά Κλιμεντίνες		100 – 125			Όταν οι καρποί αποκτήσουν διάμετρο 13-15 χιλιοστά. Για πιο καθυστερημένες εφαρμογές και σε καρπούς μικρού μεγέθους, χρησιμοποιήσετε δοσολογία 150 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. (2)	
Λεμονιά		200	100 – 150	Όταν οι καρποί αποκτήσουν διάμετρο 22-25 χιλιοστά		

**Παρατηρήσεις:**

1. Για καλύτερα αποτελέσματα και για την καλύτερη δυνατή επίδραση στο μέγεθος του καρπού κατά τη συγκομιδή, είναι σημαντικό η εφαρμογή να πραγματοποιείται αμέσως μετά τη φυσική πτώση των καρπών.
2. Η εφαρμογή να γίνεται με τον κατάλληλο όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε η μέγιστη δόση να μην υπερβαίνει τα 300 κ.εκ σκευάσματος στο δεκάριο.
3. Να πραγματοποιείται **μια μόνο εφαρμογή** καθ' όλη τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου (η επέμβαση συνήθως αποβλέπει στην αύξηση του μεγέθους των καρπών ή στη μείωση της πτώσης τους) διαφορετικά μπορεί να παρουσιαστεί αρνητικό αποτέλεσμα στην ποιότητα και στην ποσότητα του καρπού κατά τη συγκομιδή.

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Πορτοκαλιά	45 ημέρες
Λεμονιά, Μανταρινιά (Κλιμεντίνες Σατσούμα)	Να μην εφαρμόζεται αργότερα από τον εγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- Ψεκάζετε όταν επικρατούν φυσιολογικές καιρικές συνθήκες χωρίς άνεμο και με θερμοκρασία κάτω από 30°C.
- Αποφύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε παρακείμενες καλλιέργειες (όπως π.χ. πυρηνόκαρπα, αμπέλι και λαχανικά) που μπορεί να παρουσιάζουν ευαισθησία ακόμα και σε ατμούς του προϊόντος.
- Για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, τα δένδρα πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να μην υποφέρουν από έλλειψη νερού, μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

---

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

---

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

24 ώρες

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα:

Το Corasil ® εφαρμόζεται μόνο του. Μη χρησιμοποιείτε το Corasil ® σε συνδυασμό με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, διαφυλλικά λιπάσματα, αμινοξέα, χουμικά οξέα και εν γένει βελτιωτικά

11. Εικονογράμματα κινδύνου:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GHS05



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

**H315** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

**H318** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

**H411** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

**EUH 401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

### 13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

**P102** Μακριά από παιδιά.  
**P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο,  
**P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον  
**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.  
**P391** Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε  
**Sp1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  
**SPe8** **Επικίνδυνο για τις μέλισσες.** Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων.  
Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.  
**Συνιστάται το κλείσιμο των κυψελών πριν την εφαρμογή, και το άνοιγμά τους 2 – 3 ώρες μετά την εφαρμογή.**

### 14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.  
**P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.  
**P332+P313:** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.  
**P362:** Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.  
**P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
**P310:** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.  
**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό και δείξτε του τη συσκευασία ή την ετικέτα.  
Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία  
**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:1401**

### Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος καλά αεριζόμενο

### ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή με τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

### Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 23/05/2023..



(Ανδρούλα Γεωργίου)  
Διευθύντρια  
Τμήματος Γεωργίας