



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 3474, ημερομηνίας 25/05/2012 για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ιταλία, την αίτηση με αρ. 77 (Έντυπο 9), ημερομηνίας 12/01/2015 για παράταση της άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε σχέση με τα εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος, την αίτηση με αρ. 2986 (Έντυπο 8), ημερομηνίας 25/04/2017 για παράταση της άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος, την αίτηση με αρ. 3246 (Έντυπο 8), ημερομηνίας 17/04/2018 για παράταση της άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος, την αίτηση με αρ. 359 (Έντυπο 9), ημερομηνίας 08/07/2019 για τροποποίηση της άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε σχέση με τον κάτοχο της άδειας και την αίτηση με αρ. 4179 (Έντυπο 8), για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος

τροποποιείται ως ακολούθως η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **ALIAL 80WG** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

2938

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

13/04/2022

Ημερομηνία λήξης άδειας:

30/04/2024

2. Κάτοχος της άδειας:

FMC Χημικά Ελλάς ΜΕΠΕ

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Costas Christodoulou Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Costas Christodoulou Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

Alial 80WG

2. Μορφή:

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

fosetyl AI: 80% β/β
βοηθητικές ουσίες: 16,7% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

CHEMINOVA AGRO Spain

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

1) A.D.I.C.A. Srl, Italy
2) SCHRIM GmbH, Germany
3) LIMIN CHEMICAL COMPANY, Ltd , China
4) JIANGSU MARCH CHEMICALS Co., Ltd , China
5) PROBELTE, S.A., Spain
6) ENVASADOS VALENCIANOS, S.L., Spain
7) LABORATORIOS SIRGA, S.A., Spain

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1) A.D.I.C.A. Srl, Italy
2) SCHRIM GmbH, Germany
3) LIMIN CHEMICAL COMPANY, Ltd , China
4) JIANGSU MARCH CHEMICALS Co., Ltd , China
5) PROBELTE, S.A., Spain
6) ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Μάνδρα Αττικής
7) ENVASADOS VALENCIANOS, S.L., Spain
8) LABORATORIOS SIRGA, S.A., Spain

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κουτί με εσωτερική σακούλα	50γρ., 100γρ., 200γρ., 500γρ., 1Kg, 2,5Kg	Σακούλα Polyethylene AI

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Ασθένεια που ελέγχεται	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	γρ./δεκ. μέγιστη		
Εσπεριδοειδή	Φυτόφθορα (<i>Phytophthora spp</i>)	250 – 300	100 – 150	250 – 450	Πρώτος ψεκασμός την άνοιξη, στην αρχή της άνθησης, δεύτερος ψεκασμός το Ιούλιο και τρίτος Οκτώβρη – Νοέμβρη	3
Μηλιά Αχλαδιά	Φυτόφθορα λαιμού και ριζών (<i>Phytophthora spp</i>)		80 – 120	200 – 360	3 ψεκασμοί. Ο 1 ^{ος} τον Απρίλιο, ο 2 ^{ος} τον Ιούλιο και ο 3 ^{ος} το Σεπτέμβρη – Οκτώβρη	
Αμπέλι (οινοποιήσιμο)	Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>)		30 – 110	75 – 330	Ψεκασμός λίγο πριν την άνθηση και επανάληψη κάθε 10-14 ημέρες, εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας**	4

Παρατηρήσεις:

- Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων

-* Σε φυτά με μεγάλη προσβολή όπου το φύλλωμα δεν μπορεί να απορροφάει το ψεκαστικό υγρό συνίσταται η εφαρμογή του προϊόντος με πινέλο πάνω στα προσβεβλημένα μέρη του κορμού και των κλαδιών.

-** Συνίσταται ο συνδυασμός του με μυκητοκτόνα επαφής για να επιτυγχάνεται καλύτερη προστασία των φυτών και ειδικά στους ψεκασμούς μετά την άνθηση ή όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Εσπεριδοειδή	15 ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά, Αμπέλι (οινοποίηση)	28 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 33

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα:

Μπορεί να συνδυαστεί με σκευάσματα που περιέχουν mancozeb, σε μορφή βρέξιμης σκόνης. Δεν συνδυάζεται με χαλκούχα σκευάσματα και με αζωτούχα διαφυλλικά λιπάσματα. Σε περίπτωση που προηγηθεί εφαρμογή με παραφινικό λάδι, το προϊόν πρέπει να εφαρμοστεί, μετά από τουλάχιστον μία εβδομάδα.

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102	Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P270	Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P401	Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
P103	Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση
SP1	Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
EUH401	<i>Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης</i>

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία .
Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

E. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Z. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία: ...13/04/2022...

.....
(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα