



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4495 (Έντυπο 01), για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

την επιστολή του αιτητή για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ελλάδα

χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **GOLBEX 80 WG** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3934

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

17/03/2022

Ημερομηνία λήξης άδειας:

30/04/2024

2. Κάτοχος της άδειας:

Exclusivas Sarabia, S.A

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Costas Christodoulou Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Costas Christodoulou Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

Golbex 80 WG

2. Μορφή:

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

fosetyl-Al: 80 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: 17,53 % (β/β)

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Exclusivas Sarabia, S.A

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Exclusivas Sarabia, S.A

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

Exclusivas Sarabia, S.A

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Κουτί με εσωτερική σακούλα	250 γρ.έως 5 κιλά	Σακούλα σύνθετου υλικού (polyethylene/ simple metallic polyethylene terephthalate/ polypropylene (PE/PETmet/PP), κουτί χάρτινο
2.	Σακίδιο	250 γρ.έως 5 κιλά	Σύνθετου υλικού PE/PETmet/PP

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

fosetyl-Al

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

min 970 g/kg

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Exclusivas Sarabia, S.A

4. Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Zhejiang Jiahua Chemical Co. Ltd.

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Παρουσιάζει συμπλαστική και αποπλαστική κίνηση. Δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων του μύκητα και ταυτόχρονα ενισχύει τους μηχανισμούς άμυνας των φυτών.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμοί φυλλώματος

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο μετά τον ψεκασμό. Ξεπλύνετε τη δεξαμενή και τα εξαρτήματά της τρεις φορές με καθαρό νερό μέχρι ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος να έχουν απομακρυνθεί

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	γρ. σκ./δεκ. μέγιστη		
Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιές Λεμονιές, Μανταρινιές Γκρέιπ –φρουτ Φράπα Κίτρο Περγαμόντο Νεραντζιά	Φυτόφθορα (<i>Phytophthora spp.</i>)	300	110 – 200	330 – 660	1ος ψεκάσμος την άνοιξη, στην αρχή της Άνθησης (Απρίλιο-Μάιο) 2ος ψεκάσμος τον Ιούλιο – Αύγουστο 3ος ψεκάσμος Οκτώβριο - Δεκέμβριο (BBCH 37-81)	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 30 ημέρες
Μηλοειδή Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Αχλαδόμηλα	Φυτόφθορα λαιμού και ριζών <i>Phytophthora cactorum</i>	300	80 – 100	300	1ος ψεκάσμος την άνοιξη, Απρίλιο - Μάιο 2ος ψεκάσμος τον Ιούνιο – Ιούλιο 3ος ψεκάσμος Οκτώβριο κατά το λήθαργο (BBCH 91-77)	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 30 ημέρες
	Βακτηρίωση <i>Pseudomonas syringae</i>				Ψεκάσμοι από την πτώση των πετάλων έως το στάδιο των μικρών καρπών (BBCH 69-71)	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 30 ημέρες
Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια)	Περονόσπορος <i>Plasmopara viticola</i>	250	60 – 100	250	Ψεκάσμοι που ξεκινούν από την αρχή της βλάστησης (BBCH 12-13)	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 30 ημέρες
Φράουλα (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	Φυτόφθορα λαιμού και ριζών <i>Phytophthora cactorum</i>	250	100	250	Προληπτικοί ψεκάσμοι έως την άνθηση (BBCH 12-59)	1 – 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 8 – 10 ημέρες
			10		Εμβάπτιση ριζώματος πριν τη φύτευση	1
Τομάτα (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	Περονόσπορος <i>Phytophthora infestans</i>	---	30 – 100	250	Ψεκάσμοι που ξεκινούν από το στάδιο των σποροφύτων (BBCH 10)	4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες

Αγγούρι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	Περονόσπορος <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	---	30 – 100	250	Ψεκασμοί που ξεκινούν από το στάδιο των σποροφύτων (BBCH 10)	4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες
Κολοκύθι Κολοκυθάκι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	Περονόσπορος <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	200 – 300	80 – 100	160 – 300	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-89)	1 – 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 8 – 10 ημέρες
Πεπόνι Καρπούζι Κολοκύθα (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	Περονόσπορος <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	200 – 300	80 – 100	160 – 300	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-89)	1 – 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 8 – 10 ημέρες
Μαρούλι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	Περονόσπορος <i>Bremia lactucae</i>	---	30 – 100	250	Ψεκασμοί που ξεκινούν από το στάδιο των σποροφύτων (BBCH 10)	4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες
Καλλωπιστικά * (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	Φυτόφθορα <i>Phytophthora sp.</i>	250	250 – 300	100 – 120	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος	1 – 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 30 ημέρες
		5-10 γρ./τετ. μέτρο	---	100	Ριζοτόπισμα	1 – 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 30 ημέρες

Παρατηρήσεις:

Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

*Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Τομάτα, Αγγούρι, Κολοκύθι/Κολοκυθάκι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα	3 ημέρες
Εσπεριδοειδή, Φράουλα (ψεκασμός φυλλώματος)	14 ημέρες
Φράουλα (εμβάπτιση ριζώματος)	----
Μηλοειδή, Μαρούλι	15 ημέρες
Αμπέλι (οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο)	28 ημέρες
Καλλωπιστικά	Μ. Ε

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 33

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

30 ημέρες

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

10. Συνδυαστικότητα:

Δεν συνιστάται η ανάμειξη του σκευάσματος με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμοστεί αφού περάσει διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας από εφαρμογή με παραφινικό λάδι. Το προϊόν δεν συνδυάζεται με διαφυλλικά λιπάσματα αζώτου

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GHS05

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

- H318** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
EUH208 Περιέχει 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

- P405+P102** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P270 Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την εφαρμογή.
Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι και γάντια.
Sp1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

- P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε το σκεύασμα. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων Κύπρου: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, κουτιά) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία: ...17/03/2022..

Σφραγίδα

.....
(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας