



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4037 (Έντυπο 01), ημερομηνίας 13/12/2017 για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος και
την επιστολή του αιτητή για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ισπανία
την αίτηση με αρ. 340 (Έντυπο 09), ημερομηνίας 18/02/2019 για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος, σε σχέση με τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος και τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας και
τις αιτήσεις με αρ. 4037 και 4446 (Έντυπο 08) για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **FORUM 15 DC** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3501

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

23/05/2023

Ημερομηνία λήξης άδειας:

15/02/2026

2. Κάτοχος της άδειας:

BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη ΑΒΕΕ

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Agrolan Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Agrolan Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Forum 15DC

2. Μορφή: Εναιωρηματοποίηση Συμπύκνωμα (DC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: dimethomorph: 15 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 85,82% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: BASF SE

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: 1. BASF Agri-Production S.A.S.
2. BASF Espanola S.L.

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: 1. BASF Agri-Production S.A.S.
2. BASF Espanola S.L.
3. BASF Ελλάς ABEE

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Δοχεία	600 κ.εκ., 700 κ.εκ., 1 λίτρο, 3 λίτρα, 3.5 λίτρα, 5 λίτρα, 10 λίτρα, 25 λίτρα	HDPE

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: dimethomorph

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 95 % (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: BASF Agro B.V., Ελβετία
Arysta Life Sciences Benelux Sprl, Βέλγιο
ADAMA Makhteshim Ltd, Ισραήλ

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Servatis, Βραζιλία
Jiangsu Huifeng Agrochemicalsco Ltd, Κίνα
ADAMA Makhteshim Ltd, Ισραήλ
Beijing Nutrichem Laboratory Co.Ltd, Κίνα
Shandong Cynda Chemical Co., Ltd, Κίνα

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση ωομυκήτων στις καλλιέργειες αμπελιού, πορτοκαλιάς και φράουλας.

Dimethomorph: Το dimethomorph (DMM) είναι ένα μυκητοκτόνο με ιδιότητες προστατευτικές, θεραπευτικές και αντισπορογόνες κατά των μυκήτων που ανήκουν στην τάξη των Ωομυκήτων. Ο στόχος του είναι ένα ένζυμο, η συνθάση κυτταρίνης, η οποία εμπλέκεται στην βιοσύνθεση της κυτταρίνης (κύριο συστατικό του τοιχώματος των Ωομυκήτων). Δρα στο σύνολο του κύκλου ανάπτυξης του παθογόνου οργανισμού-στόχου και παρότι είναι θεραπευτικό, συστήνεται να χρησιμοποιείται προληπτικά.

Το dimethomorph είναι μια ένωση που παρουσιάζει μια ακροπέταλη διασυστηματικότητα καθώς και μια διαφυλλική κινητικότητα.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός καλύψεως για το αμπέλι και την πορτοκαλιά.

Εφαρμογές μέσω του συστήματος άρδευσης για την καλλιέργεια της φράουλας.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστικό βυτίο με νερό μέχρι τα $\frac{3}{4}$ και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε το βυτίο με το υπόλοιπο νερό.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη		
Αμπέλι	Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>)	150 – 200	100	150 – 200	Κάνετε προληπτικές εφαρμογές καλύψεως του αμπελιού	1 εφαρμογή
Πορτοκαλιά	Φυτόφθορα (<i>Phytophthora citrophthora</i>)	83,33	300	250	Κάνετε προληπτικές εφαρμογές καλύψεως των δέντρων	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογών 14 ημέρες
Φράουλα (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	Φυτόφθορα (<i>Phytophthora spp.</i>)	---	500	100 – 500	Κάνετε προληπτικές εφαρμογές μέσω του συστήματος άρδευσης	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογών 14 ημέρες

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Αμπέλι	28 ημέρες
Πορτοκαλιά	14 ημέρες
Φράουλα	1 ημέρα

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 40

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, συστήνεται η εναλλαγή του, σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης, με σκευάσματα που εμπεριέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης από αυτόν του dimethomorph.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Δεν θα πρέπει να εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων. Επιτρέπεται η επανείσοδος στην ψεκασμένη περιοχή (για εργασίες που απαιτούν την παραμονή στην καλλιέργεια για διάστημα μεγαλύτερο των 2 ωρών) μετά από: 8 ημέρες στο αμπέλι και 10 ημέρες στην πορτοκαλιά.

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα.

10. Συνδυαστικότητα:

Το προϊόν εφαρμόζεται μόνο του

11. Εικονογράμματα κινδύνου:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GHS09



GHS05

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

- H302** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

- P102+405** Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
«Φορέστε γάντια και ρούχα προστασίας κατά τη διάρκεια όλων των χειρισμών ανάμιξης/φόρτωσης και εφαρμογής.»
Sp02 Πλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση.
SP1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Αποφύγετε τη ρύπανση των υδάτων μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).
Spe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήστε μια απέκαστη ζώνη ασφαλείας με φυτική βλάστηση από τα επιφανειακά ύδατα, **10 μέτρων** για την καλλιέργεια της πορτοκαλιάς και της φράουλας και **20 μέτρων** για την καλλιέργεια του αμπελιού.
Περιέχει βενζυλική αλκοόλη
EUH401 «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

- ΓΕΝΙΚΑ:**
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, το στόμα και το δέρμα. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, ζητήστε ιατρική βοήθεια και δείξτε τον περιέκτη ή την ετικέτα του.
P305 + P351 + P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.
Σε περίπτωση κατάποσης: Πιείτε άφθονο νερό.
P330: Ξεπλύνετε το στόμα.
Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρετε τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπουνί. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια, αν αποθηκευτεί στην αρχική του αλληλεπίδραση συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή με τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 23/05/2023..



(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας