



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4518 (Έντυπο 01), για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

την επιστολή του αιτητή για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ιταλία

χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **CHANON** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3995

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

03/04/2023

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/07/2024

2. Κάτοχος της άδειας:

Globachem NV

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

A. N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

A. N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Chanon

2. Μορφή: Πυκνό εναιώρημα (SC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: Aclonifen: 49,73 γρ. (600g/L)
Βοηθητικές ουσίες μέχρι 100 g

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: Globachem N.V.

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Globachem N.V.

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: 1. Phyteurop
2. Schirm GmbH
3. Kwizda Agro GmbH
4. AgroSmart Ltd

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες / Δοχεία	1Λ, 2Λ, 3Λ, 5Λ, 10Λ, 15Λ και 20Λ	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Aclonifen

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 97% (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: Globachem N.V.

4. Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.: Anupam Rasayan India Ltd

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και ορισμένων αγρωστωδών ζιζανίων.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα ψεκαστικά μηχανήματα διεξοδικά. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		κ.εκ. σκ./δεκ.	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)		
Πατάτα	Ζιζάνια *	300	15 – 50	Προφυτρωτικά, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν το φύτευμα	1
Μπιζέλι ρεβίθια όσπρια		300	15 – 50	Πριφυτρωτικά	1
Ηλίανθος		Προφυτρωτικά		Προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά (2-4 πραγματικά φύλλα)	1
		300	15 – 50		
		Μεταφυτρωτικά			
Σόγια	150 – 180	15 – 50	Προφυτρωτικά	1	
	300	150 – 180 *			

*** Καταπολεμούμενα Ζιζάνια (**
Προφυτρωτικά
 κίρσιο το πολυετές (*Cirsium arvense*), αγριομενεξές (*Viola arvensis*), μερκουριάλις η μονοετής ή σκαρολάχανο (*Mercurialis annua*), Κορυδαλίσ η κοίλη (*Corydalis cava*), μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (*Galium aparine*), αγριοραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*), χηνοπόδιο το λευκό ή λουβουδιά (*Chenopodium album*), στελλάρια (*Stellaria spp.*), βλήτο (*Amaranthus spp.*), ανθεμίδα (*Anthemis arvensis*), χρυσολάχανο (*Atriplex spp.*), Πολύγωνο αναρριχώμενο (*Polygonum convolvulus*).
Μεταφυτρωτικά
 αγριοραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*), χηνοπόδιο το λευκό ή λουβουδιά (*Chenopodium album*), βλήτο (*Amaranthus spp.*), Πολύγωνο αναρριχώμενο (*Polygonum convolvulus*).
 Ελέγχει και ορισμένα μονοετή ζιζάνια όπως μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*).

Παρατηρήσεις:
 * Χρησιμοποιήστε τις μικρότερες δόσεις σε περίπτωση καλλιεργειών υπό στρες, υψηλών θερμοκρασιών ή όταν υπάρχουν ευαίσθητες ποικιλίες
 Οψιμες εφαρμογές, δυσμενείς καιρικές συνθήκες όπως επίμονες βροχοπτώσεις) μπορεί να βλάψει τη σοδειά. Η απορροή του νερού από έδαφος σε κλίση μπορεί να οδηγήσει σε τοπική συγκέντρωση του Aclonifen, που μπορεί να βλάψει ευαίσθητες γειτονικές καλλιέργειες

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Μη εφαρμόσιμο	

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: aclonifen: F3

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνίσταται:

- να γίνεται εναλλαγή μυκητοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης (διαφορετικής ομάδας κατά FRAC).

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορείτε να σπείρετε την επόμενη καλλιέργεια, χωρίς καμία περίοδο αναμονής και μετά από επιφανειακή κατεργασία του εδάφους, ηλίανθο, αραβόσιτο, πατάτες, φάβα και βαμβάκι.
Επίσης μπορούν να καλλιεργηθούν και κρεμμύδι, σιτάρι, κριθάρι και σόγια εάν γίνει κατεργασία του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 20 εκ

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P102 Μακριά από παιδιά

P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε τα αερολύματα

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /το πρόσωπο

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα

P501 Διάθεση του περιεχομένου /συσκευασίας σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει για τα επικίνδυνα απόβλητα

Sp1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή με τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης των γεωργικών επιχειρήσεων και των δρόμων.

SPe3 Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών διατηρείτε αφέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά υδάτινα σώματα.

SPe3 Για να προστατεύσετε τα φυτά που δεν αποτελούν στόχο διατηρείτε αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη φυσική βλάστηση.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P308 + P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης, συμβουλευθείτε γιατρό

P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε

Μη χορηγείτε τίποτε από του στόματος σε άτομα που δεν έχουν τις αισθήσεις τους. Σε περίπτωση αδιαθεσίας συμβουλευθείτε γιατρό (εάν είναι δυνατόν, δείξτε του την ετικέτα).

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι δυνατόν να αφαιρεθούν εύκολα. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Συμβουλευθείτε γιατρό εάν επιμένει πόνος, βλεφαρισμός ή ερυθρότητα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε όλα τα εκτεθειμένα μέρη του δέρματος με ουδέτερο σαπούνι και νερό. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με χλιαρό νερό. Πλυθείτε προσεκτικά με νερό και σαπούνι. Εάν επιμένει δερματικός ερεθισμός ή εξάνθημα συμβουλευθείτε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα φορέσετε ξανά.

Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Αφήστε τον να ξεκουραστεί.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΕΜΕΤΟ.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό έως 2 (δύο) χρόνια στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 03/04/2023...



(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας