



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη:

τις αιτήσεις με αρ. 3588-P και 4552-P (Έντυπο 07) για ανανέωση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος παράλληλου εμπορίου,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **CHALLENGE** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3256-P

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

31/07/2023

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/10/2027

2. Κάτοχος της άδειας:

A. D. Georoniki Ltd

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

A. D. Georoniki Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

A. D. Georoniki Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Challenge

2. Μορφή: Συμπυκνωμένο Αιώρημα (SC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: aclonifen: 60% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 48,88% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: Bayer S.A.S., Division Crop Science, Γαλλία

5. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

| A/A | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-----|---------------|---|--|
| 1. | Φιάλες/Δοχεία | 400 και 500 κ.εκ, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15 και 20 λίτρα | Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) |

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: aclonifen

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 97% (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: Bayer S.A.S., Division Crop Science, Γαλλία

4. Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:
1. BASF Agri Production, Γαλλία
2. Deccan Fine Chemicals (India) Pvt. Ltd., Ινδία
3. Bayer Vapi Private Limited, Ινδία

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και ορισμένων αγρωστωδών ζιζανίων σε μεγάλο αριθμό καλλιεργειών.

Το aclonifen έχει περιορισμένη μετακίνηση μέσα στα ζιζάνια, ενώ βιοχημικά δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών. Δρα κυρίως στους βλαστούς, οι οποίοι είναι πιο ευαίσθητοι στα νεαρά ζιζάνια που βλάστησαν πρόσφατα ή που βρίσκονται σε γρήγορη ανάπτυξη. Μετά την εφαρμογή του CHALLENGE τα ζιζάνια εμφανίζουν λεύκανση και χλώρωση του νεαρού βλαστού καθώς αυτός αναπτύσσεται

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Για εφαρμογή αμέσως μετά τη σπορά, συστήνεται να εφαρμόζεται σε καλά προετοιμασμένο χωράφι (ψιλοχωματισμένο), οπότε σχηματίζεται ένα φιλμ στην επιφάνεια. Όταν φυτρώσουν τα ζιζάνια απορροφάται από το υποκοτύλιο και τις κοτύλες ή το κολεόπτιλο στα αγρωστώδη και τα ζιζάνια νεκρώνονται λίγες μέρες αργότερα. Χρησιμοποιείστε 10-50 λίτρα νερό στο δεκάριο, με πίεση 2-3 atm (30-45 psi) και μπεκ σκούπας. Ψεκάστε ομοιόμορφα σε νηνεμία, με τη μπάρα κοντά στο έδαφος και με προσοχή να μην προκαλέσετε ζημιά σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες (ζαχαρότευτλα, οπωροφόρα δένδρα).

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τα 3/4 με νερό. Ανακινείστε το σκεύασμα πριν τη χρήση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση με μέτρια ταχύτητα.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Καθαρίστε και ξεπλύνετε πολύ καλά τον εξοπλισμό ψεκασμού αμέσως μετά τον ψεκασμό.

5. Φάσμα Δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο |
|--|---|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
| | | κ.εκ. σκ./δεκ. | Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.) | | |
| Ψυχανθή Λαχανικά Κουκιά Λούπινα Μπιζέλια (ξηρά) Μπιζέλια (φρέσκα χωρίς Λοβό) Ρεβίθια Φακές Φασόλια (ξηρά) | Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοσινάπι (<i>Sinapis arvensis</i>) Λουβουδιά (<i>Chenopodium album</i>) | 250 – 400 | 10 – 30 | Προφυτρωτικά | 1 |
| | Ευαίσθητα ζιζάνια: Ζωχοί (<i>Sonchus sp.</i>) Κοινή πόα (<i>Poa annua</i>) Τσουκνίδα μικρή (<i>Urtica urens</i>) | 250 | 15 – 40 | | |
| Καρότο | Ευαίσθητα ζιζάνια: Ζωχοί (<i>Sonchus sp.</i>) Κοινή πόα (<i>Poa annua</i>) Τσουκνίδα μικρή (<i>Urtica urens</i>) | 250 – 400 | 10 – 30 | | |
| Ηλιανθος | Ευαίσθητα ζιζάνια: Βλήτο τραχύ (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Λουβουδιά (<i>Chenopodium album</i>) | 250 – 400 | 10 – 30 | | |
| Κρεμμύδι Σκόρδο | Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοσινάπι (<i>Sinapis arvensis</i>) Βλήτα (<i>Amaranthus sp.</i>) Τσουκνίδα μικρή (<i>Urtica urens</i>) | 250 | 15 – 40 | | |

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο |
|-----------------|--|--------------------|---------------------------------|--|--|
| | | κ.εκ. σ.κ./δεκ. | Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.) | | |
| Πατάτα | Ευαίσθητα ζιζάνια: Βλήτα (<i>Amaranthus</i> sp) Γλυστρίδα (<i>Portulaca oleraceae</i>) Ζωχός (<i>Sonchus oleraceus</i>) Λουβουδιά (<i>Chenopodium album</i>) Μεγαλόκαρπη Κολλητσίδα (<i>Galium</i> sp.) Παπαρούνα (<i>Paraver rhoeas</i>) Σετάρια (<i>Setaria</i> sp.) Τάτουλας (<i>Datura stramonium</i>) Τσουκνίδα μικρή (<i>Urtica urens</i>) | 250 – 400 | 10 – 30 | Προφυτρωτικά | 1 |
| | | | | | |
| Αγκινάρα | Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοσινάπι (<i>Sinapis arvensis</i>) Βλήτο τραχύ (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Λουβουδιά (<i>Chenopodium album</i>) | 250 | 20 – 50 | | |
| Καπνός | Ευαίσθητα ζιζάνια: Βλήτα (<i>Amaranthus</i> sp.) Γλυστρίδα (<i>Portulaca oleraceae</i>) Τριβόλι (<i>Tribulus terrestris</i>) | 250 | 15 – 40 | Προφυτρωτικά την ημέρα της μεταφύτευσης, πριν από τη φύτευση του καπνού. | |

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο |
|---|---|--------------------|---------------------------------|---|--|
| | | κ.εκ. σκ./δεκ. | Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.) | | |
| Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά Μάραθος (φύλλα) Χαμομήλι Καλεντούλα Άνηθος (φύλλα) Λεβιστικό (φύλλα και ρίζες) Αγγελική* (φύλλα) Γεντιανή (ρίζες) | Ευαίσθητα ζιζάνια: Ζωχοί (<i>Sonchus sp.</i>) Κοινή πόα (<i>Poa annua</i>) Τσουκνίδα μικρή (<i>Urtica urens</i>) | 250 | 15 – 40 | Προφυτρωτικά Μεταφυτρωτικά για Αγγελική και Γεντιανή | 1 |
| Παρατηρήσεις: 1. Προκειμένου για την καλύτερη αντιμετώπιση των ζιζανίων συνιστάται η εφαρμογή να γίνεται σε καλά προετοιμασμένο έδαφος χωρίς σβόλους. Να μην ενσωματώνεται το σκεύασμα. 2. Οι μικρότερες δόσεις χρησιμοποιούνται σε ελαφρά εδάφη, ενώ οι μεγαλύτερες σε βαριά αργιλώδη εδάφη | | | | | |

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

| Καλλιέργειες | Χρόνος Ασφάλειας |
|--|------------------|
| Άνηθος, Κρεμμύδι, Μαϊντανός, Μάραθος, Χαμομήλι, Καλεντούλα, Λεβιστικό, Αγγελική | 90 ημέρες |
| Καρότο, Παστινάκη, Σκόρδο, Γεντιανή (ρίζα) | 70 ημέρες |
| Αγκινάρα, Ηλίανθος, Καπνός, Κουκιά, Λούπινα, Μπιζέλια (ξηρά), Μπιζέλια (φρέσκα χωρίς λοβό), Πατάτα, Ρεβίθια, Φακές, Φασόλια (ξηρά) | --- |

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: aclonifen: F3

- Για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας, να χρησιμοποιούνται ζιζανιοκτόνα διαφορετικών χημικών ομάδων, με διαφορετικούς τρόπους δράσης στα ίδια χωράφια, στα πλαίσια αμειψισποράς.
- Να μην χρησιμοποιείται σε πρώιμες πατάτες.
- Να μην χρησιμοποιείται σε πατάτες ποικιλίας 'Mona Lisa' σε ασβεστώδες έδαφος

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας πατάτας στην οποία εφαρμόστηκε το CHALLENGE, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρούν μετά την πάροδο 3 εβδομάδων, αραβόσιτος, ηλίανθος, σόγια, φασόλια και σόργο, μετά από όργωμα του εδάφους

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Για αμειψισπορά, υπό κανονικές συνθήκες, είναι απαραίτητη η πάροδος ενός έτους μετά την εφαρμογή του CHALLENGE.

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν: 6 ώρες

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες

10. Συνδυαστικότητα: ---

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:



12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

| | |
|---------------|---|
| H351 | Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. |
| H410 | Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. |
| EUH208 | Περιέχει aclonifen και 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. |
| EUH401 | <i>Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</i> |

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

| | |
|-------------|---|
| P102 | Μακριά από παιδιά. |
| P405 | Φυλάσσεται κλειδωμένο. |
| P201 | Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση. |
| P270 | Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. |
| P280 | Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Φοράτε ολόσωμη φόρμα, γάντια και μπότες κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. |
| P501 | Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. |
| SP1 | Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. |
| SPe3 | Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι μη γεωργική γη. |
| SPe3 | Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας 40 μέτρων συμπεριλαμβανομένης μίας φυτικής ζώνης ανάσχεσης 20 μέτρων για τις καλλιέργειες του φασολιού, μπιζελιού, κουκιού, ανήθου και μαϊντανού, 30 μέτρων συμπεριλαμβανομένης μίας φυτικής ζώνης ανάσχεσης 10 μέτρων για την καλλιέργεια της πατάτας, 20 μέτρων συμπεριλαμβανομένης μίας φυτικής ζώνης ανάσχεσης 10 μέτρων για τις καλλιέργειες του μάραθου, χαμομηλιού, καλεντούλας, λεβιστικού, αγγελικής, γεντιανής και κρεμμυδιού από τα επιφανειακά νερά. |
| SPe3 | Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων για τις καλλιέργειες των λούπινου, φακής, ρεβιθιού, ηλίανθου και σκόρδου και μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων για τις καλλιέργειες του καπνού, παστινάκης, καρότου και αγκινάρας από τα επιφανειακά νερά. |

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Γενικά: Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια.

R308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον σε ηρεμία.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε επιμελώς με πολύ νερό και σαπούνι, και εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400 και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά.

Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. Κρατήστε τον παθόντα ζεστό και σε ηρεμία.

Πληροφορίες για το γιατρό:

Συμπτώματα: Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα.

Θεραπεία: Συνήθως δεν απαιτείται γαστρική απόπλυση. Εάν καταποθεί αρκετή ποσότητα σκευάσματος (περισσότερη από μία γουλιιά) χορηγήστε ενεργό άνθρακα και θειικό Νάτριο.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, σε συνήθεις συνθήκες αποθήκευσης, στην αρχική του κλειστή συσκευασία.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα με κατάλληλο μηχανισμό (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η άδεια παράλληλου εμπορίου χορηγείται στο προϊόν Challenge που είναι αδειοδοτημένο στο Βέλγιο με εμπορικό όνομα Challenge και αριθμό έγκρισης 7936P/B και με κάτοχο άδειας την εταιρεία Bayer CropScience N.V/ S.A

Το προϊόν αναφοράς στην Κύπρο, βάσει του οποίου χορηγείται η σχετική άδεια, είναι το Challenge 600 με αριθμό άδειας 1433.

Η εταιρεία A.D Georoniki Ltd, οφείλει να τηρεί αρχείο (Αρχείο Εισαγωγής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Παράλληλου Εμπορίου) με τις ποσότητες του σκευάσματος Challenge που εισάγονται στην Κύπρο (θα περιλαμβάνει όλα τα παραστατικά στοιχεία των εισαγωγών ανά παρτίδα σκευάσματος).

Το αρχείο θα είναι άμεσα διαθέσιμο για έλεγχο από την αρμόδια Αρχή.

Για κάθε φορτίο του σκευάσματος Challenge που εισάγεται στην Κύπρο θα πρέπει να χορηγείται η σχετική «Άδεια για Εισαγωγή Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος Παράλληλου Εμπορίου». Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η εισαγωγή του σκευάσματος στη χώρα.

Η ετικέτα του σκευάσματος θα φέρει ευανάγνωστα τη φράση «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» με τα πλέον έντονα και μεγάλα γράμματα.

Η άδεια παράλληλου εμπορίου θα ανακληθεί:

- σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας του προϊόντος αυτού στο Βέλγιο για λόγους ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας.

- σε περίπτωση κακού χειρισμού της άδειας παράλληλου εμπορίου από την εταιρεία A.D Georopiki Ltd, με στόχο την εισαγωγή ή τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων άλλων από αυτά για τα οποία χορηγήθηκε η παρούσα άδεια.

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 08/09/2023



(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας