



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021  
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4193 (Έντυπο 01), για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,  
την επιστολή του αιτητή για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ιταλία και  
τις αιτήσεις με αρ. 4025 και 4499 (Έντυπο 8), για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **MATECOR EXPRESS** με τα ακόλουθα στοιχεία:

**A) Γενικά στοιχεία άδειας**

1. Αριθμός Άδειας:

3635

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

31/07/2023

Ημερομηνία λήξης άδειας:

15/02/2026

2. Κάτοχος της άδειας:

PROPLAN - Plant Protection Company, SL

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

A&E Stylianos Technochimiki Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

A&E Stylianos Technochimiki Ltd

## Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

Matecor Express

2. Μορφή:

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Metribuzin: 70% β/β  
Βοηθητικές ουσίες: 27,1 % β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

PROPLAN - Plant Protection Company, SL

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

LABORATORIOS SIRGA SA, Ισπανία

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

LABORATORIOS SIRGA SA, Ισπανία

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κουτί με εσωτερικό/ούς φάκελο/ους	30 γραμ. έως 5 κιλά	Κουτί χάρτινο. Φάκελος σύνθετου υλικού: πολυεστέρας/αλουμίνιο/LDPE
2	Κουτί με εσωτερική/ές σακούλα/ες	30 γραμ. έως 5 κιλά	Κουτί χάρτινο Σακούλα LDPE
3	Σακούλα	30 γραμ. έως 1 κιλό	Σύνθετο υλικό πολυεστέρας/αλουμίνιο/LDPE

## Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

Metribuzin

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

96% (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

PROPLAN - Plant Protection Company, SL

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Jiangsu Sevencontinent Green Chemical Co., Ltd, China

## Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

### 1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Εκλεκτικό προφυτρωτικό ή μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων σε καλλιέργειες πατάτας, τομάτας, σιταριού και κριθαριού. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από το φύλλωμα και δρα παρεμποδίζοντας την φωτοσύνθεση

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες  
ερασιτέχνες χρήστες

### 3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκασμός με πίεση μικρότερη από 45 psi (2-3 atm.) και μπεκ τύπου σκούπας. Το έδαφος πρέπει να είναι υγρό και ψιλοχωματισμένο. Οι διάφορες καλλιεργητικές φροντίδες (αυλάκωμα, παράχωμα, κ.λ.π.) πρέπει να γίνονται πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

### 4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι την μέση με νερό. Διαλύστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε τη προδιάλυση του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αμέσως μετά την εφαρμογή, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού απομακρύνοντας όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε καλά τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.



5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις		Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιέργ. περίοδο	
		Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	γρ. σκ./δεκ. μέγιστη		
Τομάτα (Υπαίθρου)	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια Άγρια ρόκα ( <i>Diploptaxis</i> sp.) Αγριοπαμπακιά ( <i>Abutilon theophrasti</i> ) Αγριοσινάπι ( <i>Sinapis arvensis</i> ) Αιματόχροτο ( <i>Digitaria</i> sp.) Αναγαλίδα ( <i>Anagallis arvensis</i> ) Αντράκλα ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Βερόνικα ( <i>Veronica</i> sp.) Βλήτα ( <i>Amaranthus</i> sp.) Γαλατσιίδα ( <i>Euphorbia</i> sp.) Ζωχός ( <i>Sonchus oleraceus</i> ) Ήρες ( <i>Lolium</i> sp.) Καπινόχορτο ( <i>Fumaria officinalis</i> ) Λάμιο ( <i>Lamium purpureum</i> ) Λουβουδιά ( <i>Chenopodium</i> sp.) Μουχρίτσα ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Περιπλοκάδα ( <i>Convolvulus arvensis</i> ) Πόα ( <i>Poa</i> sp.) Πολυκόμπι ( <i>Polygonum</i> sp.) Σετάριες ( <i>Setaria</i> sp.) Στελλάρια ( <i>Stellaria media</i> ) Σισύμπριο ( <i>Sisymbrium runcinatum</i> ) Τσουκνίδα ( <i>Urtica</i> sp.) Φέστουκα ( <i>Festuca rubra</i> ) Χαμομήλι ( <i>Matricaria chamomilla</i> )	40 – 70	40 – 75	ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΠΟΡΑ ή ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ, χωρίς ενσωμάτωση, σε καλά προετοιμασμένο έδαφος  ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΑ ή ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ: μετά από το σιλάκωμα ή όταν τα φυτά έχουν ριζοπιάσει και έχουν 8-9 φύλλα BBCH 15-19  ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΑ: από το φύτεμα μέχρι 3-4 ημέρες πριν το φύτερωμα της καλλιέργειας.  ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΑ: Από την εμφάνιση των νεαρών φυτών μέχρι τα φυτά να αποκτήσουν ύψος 5 - 10 εκ. BBCH 14-16  ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΑ  ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΑ, από το στάδιο των 3 φύλλων έως το τέλος του αδελφώματος	1 εφαρμογή
		40 – 70	30		
Πατάτα			40 – 75		
Σιτάρι Κριθάρι		30 – 40	10		

## Παρατηρήσεις:

1. Στην τομάτα και πατάτα: Οι δόσεις είναι ανάλογα με το είδος του εδάφους. Οι χαμηλές δόσεις στα ελαφρά εδάφη, οι υψηλές δόσεις στα βαριά, αργιλώδη, πλούσια σε οργανική ουσία εδάφη.
2. Μην το χρησιμοποιείτε σε αμμώδη, ελαφρά εδάφη με περιεκτικότητα σε οργανική ουσία < 1% και σε πολύ βαριά εδάφη με περιεκτικότητα σε οργανική ουσία > 6%.
3. Μην το χρησιμοποιείτε σε τομάτα θερμοκηπίου.
4. Στην τομάτα, μην το χρησιμοποιείτε πριν την σπορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - όταν η ποσότητα σπόρου που χρησιμοποιείτε είναι μικρότερη από 250 γραμ. / στρ. καθώς η καλλιέργεια είναι πιο ευαίσθητη σε περίπτωση ξαφνικής πτώσης της θερμοκρασίας
  - σε εδάφη που μπορούν να σχηματίσουν "κρούστα" κατά το φύτρωμα των φυταρίων
5. Στην τομάτα σε μεταφυτρωτική εφαρμογή και σε εφαρμογή μετά την μεταφύτευση:
  - Για καλή αποτελεσματικότητα είναι απαραίτητη η εδαφική υγρασία. Εάν χρειαστεί, να γίνει άρδευση 7 ημέρες πριν την εφαρμογή
  - Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες που υποφέρουν από ξηρασία, αλλαγές θερμοκρασίας, κλπ.
  - Οποιαδήποτε καλλιεργητική εργασία πρέπει να είναι επιφανειακή ώστε να μην βλάψει το ριζικό σύστημα της τομάτας και να διεξάγεται τουλάχιστον 5-10 ημέρες πριν από τη εφαρμογή του σκευάσματος
6. Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν φυσάει.
7. Η εφαρμογή του σκευάσματος συνιστάται στις ποικιλίες πατάτας που δεν είναι ευαίσθητες στο Metribuzin. Έχει δοκιμαστεί στις ποικιλίες πατάτας: Admirandus, Alkmaria, Apollo, Arsy, Bea, Bintje, Cardinal, Desiree, Favorita, Hulmada, Kennebec, Majestic, Monnalisa, Primura, Resy, Rosanna, Saxia, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal . Να μην εφαρμοσθεί σε ποικιλίες Draga, Jarla και Vínax που είναι ευαίσθητες στο Metribuzin.
8. Η εφαρμογή του σκευάσματος συνιστάται στις ποικιλίες τομάτας που δεν είναι ευαίσθητες στο Metribuzin.

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Τομάτα (Υπαίθρου), Σιτάρι, Κριθάρι	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
Πατάτα	60 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

### **Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: C1**

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα).

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην ίδια περίοδο μπορεί να καλλιεργηθεί, μετά από όργωμα του χωραφιού, πατάτα, τομάτα, σιτάρι, κριθάρι, σπαράγγι και καρότο.



β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Να μην εισέρχετε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS07



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

**H319** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**EUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

**P405+P102** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

**P270** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P264** Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας μετά το χειρισμό.

**P280** Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Φοράτε γάντια, ολόσωμη φόρμα και παπούτσια εργασίας κατά την ανάμιξη /φόρτωση και κατά την εφαρμογή.

**P501** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**Sp1** Μη ρυπαίνεται το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

**Spe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian απέκαστη ζώνη προστασίας από επιφανειακά ύδατα:

**20 μέτρων**, σε πατάτα (μεταφυτρωτική εφαρμογή), σε τομάτα (εφαρμογή μετά τη μεταφύτευση), σε Σιτάρι και Κριθάρι.

**30 μέτρων**, σε συνδυασμό με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψ.υ. κατά 40%, σε πατάτα (προφυτρωτική εφαρμογή), τομάτα (εφαρμογή πριν τη μεταφύτευση).

**Spe3** Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μian απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη καλλιεργήσιμη γη

#### 14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

**P101:** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

**P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**P337+P313:** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

**P308+P313:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 1401

#### Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, καλά κλειστό, σε μέρος δροσερό ξηρό και καλά αεριζόμενο, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

#### ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγούμενος με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

#### Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: ...31/07/2023....



(Ανδρούλα Γεωργίου)  
Διευθύντρια  
Τμήματος Γεωργίας