



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011  
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 3419 (Έντυπο 08), ημερομηνίας 16/10/2018 για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,  
την αίτηση με αρ. 346 (Έντυπο 09), ημερομηνίας 18/03/2019 για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος, σε σχέση με τον παρασκευαστή της δραστικής ουσίας και τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας,  
την αίτηση με αρ. 420 (Έντυπο 09), για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος, σε σχέση με τον παρασκευαστή της δραστικής ουσίας και τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας και τις αιτήσεις με αρ. 3828 και 4323 (Έντυπο 08), για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **ARCADE 880EC** με τα ακόλουθα στοιχεία:

**A) Γενικά στοιχεία άδειας**

1. Αριθμός Άδειας:

3089

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

28/09/2022

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/10/2024

2. Κάτοχος της άδειας:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια)

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια)

## Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Arcade 880EC

2. Μορφή: Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Prosulfocarb: 80% β/ο
Metribuzin: 8% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 12,5% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: Syngenta Crop Protection AG, Switzerland

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

1. Syngenta Chemical BV, Βέλγιο
2. Syngenta Production France, Aigues-Vives, France

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
2. Syngenta Chemical BV, Βέλγιο
3. Syngenta Production France, Aigues-Vives, France

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	1Λ και 5Λ	f-HDPE, HDPE/PA
2	Δοχεία	10Λ και 20Λ	f-HDPE, HDPE/PA

## Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

1. Prosulfocarb
2. Metribuzin

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

1. 97% (β/β) min
2. 93% (β/β) min

3. Παρασκευαστής των δ.ο.:

<b>Prosulfocarb:</b> 1. Syngenta Crop Protection AG, Switzerland 2. CAC Chemical GmbH, Γερμανία
<b>Metribuzin:</b> 1. Bayer AG, Crop Science Division, Γερμανία 2. Rallis India Limited, Ινδία

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

<b>Prosulfocarb:</b> 1. KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD., Japan 2. Lianyungang Neutech Chemical Co., Ltd., China 3. CAC Nantong Chemical Co., Ltd, Κίνα
<b>Metribuzin:</b> 1. Bayer Cropscience, USA 2. Rallis India Limited, Ινδία

## Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε πατάτα. Περιέχει συνδυασμό δύο δραστικών συστατικών του, prosulfocarb (Θειοκαρβαμικό) και του metribuzin (τριαζινόνη) με ζιζανιοκτόνο δράση.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες  
ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους με ψεκαστήρα υψηλού όγκου και ψεκαστικό υγρό 20-40 λίτρα/δεκάριο

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίζετε το ψεκαστικό δοχείο με τη μισή ποσότητα νερού. Προσθέστε την απαιτούμενη δόση σκευάσματος και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να αναδευτεί καλά πριν την έναρξη του ψεκασμού. Το ψεκαστικό διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες από την παρασκευή του, αφού προηγηθεί ισχυρή ανάδευση.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Ζιζάνιο που ελέγχεται	Δόσεις		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη		
Πατάτα	<p>Ετήσια Αγρωστώδη ζιζάνια και Πλατύφυλλα ζιζάνια</p> <p><b>Ευαίσθητα ζιζάνια</b></p> <p><u>Αγρωστώδη</u>  <i>Echinochloa crus-galli</i>  <i>Lolium rigidum</i>  <i>Setaria viridis</i></p> <p><u>Πλατύφυλλα</u>  <i>Aethusa sp.</i>  <i>Amaranthus blitoides</i>  <i>Amaranthus retroflexus</i>  <i>Atriplex patula</i>  <i>Chenopodium album</i>  <i>Datura stramonium</i>  <i>Fumaria officinalis</i>  <i>Mercurialis annua</i>  <i>Polygonum aviculare</i>  <i>Polygonum convolvulus</i>  <i>Polygonum lapathifolium</i>  <i>Polygonum persicaria</i>  <i>Senecio vulgaris</i>  <i>Urtica sp</i>  <i>Xanthium spinosum</i></p>	20 – 40	400 – 500	<p><b>Προφυτρωτικά</b></p> <p>Η μεγάλη δόση εφαρμόζεται σε βαριά, οργανικά εδάφη και σε περίπτωση μεγάλων πληθυσμών ζιζανίων</p>	1 εφαρμογή
<p><b>Παρατηρήσεις:</b></p> <p>1) Για καλύτερη αποτελεσματικότητα εφαρμόστε προφυτρωτικά σε υγρό και καλά επεξεργασμένο έδαφος</p>					

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Πατάτα	Μη εφαρμόσιμο, λόγω του χρόνου εφαρμογής

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης:** Prosulfocarb - **N**  
Metribuzin - **C1**

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μετά την εφαρμογή του Arcade 880EC μπορεί να επανασπαρθεί μόνο πατάτα

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Σε προγράμματα αμειψισποράς, μετά την εφαρμογή του προϊόντος μπορούν να επανασπαρθούν όλες οι καλλιέργειες

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Οι εργάτες κατά την είσοδο τους στον αγρό μετά την εφαρμογή πρέπει να φορούν γάντια και κατάλληλα υποδήματα

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής

10. Συνδυαστικότητα:

----

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS09

## 12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**EUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

## 13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

**P102:** Μακριά από παιδιά.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο.

Να φοράτε μάσκα κατά την ανάμιξη φόρτωση και εφαρμογή

Να φοράτε κατάλληλα υποδήματα κατά την εφαρμογή

Περιέχει prosulfocarb. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση .

**P391:** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα

**P405:** Φυλάσσεται κλειδωμένο

**P501:** Το υλικό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατεθούν σε εγκεκριμένη μονάδα διάθεσης αποβλήτων.

**SP1** Μη μολύνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του (Μην καθαρίζετε τα ψεκαστικά κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Αποφύγετε μόλυνση μέσω αποχετεύσεων από αυλές και δρόμους)

**SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **18 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.

**SPe3** Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** ή 5 μέτρων με χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς από μη γεωργική γη.

**EUH208** Περιέχει prosulfocarb Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

**EUH066** Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

## 14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

**Γενικά:** Μετακινήστε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο ή σε καθαρό αέρα και προστατέψτε τον από υποθερμία. Αν υποψιάζεστε δηλητηρίαση, καλέστε αμέσως γιατρό.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε πολύ καλά τα λερωμένα μέρη του σώματος με νερό πρώτα και με σαπούνι και νερό στη συνέχεια. Τα λερωμένα ρούχα πρέπει να πλυθούν καλά και να σιδερωθούν πριν ξαναφορεθούν.

**Σε περίπτωση αναπνοής:** Απομακρύνετε το άτομο από την επικίνδυνη περιοχή σε καλά αεριζόμενο χώρο και προστατέψτε το από την υποθερμία. Για προληπτικούς λόγους καλέστε γιατρό.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Καλέστε αμέσως το γιατρό και δείξτε του αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:**1401

## E. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μικρότερες από -10°C και μεγαλύτερες από +35°C.

Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια.

**ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή με τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα ή σχίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:**

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία: 28/09/2022...



(Ανδρούλα Γεωργίου)  
Διευθύντρια  
Τμήματος Γεωργίας