



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011  
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. 4511-P (Έντυπο 03), για χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου σε φυτοπροστατευτικό προϊόν

χορηγείται άδεια παράλληλου εμπορίου στο φυτοπροστατευτικό προϊόν CIDELY TOP  
125/15DC με τα ακόλουθα στοιχεία:

**A) Γενικά στοιχεία άδειας**

1. Αριθμός Άδειας:

3948-P

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

07/06/2022

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/03/2024

2. Κάτοχος της άδειας:

Plant Fix Ltd

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Plant Fix Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Plant Fix Ltd

## Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Cidely Top 125/15DC

2. Μορφή: εναιωρηματοποίηση συμπύκνωμα (DC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: Difenoconazole: 12,5% β/ο  
Cyflufenamid: 1,5% β/ο  
βοηθητικές ουσίες: 85,17% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: Syngenta Crop Protection AG

5. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες / Δοχεία	50κ.εκ., 100κ.εκ., 250κ.εκ., 500κ.εκ., 1Λ, 5Λ και 10Λ	HDPE PET HDPE-PA f-HDPE

## Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: 1. Difenoconazole  
2. Cyflufenamid

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 1. 94% min  
2. 98% min

3. Παρασκευαστής των δ.ο.: **Difenoconazole:** Syngenta Crop Protection AG  
**Cyflufenamid:** Nisso Chemical Europe GmbH

4. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.: **Difenoconazole:**  
1. Syngenta Crop Protection Monthey SA  
2. Deccan Fine Chemicals (India) Private Ltd  
**Cyflufenamid:** KoriyamaKaseiCo Ltd

## Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Το Cidely Top είναι μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Περιέχει τα δραστικά συστατικά Difenoconazole (τριαζόλη) που κινείται δεαλασματικά και δρα προληπτικά και θεραπευτικά και Cyflufenamid (amidoxime) που κινείται διελασματικά, παρουσιάζει τάση ατμών και έχει προληπτική, υπολειμματική και θεραπευτική δράση. Καταπολεμά μυκητολογικές ασθένειες σε τομάτα, καρπούζι, πεπόνι, αγγούρι, κολοκύθι, φράουλα, πιπεριά και μελιτζάνα.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση στο ψεκαστήρα, αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

Βεβαιωθείτε ότι το ψεκαστικό μηχάνημα και ειδικά τα ακροφύσια έχουν καθαριστεί πριν τον ψεκασμό. Τα ψεκαστικά μηχανήματα πρέπει να ρυθμιστούν /ελεγχθούν με ακρίβεια για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση.

## 5. Φάσμα Δράση

Πεδίο Εφαρμογής	Ασθένεια που ελέγχεται	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη		
<b>Τομάτα</b> (Υπαίθρου)	<b>Αλτερναρίωση</b> ( <i>Alternaria solani</i> ) <b>Κλαδοσπορίωση</b> ( <i>Fulvia fulva</i> )	100	30 – 100	100	Ψεκασμός φυλλώματος Από την έκπτυξη του πρώτου πλάγιου βλαστού έως το στάδιο της τυπικής πλήρους ωρίμανσης των καρπών. BBCH 20-89	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες
<b>Τομάτα</b> (Θερμοκηπίου)	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Leveillula taurica</i> , ( <i>Erysiphe lycopersici</i> , <i>Oidium lycopersici</i> ) <b>Αλτερναρίωση</b> ( <i>Alternaria solani</i> ) <b>Κλαδοσπορίωση</b> ( <i>Fulvia fulva</i> )	100	30 – 100	100	Ψεκασμός φυλλώματος Από την έκπτυξη του πρώτου πλάγιου βλαστού έως το στάδιο της τυπικής πλήρους ωρίμανσης των καρπών. BBCH 20-89	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες
<b>Πεπόνι</b> <b>Καρπούζι</b> <b>Αγγούρι</b> <b>Κολοκύθι</b> (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Podosphaera xanthii</i> , <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> <i>Golonomyces cichoracearum</i> ) <b>Αλτερναρίωση</b> ( <i>Alternaria cucumerina</i> ) <b>Μαύρη σήψη</b> ( <i>Didymella bryoniae</i> ) <b>Κλαδοσπορίωση</b> ( <i>Cladosporium cucumerinum</i> )	100	30 – 100	100	Ψεκασμός φυλλώματος Από την έκπτυξη του πρώτου πλάγιου βλαστού έως το στάδιο της τυπικής πλήρους ωρίμανσης των καρπών. BBCH 20-89	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες

Πεδίο Εφαρμογής	Ασθένεια που ελέγχεται	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη		
<b>Φράουλα</b> (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Sphaerotheca macularis</i> <i>Podosphaera macularis</i> ) <b>Ανθράκωση</b> ( <i>Colletotrichum acutatum</i> <i>Mycosphaerella fragariae</i> ) <b>Αλτερναρίωση</b> ( <i>Alternaria spp</i> )	100	80 – 100	100	Ψεκασμός φυλλώματος Μετά την έκπτυξη του 9 <sup>ου</sup> φύλλου έως τη συγκομιδή που οι περισσότεροι καρποί έχουν χρωματιστεί BBCH 20-89	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες
<b>Πιπεριά Μελιτζάνα</b> (Υπαίθρου)	<b>Αλτερναρίωση</b> ( <i>Alternaria solani</i> ) <b>Κλαδοσπορίωση</b> ( <i>Fulvia fulva</i> )	100	30 – 100	100	Ψεκασμός φυλλώματος Από την έκπτυξη του πρώτου πλάγιου βλαστού έως το στάδιο της τυπικής πλήρους ωρίμανσης των καρπών. BBCH 20-89	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες
<b>Πιπεριά Μελιτζάνα</b> (Θερμοκηπίου)	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Leveillula taurica</i> , <i>Erysiphe lycopersici</i> , <i>Oidium lycopersici</i> ) <b>Αλτερναρίωση</b> ( <i>Alternaria solani</i> ) <b>Κλαδοσπορίωση</b> ( <i>Fulvia fulva</i> )	100	30 – 100	100	Ψεκασμός φυλλώματος Από την έκπτυξη του πρώτου πλάγιου βλαστού έως το στάδιο της τυπικής πλήρους ωρίμανσης των καρπών. BBCH 20-89	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Τομάτα, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθι, Αγγούρι, Φράουλα (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου) Πιπεριά, Μελιτζάνα, (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	3 μέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: Difenoconazole:3  
Cyflufenamid: U6**

- Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας στο ωίδιο, οι εφαρμογές με σκευάσματα που περιέχουν το δραστικό συστατικό cyflufenamid να μην ξεπερνούν το 1/3 των εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο των προγραμμάτων φυτοπροστασίας.
- Το σκεύασμα Cidely Top είναι συμβατό σε προγράμματα IPM.
- Το Cidely Top, είναι συμβατό με τα ωφέλημα *Orius laevigatus*, *Amblyseius Swirskii*, *Encarsia formosa*, *Eretmocerus mundus* και *Nesidiocoris tenuis* που χρησιμοποιούνται στα θερμοκήπια, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας (μέχρι 2 εφαρμογές) με μεσοδιάστημα 10 ημέρες και με δόση 100κ.εκ/100λίτρα ψεκαστικού υγρού με όγκο ψεκαστικού έως 100λίτρα/δεκάριο)

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

----

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

----

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Μέχρι ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκαζόμενη φυλλική επιφάνεια

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες και εγκεκριμένες δόσεις εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα:

----

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**



12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

**H318** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**EUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

**P405+ P102** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

**P261** Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων.

**P270** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Φοράτε μάσκα, γυαλιά και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.

Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την επανείσοδο στην καλλιέργεια.

**P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**SP1** Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

**SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη ασφαλείας **3 μέτρων** και μία ζώνη φυτικής ανάσχεσης μήκους **10 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

**Γενικά:** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύνετε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

**P305 + P351 + P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**P301 + P310:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

## Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, και καλά αεριζόμενο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως

## ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξέπλυματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

## Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

### **ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**

Η άδεια παράλληλου εμπορίου χορηγείται στο προϊόν Cidely Top 125/15DC που είναι αδειοδοτημένο στην Ελλάδα με εμπορικό όνομα Cidely Top 125/15DC και αριθμό έγκρισης 60419 και με κάτοχο άδειας την εταιρεία Syngenta Hellas.

Το προϊόν αναφοράς στην Κύπρο, βάσει του οποίου χορηγείται η σχετική άδεια, είναι το Cidely Top 125/15DC με αριθμό άδειας 3109.

Η εταιρεία Plant Fix Ltd, οφείλει να τηρεί αρχείο (Αρχείο Εισαγωγής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Παράλληλου Εμπορίου) με τις ποσότητες του σκευάσματος Cidely Top 125/15DC που εισάγονται στην Κύπρο (θα περιλαμβάνει όλα τα παραστατικά στοιχεία των εισαγωγών ανά παρτίδα σκευάσματος).

Το αρχείο θα είναι άμεσα διαθέσιμο για έλεγχο από την αρμόδια Αρχή.

Για κάθε φορτίο του σκευάσματος Cidely Top 125/15DC που εισάγεται στην Κύπρο θα πρέπει να χορηγείται η σχετική «Άδεια για Εισαγωγή Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος Παράλληλου Εμπορίου». Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η εισαγωγή του σκευάσματος στη χώρα.

Η ετικέτα του σκευάσματος θα φέρει ευανάγνωστα τη φράση «**ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**» με τα πλέον έντονα και μεγάλα γράμματα.

Η άδεια παράλληλου εμπορίου θα ανακληθεί:

- σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας του προϊόντος αυτού στην Ελλάδα για λόγους ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας.

- σε περίπτωση κακού χειρισμού της άδειας παράλληλου εμπορίου από την εταιρεία Plant Fix Ltd, με στόχο την εισαγωγή ή τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων άλλων από αυτά για τα οποία χορηγήθηκε η παρούσα άδεια.

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου του 2011.

Ημερομηνία: .....07/06/2022..

.....  
(Ανδρούλα Γεωργίου)  
Διευθύντρια  
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα