



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. 143 (Έντυπο 12), ημερομηνίας 12/06/2017 για την τροποποίηση υφιστάμενης άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος μετά την έγκριση όλων των δραστικών ουσιών που περιέχονται στο προϊόν και

την επιστολή του αιτητή για τροποποίηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της οριστικής άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ελλάδα,

τις αιτήσεις με αρ. 3818 και 4523 (Έντυπο 08), για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος και

την αίτηση με αρ. 513 (Έντυπο 09) για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος, σε σχέση με την ονομασία του κατόχου άδειας και τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος και

την αίτηση με αρ. 653 (Έντυπο 09) για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος, σε σχέση με τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν TALENDO 20EC..... με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

2641

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

21/07/2023

Ημερομηνία λήξης άδειας:

15/05/2027

2. Κάτοχος της άδειας:

Corteva Agriscience Ε/ΜΑΣ Α.Ε

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

4. Διανομέας / Διανομείς: Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Talendo 20EC

2. Μορφή: Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: Proquinazid: 20% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 78,43 β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: Corteva Agriscience International Sarl,

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Corteva Agriscience France S.A.S., France

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: 1. Corteva Agriscience France S.A.S., France
2. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ, Ελλάδα
3. Solfotecnica Italiana S.p.A, Italy

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	50κ.εκ., 100κ.εκ.	PET (polyethylene terephthalate) Κάθε μια φιάλη βρίσκεται εντός χάρτινου κουτιού (εσωτερικό κουτί). Κάθε χαρτοκιβώτιο (outer box) περιέχει 10 εσωτερικά κουτιά.
2		250κ.εκ.	PET (polyethylene terephthalate) Κάθε μια φιάλη βρίσκεται εντός χάρτινου κουτιού (εσωτερικό κουτί). Κάθε χαρτοκιβώτιο (outer box) περιέχει 8 εσωτερικά κουτιά.
3		1Λ	High density polyethylene (HDPE) coextruded with EVOH Οι φιάλες συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια ανά 10.

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Proquinazid

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 95% β/β min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Corteva Agriscience International Sarl, Switzerland

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

1. Corteva Agriscience Spain S.L.U
2. Saltigo GmbH, Germany

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική δράση, για την καταπολέμηση του Ωιδίου (*Uncinula necator*) στο αμπέλι. Το TALENDO 20 EC περιέχει (proquinazid), ένα νέο μυκητοκτόνο της κατηγορίας των κουιναζολινών με καινοτόμο τρόπο δράσης. Το Proquinazid δρα προληπτικά παρεμποδίζοντας την βλάστηση των σπορίων και το σχηματισμό απρεσσορίων του μύκητα.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Συνιστάται να εφαρμόζεται προληπτικά, για την καταπολέμηση, εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του ωιδίου της αμπέλου (*Uncinula necator*) και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.
Η περίοδος εφαρμογής του είναι από τα 3 φύλλα της καλλιέργειας έως 28 ημέρες πριν τη συγκομιδή

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Πριν από την εφαρμογή βεβαιωθείτε ότι το ψεκαστικό μηχάνημα είναι καθαρό και κατάλληλα ρυθμισμένο. Γεμίστε τον περιέκτη του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και ανοίξτε τον αναδευτήρα. Προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα TALENDO 20EC απευθείας στον ψεκαστήρα. Συνεχίστε με την ανάδευση, έως ότου γεμίσετε τον περιέκτη μέχρι πάνω με νερό και κατά την διάρκεια του ψεκασμού.
Ο όγκος της εφαρμογής θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στην πυκνότητα του φυλλώματος στο οποίο πρόκειται να γίνει εφαρμογή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ:

Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά με άφθονο νερό τα μπέκ και τα φίλτρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα. Ξεπλύνετε όλο το ψεκαστικό μηχάνημα με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάτινες επιφάνειες. Ξεπλύνετε 3 φορές τα κενά υλικά συσκευασίας και ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό. Μην ξαναχρησιμοποιήσετε τα κενά υλικά συσκευασίας για οποιαδήποτε άλλη χρήση.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Ασθένεια που ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	κ.εκ. σκ./δεκ. max		
Αμπέλι (Επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο)	Ωίδιο (<i>Uncinula necator</i>)	---	30 – 100	20 – 25	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος, μεταξύ του σταδίου των 3 φύλλων (BBCH 13) έως και 28 ημέρες πριν την συγκομιδή	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 – 14 ημέρες
<p>Παρατηρήσεις Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργεια, η οποία βρίσκεται υπό συνθήκες καταπόνησης. Να μην εφαρμόζεται σε ελαφριά, αμμώδη εδάφη με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία. Το μεσοδιάστημα εφαρμογών καθορίζεται από την ένταση της προσβολής.</p>						

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Αμπέλι	28 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση Ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: Proquinazid - U7

Προληπτικές επεμβάσεις στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των Παθογόνων.

Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων/καλλιεργητική περίοδο : 2

Εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης τα οποία καταπολεμούν το Ωίδιο.

Εάν η ασθένεια έχει εγκατασταθεί, το TALENDO 20EC να εφαρμόζεται σε μίγμα ή μετά από ωιδιοκτόνα που έχουν θεραπευτική δράση

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή, πριν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στα φύλλα της καλλιέργειας. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κατάλληλη ενδυμασία εργασίας (μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικη μπλούζα) και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Το φυτοπροστατευτικό προϊόν TALENDO 20 EC, δεν προκαλεί συμπτώματα φυτοτοξικότητας, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GHS05



GHS08



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

- H315** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- H318** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- H351** Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
- H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

- P405+P102** Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
 - P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 - P201** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
 - P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
Ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιεί γάντια, μάσκα και προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμειξη/φόρτωση και τον χειρισμό του προϊόντος.
 - P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
 - SP1** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην καθαρίζεται ο εξοπλισμός, με τον οποίο εφαρμόζεται το φυτοπροστατευτικό προϊόν κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφεύγεται η μόλυνση μέσω της αποχέτευσης αγροκτημάτων ή δρόμων).
 - SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.
 - SPe3** Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από την μη γεωργική γη.
- EUH401** *«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»*

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

- P310** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
 - P362 + P364** Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
 - P302 + P352** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
 - P332 + P313** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
 - P305 + P351 + P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 - P308 + P313** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
- Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Χορηγήστε οξυγόνο και αν χρειάζεται να γίνει τεχνητή αναπνοή. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε ιατρική βοήθεια
- Σε περίπτωση κατάποσης:** ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό και μην χορηγήσετε τίποτα από το στόμα. Κρατήστε τον ασθενή σε θέση ανάπαυσης. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματός του. Εάν το άτομο δεν έχει τις αισθήσεις του, ξαπλώστε το στο πλάι με το κεφάλι πιο χαμηλά από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα ημιλυγισμένα. Εάν χρειαστεί, μεταφέρετε τον ασθενή σε ένα κέντρο υγείας και δείξτε την ετικέτα ή τον περιέκτη.
- Αντίδοτο:** Συμπτωματική θεραπεία
- Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων:** 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Να αποθηκεύεται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία.

Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή με τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα ή σχίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 21/07/2023



Σφραγίδα

(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας