



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. 4396-P (Έντυπο 07), για ανανέωση άδειας παράλληλου εμπορίου φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

τροποποιείται η άδεια παράλληλου εμπορίου στο φυτοπροστατευτικό προϊόν LEGEND 2.5EC με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3231-P

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

31/10/2022

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/10/2024

2. Κάτοχος της άδειας:

ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια)

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια)

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια)

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Legend 2.5EC

2. Μορφή: Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: deltamethrin 2,5 % β/ο
βοηθητικές ουσίες : 97,13 % β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: Sharda Cropchem Limited

5. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	100κ.εκ., 250κ.εκ., 500κ.εκ. και 1Λ	Πλαστικό τύπου COEX (HDPE/EVOH ή HDPE/PA)

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: deltamethrin

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 98,5% w/w

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: Sharda Cropchem Limited

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: GUJARAT Pesticides, Ινδία

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων. Το deltamethrin δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό και βάλτε τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη		
Εσπεριδοειδή - Πορτοκαλιά - Λεμονιά - Μανταρινιά - Γκρέιπ-φρούτ - Νερατζιά	Πράσινη αφίδα (<i>Myzus persicae</i>)	30 – 50	100	30 – 50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	1
	Λεκάνιο (<i>Saissetia oleae</i>) Μύγα της Μεσογείου (<i>Ceratitis capitata</i>) Αλευρώδης (<i>Aleurothrixus floccosus</i>)	50		50		
Μηλοειδή* - Μηλιά - Αχλαδιά	Καρπόκαψα της μηλιάς (<i>Laspeyresia pomonella</i>) Αφίδες (<i>Aphis pomi</i> , <i>Dysaphis plantaginea</i>) Ψύλλα μηλιάς (<i>Psylla mali</i>) Ανθονόμος (<i>Anthonomus pomorum</i> , <i>A. spilotus</i>) Μηλολόνη (<i>Melolontha melolontha</i>) Κηκιδόμυγες (<i>Dasineura mali</i>) Θρίπες (<i>Thrips spp.</i>)	30 – 50*	100	30 – 50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών	2
	Φυλλοδέτες (<i>Adoxophyes orana</i> , <i>Archips rosanus</i>)	35		35 – 50		
	Ψύλλα αχλαδιάς (<i>Psylla pyri</i>)	50 (75)		50		
	Ψώρα Σαν Ζοσέ (<i>Quadraspidiotus periculosus</i>)	50 – 70		50 – 70		

Πυρηνόκαρπα - Ροδακινιά - Νεκταρινιά - Βερικοκιά - Δαμασκηνιά - Κερασιά	Φυλλοδέτες (<i>Adoxophyes orana</i> , <i>Archips rosanus</i>) Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i>)	35	100-140	35 – 50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	1
	Ραγολέτιδα (μύγα κερασιού) (<i>Rhagoletis cerasi</i>)	40 – 50		40 – 70		
	Μύγα της μεσογείου (<i>Ceratitis capitata</i>)	50		50 – 70		
	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>Myzus cerasi</i> , <i>Hyalopterus pruni</i>) Καρπόκαψα της Δαμασκηνιάς (<i>Laspeyresia funebrana</i>)	30 – 50		30 – 70		
	Ψώρα Σαν Ζοσέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	50 – 70	100	50 – 70	Καλοκαιρινοί ψεκασμοί κατά κινητών μορφών	
Αμπέλι **	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i>)	50 (1 ^η γενεά) 50 – 70 (2 ^η & 3 ^η γενεά)	100	50 – 70	Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα Μεσοδιάστημα εφαρμογών 14 μέρες	3
	Κοχυλίδα (<i>Clysia ambiguella</i>)	50 – 70		50 – 70		
	Τζιτζικάκια (<i>Empoasca</i> spp.) Πυραλίδα (<i>Sparganothis pilleriana</i>) Τσιγαρολόγος (<i>Byctiscus betulae</i>) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp.)	50		50		
Φράουλα (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	Αφίδες (<i>Aphis</i> spp.)	50	50-100	25 – 50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων-προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών	3

Ελιά	Δάκος (<i>Bactrocera oleae</i>)	50	100-140	50 – 70	Σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες	1
	Λεκάριο (<i>Saissetia oleae</i>) Θρίπες (<i>Thrips spp.</i>)	50		50 – 70	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	
	Βαμβακάδα (<i>Eurphyllura spp.</i>)	30 – 50		50 – 70		
	Πυρηνοτρήτης (<i>Prays oleae</i>)	30 (ανθόβια γενεά) 50 (καρπόβια γενεά)		30 – 70	Στην έναρξη της άνθησης (ανθόβια γενεά) και αμέσως μετά την καρπόδεση (καρπόβια γενεά)	
Κρεμμύδι Πράσο Καρότο	Αφίδες, (<i>Aphis spp.</i>) Θρίπας (<i>Thrips tabaci</i>) Αλευρώδης (<i>Bemisia tabaci</i>) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp.</i>)	--	40-50	30 – 50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών	2
Σολανώδη <u>Υπαίθρου (Υ):</u> - Τομάτα - Πιπεριά - Μελιτζάνα <u>Θερμοκηπίου (Θ):</u> - Πιπεριά	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>), Σποντόπτερα (<i>Spodoptera spp.</i>), Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Anuraphis cardui</i> , <i>Hyperomyzus lactucae</i>)	50	60 – 100 (Υ) 60 – 140 (Θ)	30 – 50 (Υ) 30 – 70 (Θ)	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιάστημα 7 ημερών για θερμοκήπιο και 14 ημέρες για υπαίθρου	Υπαίθρου:3 Θερμοκηπίου:4
Βρωμούσα (<i>Nezara viridula</i>)	30	60 – 100 (Υ) 60 – 140 (Θ)	18 – 30 (Υ) 18 – 42 (Θ)			
Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	70 (Θ)	60 – 140 (Θ)	42 – 70 (Θ)			
Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp.</i>)	--	60 – 100 (Υ)	30 – 50 (Υ)			
Καπνός	Αφίδες Θρίπας (<i>Thrips tabaci</i>) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp.</i>) Επίτριξ (<i>Epiritrix spp.</i>)	--	50-100	30 – 50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών	3

Σολανώδη <u>Θερμοκηπίου (Θ):</u> -Τομάτα -Μελιτζάνα	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>), Σπονόπτερα (<i>Spodoptera</i> spp.), Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Anuraphis</i> <i>cardui</i> , <i>Hyperomyzus lactucae</i>)	50	60-100 (Θ)	30 – 50 (Θ)	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών	3
	Βρωμούσα (<i>Nezara viridula</i>)	7,5	60-140 (Θ)	18 – 42 (Θ)		
Αγγούρι <u>Υπαίθρου και</u> <u>Θερμοκηπίου</u>	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>), Σπονόπτερα (<i>Spodoptera</i> spp.), Αφίδες (<i>Aphis</i> spp., <i>Hyperomyzus lactucae</i>)	50	60 – 100 (Υ) 60 – 140 (Θ)	30 – 50 (Υ) 30 – 70 (Θ)	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών	3
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp.)	--	60 – 100 (Υ)	30 – 50 (Υ)		
Κραμπί (εκτός από το κινέζικο)	Πιερίδα (<i>Pieris</i> spp.), Μαμέστρα (<i>Mamestra brassicae</i>), Πλούζια (<i>Plusia gamma</i>), Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>), Σπονόπτερα (<i>Spodoptera littoralis</i>), Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>Brevicoryne</i> <i>brassicae</i>), Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp.)	--	50	30 – 50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών	2
	Πλουτέλλα (<i>Plutella xylostella</i>)	--	50	50		

Μαρούλι (Υπαίθρου)	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>) Σπονόπτερα (<i>Spodoptera exigua</i>) Άλτης (<i>Chrysodeixis chalcites</i>), Αφίδες (<i>Hyperomyzus lactucae</i> , <i>Aphis</i> spp., <i>Nasonovia ribis-</i> <i>nigri</i>)	50	50-100	25 – 50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών	3
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp.)	--		30 – 50		
Φύλλα Σέλινου Ρόκα	Αφίδες (<i>Aphis</i> spp.) Σπονόπτερα (<i>Spodoptera exigua</i>) Μαμέςτρα (<i>Mamestra</i> spp.) Άλτης (<i>Chrysodeixis chalcites</i>)	50	70	35	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών	2
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp.)	--		30 – 50		
Μπιζέλι	Αφίδα των μπιζελιών (<i>Acyrtosiphon pisum</i> , Σιτόνα (<i>Sitona</i> spp.)	--	100	25	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών	2
	Κάμπια των μπιζελιών (<i>Laspeyresia</i> spp), Θρίπας (<i>Thrips angusticeps</i>), Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp.)	--		30 – 50		
Ψυχανθή - Φασόλια - Κουκιά	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>), Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis</i> spp.) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp.)	--	60	25 – 30	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και έως την αρχή της άνθισης με μεσοδιαστήματα 14 ημερών	2
Αγκινάρα	Κασσίδα (<i>Cassida</i> spp.)	--	100	50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών	3
	Προντένια (<i>Spodoptera litura</i>) Αφίδες	--		30 – 50		

Πατάτα	Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	--	60	50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών	3
	Σπονόπτερα (<i>Spodoptera littoralis</i>)	--		30 – 50		
Ζαχαρότευτλα	Αφίδες (<i>Aphis fabae, Myzus persicae</i>), Μύγα των τεύτλων (<i>Pegomya</i> spp.), Άλτης (<i>Chaetocnema tibialis</i>), Σπονόπτερα (<i>Spodoptera</i> spp.), Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp.) Κλεονός (<i>Cleonus mendicus</i>)	--	50	30 – 50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	1
	Κασσίδα (<i>Cassida nebulosa</i>)	--		50		
Σιτηρά (Σιτάρι, Κριθάρι)	Αφίδες (<i>Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae</i>), Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp.)	--	20 – 40	25 – 30	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών με μεσοδιαστήματα 14-21 ημερών	2
Σπαράγγι	Προντένια (<i>Spodoptera</i> spp.) Αφίδες Θρίπας (<i>Thrips tabaci</i>)	--	100	30 – 50	Εφαρμογές μετά τη συγκομιδή με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών	2
Μανιτάρια	Δίπτερα	30 – 50	100	30 – 50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	1
Μηδική	Αφίδες Άπιο (<i>Arion pisi</i>) Φυτονόμος (<i>Hypera</i> spp)	-	40	25	5 – 10 ημέρες μετά την κοπή.	2
Ελαιοκράμβη	Αφίδες Λεπιδόπτερα (<i>Meligetes aenes, Psylliodes chrysocephala & Phyllotreta nemorum</i>) Άλτης (<i>Chaetocnema tibialis</i>)		20 - 40	20 - 30	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και έως την αρχή της άνθισης	1

Καλαμπόκι***	Πυραλίδα (<i>Ostrinia nubilalis</i>), Σεζάμια (<i>Sesamia nonagrioides</i>) Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>) Σπονόπτερα (<i>Spodoptera</i> spp.) Αφίδες (<i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>Sitobion avenae</i>) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp.)	--	60	30 – 50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών με μεσοδιαστήματα 14-21 ημερών	3
	<i>Diabrotica virgifera</i>	--		50		
Βαμβάκι	Ρόδινο σκουλήκι (<i>Pectinophora gossypiella</i>) Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>)		30-50	50 – 70	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών	2
	Αλευρώδης, (<i>Bemisia tabaci</i>), Τζιτζικάκια (<i>Empoasca</i> spp.)			50		
	Σπονόπτερα (<i>Spodoptera</i> spp.) Αφίδα (<i>Aphis gossypii</i>) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp.)			30 – 50		
Σόγια	Άλτης (<i>Chaetocnema tibialis</i>) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp.) Νεζάρα (<i>Nezara viridula</i>)	--	40	30	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και έως την αρχή της άνθισης με μεσοδιαστήματα 14 ημερών	2
	Αφίδες	--	--	50		

Καλλωπιστικά (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i>) Θρίπες (<i>Thrips tabaci</i>) Αλευρώδης (<i>Bemisia tabaci</i>) Μηλολόνη (<i>Melolontha melolontha</i>) Κάμπια γαρυφάλου (<i>Cacaecimorpha pronubana</i>)	50	50 – 100	25 – 50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών	2
	Φυλλοδέτες (<i>Archips</i> spp., <i>Adoxophyes</i> spp., <i>Pandemis</i> spp.)	35		17,5 – 35		
	Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	75	70	50		

Παρατηρήσεις:

*Στα μηλοειδή η δόση των 50 κ.εκ. σκευάσμ./100lt πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 lt/δεκ.) έτσι ώστε η τελική δόση του σκευάσματος να μην ξεπερνάει τα 50 κ.εκ. σκευάσμ. στο δεκάριο. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει υπέρβαση του Μέγιστου Επιτρεπόμενου Ορίου Υπολειμμάτων.

** Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα.

*** Η εφαρμογή του στο καλαμπόκι οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia* spp. και *Sesamia* spp.

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Εσπεριδοειδή, Βαμβάκι, Καλαμπόκι, Σιτηρά, Ζαχαρότευτλα	30 ημέρες
Μηδική	14 ημέρες
Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Αμπέλι, Ελιά, Κρεμμύδι, Πράσο, Καρότο, Πατάτα, Κραμπί, Μπιζέλι, Καπνός, Φύλλα Σέλινου	7 ημέρες
Φράουλα, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Αγγούρι, Μαρούλι, Ρόκα, Αγκινάρα, Μανιτάρι	3 ημέρες
Σπαράγγι, Όσπρια (Φασόλι, Κουκιά), Ελαιοκράμβη, Σόγια	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 3A

- Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο
- Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς
- Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό
- Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με Legend 2,5EC. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης
- Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων με τη γρήγορη μέθοδο της αντικειμενοφόρου πλάκας, ειδικό σύστημα μικροδοκιμής, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
- Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:



12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H226	Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H304	Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H336	Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H410	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102	Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P210	Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε.
P261	Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.
P270	Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280	Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
SP1	Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Spe3	Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες και την ελιά, 20 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού και 10 μέτρων για τα λαχανικά και τις λοιπές καλλιέργειες.
Spe3	Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.
Spe8:	Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες.
EUH401	Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

E. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, και καλά αεριζόμενο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα με κατάλληλο μηχανισμό (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Το σκεύασμα καταστρέφεται σε ειδικούς υφικαμίνους

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η άδεια παράλληλου εμπορίου χορηγείται στο προϊόν Legend 2.5EC που είναι αδειοδοτημένο στην Ελλάδα με εμπορικό όνομα Poleci 2.5EC και αριθμό έγκρισης 14408 και με κάτοχο άδειας την εταιρεία Sharda BENELUX B.V.B.A.

Το προϊόν αναφοράς στην Κύπρο, βάσει του οποίου χορηγείται η σχετική άδεια, είναι το Poleci 2.5EC με αριθμό άδειας 2898.

Η εταιρεία ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια), οφείλει να τηρεί αρχείο (Αρχείο Εισαγωγής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Παράλληλου Εμπορίου) με τις ποσότητες του σκευάσματος Legend 2.5EC που εισάγονται στην Κύπρο (θα περιλαμβάνει όλα τα παραστατικά στοιχεία των εισαγωγών ανά παρτίδα σκευάσματος).

Το αρχείο θα είναι άμεσα διαθέσιμο για έλεγχο από την αρμόδια Αρχή.

Για κάθε φορτίο του σκευάσματος Legend 2.5EC που εισάγεται στην Κύπρο θα πρέπει να χορηγείται η σχετική «Άδεια για Εισαγωγή Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος Παράλληλου Εμπορίου». Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η εισαγωγή του σκευάσματος στη χώρα.

Η ετικέτα του σκευάσματος θα φέρει ευανάγνωστα τη φράση «**ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**» με τα πλέον έντονα και μεγάλα γράμματα.

Η άδεια παράλληλου εμπορίου θα ανακληθεί:

- σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας του προϊόντος αυτού στην Ελλάδα για λόγους ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας.

- σε περίπτωση κακού χειρισμού της άδειας παράλληλου εμπορίου από την εταιρεία ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια), με στόχο την εισαγωγή ή τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων άλλων από αυτά για τα οποία χορηγήθηκε η παρούσα άδεια.

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου του 2011.

Ημερομηνία: 22/12/2022...



Σφραγίδα

(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας