



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4260 (Έντυπο 01), για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,
την επιστολή του αιτητή για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Γαλλία,
την αίτηση με αρ. 554 (Έντυπο 09), για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος, σε σχέση με τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας και
τις αιτήσεις με αρ. 3987 και 4345 (Έντυπο 8), για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **CERATIPACK** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3714

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

18/10/2022

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/10/2024

2. Κάτοχος της άδειας:

SEDQ Healthy Crops SL

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: CERATIPACK

2. Μορφή: Παγίδα προσέλκυσης & θανάτωσης

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: Deltamethrin: 0.01% β/β (TRAP)
Βοηθητικές ουσίες: 8,33 γρ. προσελκυστικών / παγίδα

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: SEDQ

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: SEDQ

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: SEDQ

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Ετοιμόχρηστη παγίδα	Χάρτινο κουτί 1 δοχείου (20X18 εκ.)	α. Το δοχείο είναι από πλαστικό (PP) β. Το κουτί είναι από Kraft
2		Χάρτινο κουτί με περιεχόμενο 1 έως 240 τεμαχίων (20X18 εκ.)	

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: deltamethrin

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 98,5% β/β min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:
1. Meghmani Organics Limited, Ινδία
2. SEDQ Healthy Crops, S.L., Ισπανία
3. Bayer AG

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:
1. Meghmani Organics Limited, Ινδία
2. SEDQ Healthy Crops, S.L., Ισπανία
3. SBM Formulation

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Ετοιμόχρηστη παγίδα προσέλκυσης & θανάτωσης (attract & kill) για την καταπολέμηση της Μύγας της Μεσογείου (*Ceratitis capitata*) σε δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλι και τροπικά φρούτα με τη μέθοδο της μαζικής παγίδευσης. Η παγίδα στηρίζεται στην έκλυση στο περιβάλλον ελκυστικών τροφής και στόχος είναι το έντομο να έρθει σε επαφή με την εσωτερική επιφάνεια της παγίδας, η οποία είναι εμποτισμένη με πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο (deltamethrin).

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Το CERATIPACK® είναι ετοιμόχρηστο σκεύασμα για την μαζική παγίδευση των εντόμων. Ο χρήστης αφού συναρμολογήσει την παγίδα σύμφωνα με τις οδηγίες την κρεμάει είτε στα κλαδιά του δένδρου είτε στα σύρματα στήριξης.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Αριθμός Παγίδων / δεκάριο	Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
<p>Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρεϊπ- φρουτ Μοσχολέμονο (Λαϊμ)</p> <p>Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Αχλάδι τύπου “Nashi” Κυδωνιά, Μουσμουλιά)</p> <p>Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Βυσσινιά, Δαμασκηνιά, Βερικοκιά)</p> <p>Αμπέλι (επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο)</p> <p>Μάνγκο, Λωτός Συκιά, Κουμ Κουάτ, Ακτινιδιά, Star Fruit (<i>Averrhoa carambola</i>)</p>	<p>Μύγα της Μεσογείου (<i>Ceratitis capitata</i>), <i>Ceratitis spp.</i>)</p>	<p>5 – 8</p>	<p>Εφαρμογή των παγίδων από το στάδιο ανάπτυξης των καρπών μέχρι τη συγκομιδή. Τοποθετείστε τις παγίδες όταν 1 ενήλικο/παγίδα/η μέρα εμφανιστεί στις παγίδες παρακολούθησης ή 30-40 ημέρες πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών (BBCH:81) ή 50 ημέρες πριν τη συγκομιδή.</p> <p><u>Διάρκεια προστασίας:</u> 120 ημέρες.</p>	<p>1</p>

Παρατηρήσεις:

1. Οι διαχυτήρες θα πρέπει να αναρτηθούν σε ύψος 1.40 έως 1.80 μ από το έδαφος με την έναρξη της περιόδου με το μεγαλύτερο κίνδυνο που είναι περίπου 50 ημέρες πριν την συγκομιδή ή 30-40 ημέρες πριν την έναρξη του χρωματισμού των καρπών.
2. Η διάρκεια προστασίας είναι 120 ημέρες.
3. Συνιστάται να χρησιμοποιούνται 5 παγίδες σε περίπτωση κανονικής προσβολής και 8 παγίδες σε περίπτωση υψηλής προσβολής ανά δεκάριο

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Μη Εφαρμόσιμο	

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

- P405 +P102** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
- P220** Φυλάσσεται μακριά από ρούχα και άλλα εύφλεκτα υλικά .
- P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
- P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
- P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σημεία συλλογής σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία
- SP1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια (δείξτε την ετικέτα εάν είναι δυνατόν).

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινηθείτε στον καθαρό αέρα. Αν διαρκούν τα συμπτώματα ή υπάρχει κάποια αμφιβολία, συμβουλευθείτε ένα γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός αναπτύσσεται και επιμένει, επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, προσέχοντας να ξεπλυθεί η περιοχή κάτω από τα βλέφαρα. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός αναπτύσσεται και επιμένει, επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Κρατήστε σε ηρεμία. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

Πληροφορίες για το γιατρό: Κίνδυνοι:

Αυτό το προϊόν περιέχει ένα πυρεθρινοειδές.

Η δηλητηρίαση από πυρεθρινοειδή δεν πρέπει να συγχέεται με αυτή από καρβαμικά ή οργανοφωσφορικά.

Θεραπεία:

Επιτόπιος χειρισμός: Συστήνεται κατάλληλη υποστηρικτική και συμπτωματική θεραπεία όπως αυτή ενδείκνυται από την κατάσταση του ασθενή. Έλεγχος των αναπνευστικών και καρδιακών λειτουργιών.

Σε περίπτωση σπασμών, η χορήγηση βενζοδιαζεπάμης (diazepam) είναι η θεραπεία επιλογής.

Αντένδειξη: παράγωγα αδρεναλίνης.

Αντένδειξη: ατροπίνη.

Δεν υπάρχει αντίδοτο. Η ανάρρωση είναι αυτόματη και χωρίς επακόλουθα.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 1401

E. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, καλά κλειστό, σε θερμοκρασία 10 έως 25°C, χωρίς να εκτίθεται απευθείας στο φως. Ημερομηνία λήξης: Δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα αναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Z. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία: 18/10/2022



(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας