



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021  
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4554 (Έντυπο 01), για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

την επιστολή του αιτητή για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ιταλία,

χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **FOLPET 80 WG** με τα ακόλουθα στοιχεία:

**A) Γενικά στοιχεία άδειας**

1. Αριθμός Άδειας:

3998

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

03/04/2023

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/07/2024

2. Κάτοχος της άδειας:

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

## Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Folpet 80 WG

2. Μορφή: Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: folpet: 80 % β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 14,89% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: ADAMA Makhteshim Ltd

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: 1. ADAMA Makhteshim Ltd  
2. Kollant S.r.l.

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: 1. ADAMA Makhteshim Ltd  
2. Kollant S.r.l.  
3. MAGMA AGRO AEBE

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Κουτιά με εσωτερική σακούλα	100 γραμ. έως 5 κιλών	Σακούλα 3 στρώσεων (PET/Al/PE) κουτί χάρτινο
2.	Σακίδια	100 γραμ. έως 5 κιλών	Σακούλα 3 στρώσεων (PET/Al/PE)
3.	Σάκοι	10 έως 20 κιλών	Χάρτινος σάκος 4 στρώσεων με εσωτερική επίστρωση (LD-PE)

## Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: folpet

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 94 % β/β min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: 1. ADAMA Makhteshim Ltd  
2. India Pesticides Ltd.

4. Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.: 1. ADAMA Makhteshim Ltd  
2. India Pesticides Limited

## Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Μυκητοκτόνο επαφής, προληπτικής κυρίως δράσης.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:**

Ξεπλύνετε το ψεκαστικό και τα μέρη του με καθαρό νερό τρεις (3) φορές. Χρησιμοποιήστε όγκο νερού περίπου 1/10 του όγκου του ψεκαστικού.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	γρ.δεκ. μέγιστη		
<b>Αμπέλι</b> (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια)	<b>Φώμοψη</b> ( <i>Phomopsis viticol</i> )	200	100	200	Κατά την έκπτυξη των πρώτων φύλλων	<u>Οινοποιήσιμα</u> : 10 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-10 ημέρες <u>Επιτραπέζια</u> : 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-10 ημέρες
	<b>Περονόσπορος</b> ( <i>Plasmopara viticola</i> )	125 – 150		125 – 150		
<b>Τομάτα</b> (Υ+Θ)	<b>Τεφρά σήψη*</b> ( <i>Botrytis cinerea</i> )	150	100	150	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, για την ανάπτυξη των ασθενειών.	<u>Θερμοκηπίου</u> : 3 (εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-10 ημέρες) <u>Υπαίθρου</u> : 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-10 ημέρες
	<b>Ωίδιο*</b> ( <i>Erysiphe necator</i> )					
<b>Καλλωπιστικά</b>	<b>Περονόσπορος</b> ( <i>Phytophthora infestans</i> )	150	100	150	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, για την ανάπτυξη των ασθενειών.	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-10 ημέρες
	<b>Αλτερναρίαση</b> ( <i>Alternaria solani</i> )					
<b>Καλλωπιστικά</b>	<b>Τεφρά σήψη</b> ( <i>Botrytis cinerea</i> )	150	100	150	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, για την ανάπτυξη των ασθενειών.	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-10 ημέρες
	<b>Βοτρύτης</b> ( <i>Botrytis cinerea</i> <i>Phytophthora spp.</i> )					

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Αμπέλι	28 ημέρες οινοποίησης
	56 επιτραπέζιο
Τομάτα	10 ημέρες
Καλλωπιστικά	M.E

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: M4**

Το FOLPET χαρακτηρίζεται από πολλαπλή δράση και συνεπώς, μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης φαινομένων ανθεκτικότητας. Είναι χρήσιμο σε προγράμματα εναλλαγής για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας στα εξειδικευμένες δράσης μυκητοκτόνα

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις καλλιέργειες και χρόνο εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS07



GHS08



GHS09

## 12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

<b>H317</b>	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
<b>H319</b>	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
<b>H351</b>	Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
<b>H411</b>	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

## 13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

<b>P102+405</b>	Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.
<b>P270</b>	Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
<b>P201</b>	Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
<b>P261</b>	Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα
<b>P280</b>	Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. <i>«Φοράτε γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης και της εφαρμογής.»</i> <i>«Φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας σε περίπτωση επανεισόδου στις ψεκασμένες καλλιέργειες.»</i>
<b>P501</b>	Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένους τόπους απομάκρυνσης χημικών αποβλήτων/συσκευασιών.
<b>SP1</b>	Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα
<b>Spe3</b>	Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήνετε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>5 μέτρων</b> στην τομάτα</li><li>• <b>14 μέτρων</b> στο αμπέλι ή 5μ σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς για μείωση κατά 30% της διασποράς του ψεκαστικού νέφους.</li></ul>
<b>EUH401</b>	<i>«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»</i>

## 14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

<b>P308 + P313</b>	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Ή ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
<b>P302+ P352</b>	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
<b>P333+P313</b>	Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε γιατρό.
<b>P362+P364</b>	Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε
<b>P305+P351+P338:</b>	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
<b>P337+P313</b>	Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευτείτε γιατρό.
<b>Σε περίπτωση κατάποσης,</b>	ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα Μη προκαλέστε εμετό.
<b>Αντίδοτο:</b>	δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία .
<b>Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:</b>	1401

## Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό και σκοτεινό. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής

## ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες), μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

## Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 03/04/2023...



(Ανδρούλα Γεωργίου)  
Διευθύντρια  
Τμήματος Γεωργίας