


## Λαγοκέφαλος (*Lagocephalus sceleratus*)

Ο λαγοκέφαλος ή κουνέλι ή κουνελόψαρο είναι λεσσεψιανό είδος, εισήλθε δηλαδή στη Μεσόγειο από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, και έχει κάνει έντονη την εμφάνισή του στα νερά της χώρας μας τα τελευταία χρόνια. Φθάνει τουλάχιστον τα 110 εκ. σε μήκος και τα 7 κιλά σε βάρος. Έχει ράχη χρώματος πρασινοκαφέ με μάυρα ισομερή και κανονικά διατεταγμένα στίγματα, μια ασημένια λωρίδα από το σώμα μέχρι την άκρη της ουράς, άσπρη κοιλιά και μια ασημένια βούλα μπροστά από κάθε μάτι. Δεν έχει λέπια αλλά πολυάριθμα μικρά σαρκώδη αγκάθια στη ράχη και στην κοιλιά. Η γάθος φέρει 4 ισχυρά δόντια, 2 πάνω και 2 κάτω, τα οποία ενώνονται σχηματίζοντας ένα είδος ράμφους. Τα πλευρά και τα επίπλευρα απουσιάζουν, ένα χαρακτηριστικό που συνδέεται με την ικανότητα των ψαριών αυτών να φουσκώνουν σημαντικά το σώμα τους απορροφώντας νερό ή αέρα για να απωθούν τους θηρευτές τους. Ο λαγοκέφαλος κινείται σε κοπάδια σε όλων των τύπων τα υποστρώματα, από τον βυθό μέχρι την επιφάνεια, και σε βάθη μέχρι 100 μέτρα τουλάχιστον. Είναι ευκαιριακός θηρευτής και τρέφεται με μια μεγάλη ποικιλία οργανισμών, όπως κεφαλόποδα, μαλακόστρακα και ψάρια ακόμα και του είδους του. Πολύ συχνά επιτίθεται σε ψάρια που είναι ήδη πιασμένα σε δίχτυα ή αγκίστρια, προκαλώντας ζημιές στα εργαλεία και στα αλιεύματα με το ισχυρό ράμφος του. Δυστυχώς, ο λαγοκέφαλος είναι πια ένα από τα συχνότερα παραλιέυματα των ψαράδων της χώρας μας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο αναπαραγωγής τους καλοκαιρινούς μήνες.



την αλιεία και έτσι σπάνια το βλέπουμε στις εκφορτώσεις του αλιευτικού στόλου.

Όπως και ο λαγοκέφαλος, το φεγγαρόψαρο περιέχει στους ιστούς του την **ισχυρή νευροτοξίνη τετροδοτοξίνη** (TTX) και η εμπορία του απαγορεύεται βάσει ευρωπαϊκών κανονισμών. Τα συμπτώματα μετά από κατανάλωση περιλαμβάνουν μούδισμα στα χείλη και τη γλώσσα, παραισθησία στο πρόσωπο και τα άκρα, πονοκέφαλο, πόνο στο στομάχι, διάρροια και τάση εμετού, παράλυση, αναπνευστική δυσκολία μέχρι και θάνατο από παράλυση του αναπνευστικού συστήματος. **Δεν υπάρχει αντίδοτο στην τετροδοτοξίνη** και ο ασθενής θα πρέπει να **μεταφερθεί άμεσα σε ιατρικό κέντρο** για επιθετική θεραπεία μέχρι ο οργανισμός να αποβάλει την τοξίνη.



## Λεοντόψαρο (*Pterois miles*)

Το λεοντόψαρο είναι λεσσεψιανό είδος, εισήλθε δηλαδή στη Μεσόγειο από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και έχει εξαπλωθεί στα παράκτια νερά της χώρας μας τα τελευταία χρόνια. Ανήκει στην οικογένεια των σκορπιών (Scorpaenidae) και φθάνει τα 35 εκατοστά σε μήκος. Έχει εντυπωσιακή εμφάνιση με έντονα μαύρα στίγματα και πολυάριθμες μακριές σκληρές ακτίνες. Είναι επιδέξιος κυνηγός και τρέφεται κυρίως με μικρά ψάρια, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα.



Οι σκληρές ακτίνες του ραχιαίου, εδρικού και θωρακικού πτερυγίου του λεοντόψαρου περιέχουν ισχυρή τοξίνη. Το λεοντόψαρο δεν είναι επιθετικό είδος και τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν σε ψαράδες που τα συλλαμβάνουν. Τα συμπτώματα μετά από το σιμπόμπημα περιλαμβάνουν ακραίο πόνο, πονοκέφαλο, εμετό, δύσπνοια και ίσως αλλεργικό σοκ με σοβαρές επιπλοκές. Πολύ μικρά παιδιά και άτομα με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό ή αλλεργίες διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο. Φθάνει σε μήκος τα 2 μέτρα και σε βάρος τα 60 κιλά, αλλά συνήθως τα άτομα του είδους που φαρεύονται στα νερά μας έχουν μήκος γύρω στο 1 μέτρο και βάρος λιγότερο από 15 κιλά. Κινείται μόνο του ή σε ζευγάρια συνήθως κοντά στον βυθό, ενώ συχνά ανεβαίνει και στα μεσόνερα για να τραφεί. Τρέφεται κυρίως με ψάρια, κεφαλόποδα και μαλακόστρακα. Αλιεύεται με χοντρά παραγάδια, είτε αφροπαράγαδα στην επιφάνεια είτε σκυλοπαράγαδα στον βυθό.

## Βατί (οικογένεια Dasyatidae)

Το τσιρίτζι ή λαδόψαρο ή πηλακούτας είναι ένα μεγάλο βενθοπελαγικό είδος που ζει σε βάθη μέχρι 800 μέτρα. Φθάνει σε μήκος τα 2 μέτρα και σε βάρος τα 60 κιλά, αλλά συνήθως τα άτομα του είδους που φαρεύονται στα νερά μας έχουν μήκος γύρω στο 1 μέτρο και βάρος λιγότερο από 15 κιλά. Κινείται μόνο του ή σε ζευγάρια συνήθως κοντά στον βυθό, ενώ συχνά ανεβαίνει και στα μεσόνερα για να τραφεί. Τρέφεται κυρίως με ψάρια, κεφαλόποδα και μαλακόστρακα. Αλιεύεται με χοντρά παραγάδια, είτε αφροπαράγαδα στην επιφάνεια είτε σκυλοπαράγαδα στον βυθό.

## Παμπακάς (*Hexanchus griseus*)

Ο παμπακάς ή παμπακάρης ή σαπουνάς είναι το μεγαλύτερο είδος της τάξης Hexanchiformes, στην οποία ανήκουν τα είδη καρχαρίων με 6 - 7 αντί 5 βραχιακές σχισμές, φτάνοντας σχεδόν τα 5 μέτρα σε μήκος. Έχει χρώμα σκούρο καφέ, πιο ανοιχτόχρωμη πλευρική γραμμή και έντονα φθορίζοντα πράσινα μάτια. Ο παμπακάς απαντά σε βάθη από 100 μέχρι 2.000 μέτρα. Τρέφεται με ψάρια, κεφαλόποδα και καρκινοειδή. Αλιεύεται με χοντρά παραγάδια, αν και συνήθως απορρίπτεται από τους αλιεύς αφού δεν έχει εμπορική αξία.

Το κρέας του, αν και εύγευστο, **περιέχει τοξίνη**, κυρίως στο συκώτι και το δέρμα, η οποία δεν απορροφάται στον ανθρώπινο οργανισμό και συσσωρεύεται στο έντερο. Αν καταναλωθεί σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να προκαλέσει διάρροια και στομαχικές διαταραχές. Συνήθως δεν απαιτείται κάποιους είδους θεραπεία, αλλά αν η ενόχληση είναι έντονη **είναι καλό να ζητήσουμε ιατρική συμβουλή**.

## Φεγγαρόψαρο (Mola mola)

Το φεγγαρόψαρο ανήκει στην τάξη Tetraodontiformes στην οποία ανήκει και ο λαγοκέφαλος. Είναι πελαγικό είδος με πολύ ιδιαίτερη μορφολογία, αφού μοιάζει σαν ένα ψάρι χωρίς σώμα, μονάχα με κεφάλι. Είναι ο βαρύτερος γνωστός οστείχθυς στον κόσμο, με μέσο βάρος μεταξύ 250 και 1.000 κιλών. Το φεγγαρόψαρο τρέφεται κυρίως με μέδουσες. Τα θηλυκά του είδους παράγουν τα περισσότερα αυγά από οποιοδήποτε άλλο γνωστό σπονδυλωτό, μέχρι 300 εκατομμύρια κάθε φορά. Το φεγγαρόψαρο δεν αποτελεί είδος-στόχο για

την αλιεία και έτσι σπάνια το βλέπουμε στις εκφορτώσεις του αλιευτικού στόλου.

Όπως και ο λαγοκέφαλος, το φεγγαρόψαρο περιέχει στους ιστούς του την **ισχυρή νευροτοξίνη τετροδοτοξίνη** (TTX) και η εμπορία του απαγορεύεται βάσει ευρωπαϊκών κανονισμών. Τα συμπτώματα μετά από κατανάλωση περιλαμβάνουν μούδισμα στα χείλη και τη γλώσσα, παραισθησία στο πρόσωπο και τα άκρα, πονοκέφαλο, πόνο στο στομάχι, διάρροια και τάση εμετού, παράλυση, αναπνευστική δυσκολία μέχρι και θάνατο από παράλυση του αναπνευστικού συστήματος. **Δεν υπάρχει αντίδοτο στην τετροδοτοξίνη** και ο ασθενής θα πρέπει να **μεταφερθεί άμεσα σε ιατρικό κέντρο** για επιθετική θεραπεία μέχρι ο οργανισμός να αποβάλει την τοξίνη.



Dasyatis centroura

Η μακριά ουρά φέρει συνήθως ένα **μακρύ αιχμηρό δηλητηριώδες αγκάθι** στη βάση της, που σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να είναι και διπλό. Τα συμπτώματα μετά από το σιμπόμπημα περιλαμβάνουν ισχυρό πόνο για 6 με 48 ώρες αλλά πιο έντονο τα πρώτα 30 με 60 λεπτά, και, ανάλογα με το σημείο του σώματος, το βάθος εισώρησης, τη διάρκεια παραμονής του κεντριού και το άτομο, μπορεί να παρατηρηθούν αρτηριακοί σπασμοί, αρρυθμία, υπόταση, αναπνευστική δυσκολία και λασπώδεις βιότοπους, σε βάθη μέχρι 200 μέτρα. Τρέφονται κυρίως με βυθόβια ψάρια, κεφαλόποδα και μαλακόστρακα που εντοπίζουν στην άμφη με τη βοήθεια των πτερυγών τους.

## Dasyatis centroura

βατί είναι **απαραίτητη η άμεση ιατρική φροντίδα**. Άμεσο ανακουφιστικό μέτρο είναι η θέρμανση της περιοχής για περιορισμό της δράσης της τοξίνης.

## Σκορπιός (γένος Scorpaena)

Η ονομασία «**σκορπιός**» αποδίδεται στην Κύπρο στα τουλάχιστο 4 είδη του γένους *Scorpaena* που απαντούν στο νησί (*Scorpaena scrofa*, *Scorpaena notata*, *Scorpaena elongata*, *Scorpaena porcus*). Οι σκορπιοί είναι γενικά μικρά ψάρια, με μήκος συνήθως μεταξύ 5 και 20 εκατοστών, αν και κάποια είδη μπορούν να φτάσουν τα 50 εκατοστά σε μήκος και τα 2 κιλά σε βάρος. Οι σκορπιοί έχουν χοντροκομένο με σκούρα ακανόνιστα στίγματα, κοκκινοκαφέ με σκούρα ακανόνιστα στίγματα, καρκινικά που αποτελούνται από καρκινικά μεριμνά σε μήκος 5-10 μέτρων, που περιλαμβάνουν τον πόνο, την πλάτη, την πλευρά, την ουρά και την κοιλιά. Οι σκορπιοί αποτελούνται από καρκινικά μεριμνά σε μήκος 5-10 μέτρων, που περιλαμβάνουν τον πόνο, την πλάτη, την πλευρά, την ουρά και την κοιλιά. Οι σκορπιοί αποτελούνται από καρκινικά μεριμνά σε μήκος 5-10 μέτρων, που περιλαμβάνουν τον πόνο, την πλάτη, την πλευρά, την ουρά και την κοιλιά. Οι σκορπιοί αποτελούνται από καρκινικά μεριμνά σε μήκος 5-10 μέτρων, που περιλαμβάνουν τον πόνο, την πλάτη, την πλευρά, την ουρά και την κοιλιά. Οι σκ

## Κουρκούνα (γένος *Siganus*)



*Siganus rivulatus*

Η ονομασία «κουρκούνα» ή «προσφυγούλα» αποδίδεται στην Κύπρο στα 2 είδη του γένους *Siganus* που απαντούν στο νησί, τα *Siganus rivulatus* (άσπρη κουρκούνα) και *Siganus luridus* (μαύρη κουρκούνα). Και τα δύο είναι λεσσεψιανά είδη, εισήλθαν δηλαδή στη Μεσόγειο από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ. Το μήκος τους μπορεί να ξεπεράσει τα 40 εκατοστά, αλλά σπάνια υπερβαίνει τα 25 εκατοστά. Η **άσπρη κουρκούνα** έχει αστραφτέρο πρασινοσημί χρώμα που σκουραίνει ραχιάια και ασπρίζει κοιλιακά, κάποτε με κιτρινωπές γραμμές, ενώ **μαύρη κουρκούνα** έχει μονόχρωμο σκούρο πρασινοκαφέ σώμα. Είναι βενθικά είδη που απαντούν συνήθως σε μεγάλα κοπάδια σε περιοχές με λιβάδια του θαλάσσιου φανερόγαμου ποσειδώνια (*Posidonia oceanica*) ή βραχώδεις βυθούς, από την ακτή μέχρι και σε βάθος 60 μέτρων. Είναι αποκλειστικά φυτοφάγα είδη που τρέφονται με φύκια και άλγη. Αλιεύονται με καλάμι, στατικά δίχτυα, γυροβολιά, σκαρκές και ψαροντούφεκο.

Στις κουρκούνες, οι **σκληρές ακτίνες του ενιαίου ραχιαίου πτερυγίου** είναι δηλητηριώδεις. Τα συμπτώματα μετά από το σίμπτημα περιλαμβάνουν τοπικό πόνο, πρήξιμο και κοκκίνισμα στο σημείο επαφής, πυρετό και δύσπνοια. Άμεσο ανακουφιστικό μέτρο είναι η θέρμανση της περιοχής για περιορισμό της δράσης της τοξίνης, και αν η ενόχληση είναι έντονη **καλό είναι να ζητήσουμε ιατρική συμβουλή**.

## Λύχνος (*Uranoscopus scaber*)


Ο **λύχνος ή μύξης** είναι βενθικό ψάρι που ζει σε αμμολασπώδη υποστρώματα, σε βάθη από 15 έως 250 μέτρα. Το μήκος του συνήθως κυμαίνεται από 10 μέχρι 20 εκατοστά, αν και μπορεί να ξεπεράσει και τα 30 εκατοστά. Ο λύχνος είναι ένας αρκετά αποτελεσματικός θηρευτής του βυθού. Είναι συνήθως θαμμένος στην άμμο, έχοντας εκτεθειμένα μόνο τα μάτια και το στόμα, το οποίο έχει κλίση προς τα πάνω για εύκολη αρπαγή της λειάς. Μεταξύ της κάτω σιαγόνας και της γλώσσας έχει μια σαρκώδη κόκκινη προεξοχή που χρησιμεύει ως δόλωμα για την ανυποψίαστα θηράματά του. Ο λύχνος μπορεί να παραχθεί με ηλεκτρικές εκκενώσεις ισχύος μέχρι 50 βολτ, μέσω ενός οργάνου που βρίσκεται σε σάκο ακριβώς πίσω από τα μάτια. Είναι σαρκοφάγο ψάρι και τρέφεται με μικρά ψάρια και ασπόνδυλα, τα οποία καταπίνει ολόκληρα. Αλιεύεται με στατικά δίχτυα, τράτα βυθού και καθετή.

Ο λύχνος φέρει ένα **μεγάλο και εμφανές δηλητηριώδες αγκάθι πίσω από κάθε βραχιακό επικάλυμμα**. Τα συμπτώματα μετά από το σίμπτημα περιλαμβάνουν τοπικό πόνο, πρήξιμο και κοκκίνισμα στο σημείο επαφής, πυρετό και δύσπνοια. Άμεσο ανακουφιστικό μέτρο είναι η θέρμανση της περιοχής για περιορισμό της δράσης της τοξίνης, και αν η ενόχληση είναι έντονη **καλό είναι να ζητήσουμε ιατρική συμβουλή**.



## Κοκκαλάρης (*Squalus acanthias*)

Ο **κοκκαλάρης ή κεντρόνι ή ακανθίας** είναι ίσως το πιο επιτυχημένο είδος καρχαρία ανά το παγκόσμιο, αφού απαντά στις πλειστες θάλασσες σε σχετικά μεγάλους αριθμούς. Είναι βενθοπελαγικό είδος που ζει σε βάθη πέραν των 100 μέτρων. Το μήκος του συνήθως κυμαίνεται από 50 μέχρι 110 εκατοστά και το βάρος του από 1 μέχρι 3 κιλά. Είναι κοινωνικό είδος και σχηματίζει αγέλες σύμφωνα με το φύλο και το μέγεθος, αν και εποχιακά παρατηρούνται μεγαλύτερες αγέλες που αποτελούνται από αρσενικά και θηλυκά άτομα διαφόρων μεγεθών. Η διάιτά του, όπως στους πλείστους καρχαρίες, είναι ποικιλή, αλλά λόγω του μικρού του μεγέθους περιορίζεται κυρίως σε μικρά ψάρια, οστρακόδερμα, γαστερόποδα και κεφαλόποδα. Ο κοκκαλάρης αλιεύεται με τράτα βυθού, στατικά δίκτυα, παραγάδια και καθετή.



Ο κοκκαλάρης φέρει **δύο δηλητηριώδη αγκάθια**, ένα σε κάθε ραχιαίο πτερύγιο, τα οποία, λόγω της ευλυγισίας του, τον καθιστούν επικίνδυνο όταν πιαστεί ζωντανός σε δίχτυα ή αγκίστρια. Τα συμπτώματα μετά από το σίμπτημα περιλαμβάνουν τοπικό πόνο, πρήξιμο και κοκκίνισμα στο σημείο επαφής, πυρετό και δύσπνοια. Άμεσο ανακουφιστικό μέτρο είναι η θέρμανση της περιοχής για περιορισμό της δράσης της τοξίνης, και αν η ενόχληση είναι έντονη **καλό είναι να ζητήσουμε ιατρική συμβουλή**.

Στο παρόν έντυπο παρουσιάζονται μερικά μόνο από τα

τοξικά ψάρια που συναντάμε στη θάλασσα της Κύπρου.

Η επιλογή των ειδών έγινε με βάση την επικινδυνότητά


τους και το πόσο κοινά είναι. Στόχος είναι η ενημέρωση για

αναγνώριση των τοξικών ειδών, πρόληψη περιστατικών

αλλά και σωστή αντιμετώπιση και περίθαλψη μετά από

τραυματισμό ή δηλητηρίαση από τα είδη αυτά.

## Ρώσος (*Sargocentron rubrum*)



Ο **ρώσος** είναι άλλος ένας λεσσεψιανός μετανάστης που εισήλθε στη Μεσόγειο από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Είναι βενθικό είδος και απαντά σε βραχώδεις βυθούς, σε βάθη μεταξύ 2 και 60 μέτρων. Στα νερά της Κύπρου το μήκος του κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 10 και 20 εκατοστών. Έχει έντονα κοκκινοποτοκαλί χρώμα με λευκές οριζόντιες ραβδώσεις στο σώμα. Είναι κοινωνικό ψάρι που δραστηριοποιείται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τη μέρα συνηθίζει να κρύβεται σε τρύπες με άτομα του ίδιου είδους, αλλά και με άτομα των γενών *Apogonichthyoidei* και *Pempheridae*. Τρέφεται με πολύχαιτους, μικρά ψάρια, μαλάκια, αρθρόποδα και κυρίως δεκάποδα. Αλιεύεται με στατικά δίχτυα, παραγάδια, σκαρκές και καλάμι.

Ο ρώσος φέρει ένα **μεγάλο και εμφανές δηλητηριώδες αγκάθι σε κάθε προβραγχιακό επικάλυμμα**. Τα συμπτώματα μετά από το σίμπτημα περιλαμβάνουν τοπικό πόνο, πρήξιμο και κοκκίνισμα στο σημείο επαφής, πυρετό και δύσπνοια. Άμεσο ανακουφιστικό μέτρο είναι η θέρμανση της περιοχής για περιορισμό της δράσης της τοξίνης, και αν η ενόχληση είναι έντονη **καλό είναι να ζητήσουμε ιατρική συμβουλή**.

Έρευνα και συγγραφή κειμένων:

- Γιώργος Ιωάννου
- Νικόλας Μιχαηλίδης

Λειτουργοί Αλιείας και Θαλασσών Ερευνών

Γ.Τ.Π. 78/2017 - 500  
Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών  
Εκτύπωση: Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας



Κ

Υ

Π

Ρ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# Τοξικά Ψάρια στη θάλασσα της Κύπρου



Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  
Τμήμα Αλιείας και Θαλασσών Ερευνών