



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. 4186-P (Έντυπο 03), για χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου σε φυτοπροστατευτικό προϊόν και την τροποποίηση του προϊόντος αναφοράς σε σχέση με τις συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά και
τις αιτήσεις με αρ. 3982-P, 4219-P και 4849-P (Έντυπο 7) για ανανέωση της άδειας παράλληλου εμπορίου φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

τροποποιείται η άδεια παράλληλου εμπορίου στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ALLETTE
με τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3630-P

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

30/04/2024

Ημερομηνία λήξης άδειας:

15/03/2026

2. Κάτοχος της άδειας:

A.D Geoponiki Ltd

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:
(εφόσον είναι διαφορετικός από τον
κάτοχο άδειας)

A.D Geoponiki Ltd

4. Διανομέας / Διανομείς:

A.D Geoponiki Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Aliette

2. Μορφή: Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: fosetyl-Al: 80% β/β
βοηθητικές ουσίες: 16, 67% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: Bayer AG, Γερμανία

5. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλα μέσα σε κουτί	100γρ., 400γρ., 500γρ., 1Kg, 2.5 Kg και 5 Kg (2 σακουλάκια των 2.5 Kg)	Σακούλα Kraft-aluminium-PE, κουτί χάρτινο
2	2-4 Σακούλες μέσα σε κουτί		

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: fosetyl-Al

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 960 g/Kg min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: Bayer AG, Γερμανία

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.
Το fosetyl-Al, ανήκει στις φωσφονικές ενώσεις και δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων ή την ανάπτυξη του μυκηλίου και το σχηματισμό των σπορίων.
Χάρη στη διασυστηματική δράση του (κινείται ανοδικά και καθοδικά), το Aliette 80 WG επιτυγχάνει τη διέγερση των φυσικών αμυνών του φυτού και δρα αποτελεσματικά κατά Ωομυκήτων (Περονόσπορος, Φυτόφθορα), καθώς και κατά ασθενειών που προκαλούνται από βακτήρια, όπως το Βακτηριακό κάψιμο (*Erwinia amylovora*) και προσβολές από *Pseudomonas syringae*

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες

☒☐

3. Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε αναδεύοντας στο ψεκαστικό την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος, και συμπληρώστε με νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Ασθένεια που ελέγχεται	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	γρ./δεκ. μέγιστη		
Πορτοκαλιά CIDSΙ Λεμονιά CIDLI Μανταρινιά CIDRE Γκρέιπ φρούτ CIDPA	Φυτόφθορα (<i>Phytophthora</i> sp. - PHYTSP)	200 – 300	100 – 200	200 – 600	Ένας ψεκάσμος το μήνα αρχίζοντας από το φούσκωμα των οφθαλμών και μέχρι την ωρίμανση των καρπών (BBCH 51-89).	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 30 ημέρες
		400	125	500	Εφαρμογή στο φυτώριο / σπορείο.	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 60 ημέρες
		(2,5 γρ. σκευάσματος /λίτρο)			Εφαρμογή με επάλειψη	1
Μηλιά MABSD	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i> - VENTIN)	150 – 250	100 – 150	150 – 375	Προληπτικοί ψεκάσμοι αρχίζοντας πριν από την έναρξη της άνθησης και μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν περίπου το 70% του τελικού τους μεγέθους (BBCH 54-77).	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 12 ημέρες
	Φυτόφθορα λαιμού και ριζών (<i>Phytophthora cactorum</i> - PHYTCC)	250	100 – 150	250 – 375	Ψεκάσμοι φυλλώματος από την έναρξη της καρπώδεσης μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης (BBCH 61-83).	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 30 ημέρες
	Βακτηριακό κάψιμο (<i>Erwinia amylovora</i> - ERWIAM)	250	100 – 150	250 – 375	Προληπτικοί ψεκάσμοι λίγο μετά από την έναρξη της άνθησης και μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν περισσότερο από το μισό του τελικού τους μεγέθους (BBCH 61-75).	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες
Κυδωνιά CYDOB	Βακτηριακό κάψιμο (<i>Erwinia amylovora</i> - ERWIAM)	250	100 – 150	250 – 375	Προληπτικοί ψεκάσμοι λίγο μετά από την έναρξη της άνθησης και μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν περισσότερο από το μισό του τελικού τους μεγέθους (BBCH 53-75).	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες

Αχλαδιά PYUCO	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i> - VENTIN)	150 – 250	100 – 150	150 – 375	Προληπτικοί ψεκασμοί αρχίζοντας πριν από την έναρξη της άνθησης και μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν περίπου το 70% του τελικού τους μεγέθους (BBCH 54-77).	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 12 ημέρες
	Φυτόφθορα λαιμού και ριζών (<i>Phytophthora cactorum</i> - PHYTCC)	250	100 – 150	250 – 375	Ψεκασμοί φυλλώματος από την έναρξη της καρπώδεσης μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης (BBCH 61-83).	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 30 ημέρες
	Στεμφύλιο (<i>Stemphylium</i> sp. - STEMSP)	50		50 – 75	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος από την έναρξη της καρπώδεσης μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης (BBCH 61-83).	Μέχρι 5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες
	Βακτηριακό κάψιμο (<i>Erwinia amylovora</i> - ERWIAM) Βακτηρίωση (<i>Pseudomonas syringae</i> - PSDMSX)	250	100 – 150	250 – 375		Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες
Ακτινιδιά ATICH	Φυτόφθορα λαιμού και ριζών (<i>Phytophthora</i> sp. - PHYTSP)	250	150 – 200	375 – 500	Ψεκασμοί φυλλώματος αρχίζοντας στο τέλος της πτώσης των πετάλων και μέχρι σχεδόν όλοι οι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος (BBCH 69-79).	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 30 ημέρες
Αμπέλι (επιτραπέζιο & οиноποιήσιμο) VITVI	Περωνόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i> - PLASVI)	250	100	250	Προληπτικοί ψεκασμοί από το στάδιο των 5 φύλλων έως το «κλείσιμο» του τσαμπιού (BBCH 15-79).	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 12 ημέρες
Φράουλα (Υ+Θ) FRAAN	Σήψεις λαιμού και ριζών (<i>Phytophthora</i> sp. – PHYTSP, <i>Phytophthora cactorum</i> - PHYTCC, <i>Phytophthora fragariae</i> - PHYTFR)	250	100	250	Προληπτικοί ψεκασμοί έως την άνθηση (BBCH 12-59).	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 8 – 10 ημέρες
			10	---	Εμβάπτιση ριζώματος πριν τη φύτευση.	1
Τομάτα (Υ+Θ) LYPES Μελιτζάνα(Υ+Θ) SOLME	Περωνόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i> - PHYTIN)	200 – 300	100	200 – 300	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-89).	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 8 – 10 ημέρες
Αγγούρι (Υ+Θ) CUMSA Κολοκύθι(Υ+Θ)/ Κολοκυθάκι(Υ+Θ) CUUPG	Περωνόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i> - PSPECU)	200 – 300	80 – 100	160 – 300	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-89).	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 8 – 10 ημέρες

Πεπόνι (Υ+Θ) CUMME Καρπούζι (Υ+Θ) CITLA Κολοκύθα (Υ+Θ) CUUPE	Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i> - PSPECU)	200 – 300	80 – 100	160 – 300	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-89).	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 8 – 10 ημέρες
Μαρούλι (Υ+Θ) LACSA	Περονόσπορος (<i>Bremia lactucae</i> - BREMLA)	200 – 300	50 – 100	100 – 300	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-45).	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 – 14 μέρες
Αγκινάρα CYUSC		200	100	200	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-45).	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 – 14 μέρες
Φυτώρια Δένδρων (εκτός εσπεριδοειδών) UP_NU	Φυτόφθορα (<i>Phytophthora</i> sp. - PHYTSP)	250	100 – 120	250 – 300	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 30 μέρες
Καλλωπιστικά ¹ (Υ&Θ) UP_ORN	Φυτόφθορα (<i>Phytophthora</i> sp. - PHYTSP)	250	100 – 120	250 – 300	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 30 μέρες
		5-10 γρ./Τετ. μέτρο	100	---	Ριζοτόπσιμα	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 30 μέρες
Σπανάκι SPQOL	Περονόσπορος (<i>Bremia lactucae</i> - BREMLA)	200 – 300	50 – 100	100 – 300	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων ή εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση της ασθένειας (BBCH 14-45).	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 μέρες
Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας Ακρόδρουα ² : - Αμυγδαλιά ² PRNDU - Φιστικιά ² PIAVE - Φουντουκιά ² CYLAV	Φυτόφθορα (<i>Phytophthora</i> sp. - PHYTSP) Βακτηρίωση καρυδιάς (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Juglandis</i> - XANTJU) Μελάνωση Καστανιάς (<i>Phytophthora cambivora</i> - PHYTCM)	250	100 – 150	250 – 375	Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικές εφαρμογές μέχρι πριν το σχηματισμό του εδώδιου καρπού (BBCH 65)	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 30 μέρες

[illegible]

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Ακτινιδιά, Φυτώρια Δένδρων (εκτός εσπεριδοειδών)	40 ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αμπέλι (επιτραπέζιο & οινοποιήσιμο),	28 ημέρες
Αγκινάρα	21 ημέρες
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρούτ), Μαρούλι, Σπανάκι	15 ημέρες
Φράουλα (ψεκασμός φυλλώματος), Αβοκάντο	14 ημέρες
Τομάτα, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Κολοκύθι/Κολοκυθάκι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα	3 ημέρες
Φράουλα (εμβάπτιση ριζώματος), Καλλωπιστικά	M.E
Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά Καστανιά)	M.E (Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος)

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης - FRAC: **P07**

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στην ψεκασθείσα φυλλική επιφάνεια

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα:

11.Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS07

12. Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P264 Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο..

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό να φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.

Σε περίπτωση εισπνοής: μετακινηθείτε στον καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι, και εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400 και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε τα καλά με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Καλέστε αμέσως γιατρό. Θεραπεία του ματιού από οφθαλμίατρο.

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P337 + P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ειδοποιήστε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό και σε ηρεμία.

Πληροφορίες για το Γιατρό:

Συνήθως δεν απαιτείται γαστρική απόπλυση.

Παρόλα αυτά, εάν έχει καταποθεί σημαντική ποσότητα (περισσότερη από μία γουλιά) χορηγήστε ενεργό άνθρακα και θειικό Νάτριο.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με σχίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η άδεια παράλληλου εμπορίου χορηγείται στο προϊόν Aliette που είναι αδειοδοτημένο στην Ιταλία με εμπορικό όνομα Aliette 80WG και αριθμό έγκρισης 004710 και με κάτοχο άδειας την εταιρεία BAYER CROPSCIENCE S.R.L..

Το προϊόν αναφοράς στην Κύπρο, βάσει του οποίου χορηγείται η σχετική άδεια, είναι το Aliette 80WG με αριθμό άδειας 2616.

Η εταιρεία A.D Georoniiki Ltd, οφείλει να τηρεί αρχείο (Αρχείο Εισαγωγής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Παράλληλου Εμπορίου) με τις ποσότητες του σκευάσματος Aliette που εισάγονται στην Κύπρο (θα περιλαμβάνει όλα τα παραστατικά στοιχεία των εισαγωγών ανά παρτίδα σκευάσματος). Το αρχείο θα είναι άμεσα διαθέσιμο για έλεγχο από την αρμόδια Αρχή.

Για κάθε φορτίο του σκευάσματος Aliette που εισάγεται στην Κύπρο θα πρέπει να χορηγείται η σχετική «Άδεια για Εισαγωγή Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος Παράλληλου Εμπορίου». Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η εισαγωγή του σκευάσματος στη χώρα.

Η ετικέτα του σκευάσματος θα φέρει ευανάγνωστα τη φράση «**ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**» με τα πλέον έντονα και μεγάλα γράμματα.

Η άδεια παράλληλου εμπορίου θα ανακληθεί:

- σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας του προϊόντος αυτού στην Ιταλία για λόγους ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας.
- σε περίπτωση κακού χειρισμού της άδειας παράλληλου εμπορίου από την εταιρεία A.D Georoniiki Ltd, με στόχο την εισαγωγή ή τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων άλλων από αυτά για τα οποία χορηγήθηκε η παρούσα άδεια.

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία ...07/06/2024...



(Κωνσταντής Σπανάσις)
Αν. Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα