



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την αίτηση με αρ. 4194 (Έντυπο 01), για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος και την επιστολή του αιτητή για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ιταλία,
- τις αιτήσεις με αρ. 3851, 4346 και 4707 (Έντυπο 08) για παράταση της άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,
- την αίτηση με αρ. 900 (Έντυπο 09), για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος, σε σχέση με τον Κάτοχο της άδειας και τον παρασκευαστή του σκευάσματος,
- τις αιτήσεις με αρ. 216 και 246 (Έντυπο 10), για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος, σε σχέση με το φάσμα δράσης, λόγω αλλαγής των ανώτατων ορίων υπολειμμάτων (MRLs) για τη δ.ο. deltamethrin,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν GRAFITI 2,5EC με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3636

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

17/01/2025

Ημερομηνία λήξης άδειας:

15/08/2027

2. Κάτοχος της άδειας:

QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U.

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

A&E Stylianou Technochimiki Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον
κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

A&E Stylianou Technochimiki Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Grafiti 2,5 EC

2. Μορφή: Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: Deltamethrin: 2,5 % (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 97,35 % β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U.

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: LABORATORIOS SIRGA SA, Ισπανία

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: LABORATORIOS SIRGA SA, Ισπανία

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	25 κ.εκ. έως 1 λίτρο	Πλαστικό τύπου COEX (HDPE/ EVOH)
2	Φιάλη μέσα σε κουτί	25 κ.εκ. έως 500 κ.εκ.	Πλαστικό τύπου COEX (HDPE/ EVOH) Κουτί χάρτινο
3	Δοχεία	2 έως 20 λίτρα	Πλαστικό τύπου COEX (HDPE/ EVOH) ή COEX: HDPE+PA

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Deltamethrin

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 98% β/β min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: TAGROS CHEMICALS INDIA Ltd.

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: TAGROS CHEMICALS INDIA Ltd.

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής - στομάχου κατά μυζητικών και μασητικών εντόμων. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες



ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού δοχείου, δυο (2) φορές με καθαρό νερό.

5. φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλιέργ. / περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ.εκ/ δεκάριο	Κ.εκ. σκευ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ δεκ.		
Εσπεριδοειδή: - Πορτοκαλιά CIDI - Γκρέιπ-φρουτ CIDPA - Νεραντζιά CIDAU	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i>) MYZPE	30 – 50	30 – 50	100	ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	1
	Λεκάνιο (<i>Saissetia oleae</i> SAISOL) Μύγα της Μεσογείου (<i>Ceratitis capitata</i> CERTCA)	50	50	100		
	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> MYZPE)	30	30	100		
Εσπεριδοειδή: - Λεμονιά CIDLI - Μανταρινιά CIDRE	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> MYZPE)	30	30	100	ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	2 / 14
	Αφίδες (<i>Hyalopterus</i> sp. HYALSP) Καρπόκαψα Καρυδιάς (<i>Laspeyresia pomonella</i> CARPPO) Καρπόκαψα Καστανιάς (<i>Laspeyresia splendana</i> LASPSL)	42 – 50	30 50	140 100		
	Ευρύτομο (<i>Eurytoma plotnicovi</i> EURTPL)	50	50	100		
Μηλοειδή: - Μηλιά MABSD - Αχλαδιά PYUCO - Κυδωνιά CYDOB	Καρπόκαψα (<i>Laspeyresia pomonella</i>) CARPPO Αφίδες (<i>Aphis pomi</i> APHIPO, <i>Dysaphis plantaginea</i> DYSAPL) Ψύλλα μηλιάς (<i>Psylla mali</i>) PSYLMAL	30 – 50	30 – 50*	100 – 140	ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	2 / 14

- Μουσμουλιά MSPGE	Φυλλοδέτες (<i>Adoxophyes orana</i> CAPURE, <i>Archips rosanus</i> CACORO)	35 – 50	35	100 – 140	
	Ψύλλα αχλαδιάς (<i>Psylla pyri</i>) PSYLP	50	50	100	
Πυρηνόκαρπα: - Ροδακινιά PRNPS - Νεκταρινιά PRNPN - Βερικοκιά PRNAR - Δαμασκηλιά PRNDO - Κερασιά PRNAV - Βυσσινιά PRNCE	Φυλλοδέτες (<i>Adoxophyes orana</i> CAPURE, <i>Archips rosanus</i> CACORO)	35 – 49	35	100-140	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών 1
	Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i>) ANARLI	40 – 70	40 – 50		
	Ραγολέτιδα (<i>Rhagoletis cerasi</i>) RHAGCE	50 – 70	50		
	Μύγα της Μεσογείου (<i>Ceratitis capitata</i>) CERTCA	30 – 70	35 – 50		
	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> MYZYPE, <i>Myzus cerasi</i> MYZUCE, <i>Hyalopterus pruni</i> HYALPR)				
	Καρπόκαψα της Δαμασκηλιάς (<i>Laspeyresia funebrana</i>) LASPFU				
Αμπέλι ** VITVI	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i> POLYBO)	50 – 70	50 (1η γενεά) 50 – 70 (2η και 3η γενεά)	100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών 3 / 14
	Κογχυλιδα (<i>Clysia ambiguella</i> CLYSAM)	50 – 70	50 – 70		
	Τζιτζικάκι (<i>Empoasca</i> sp. EMPOSP)	50	50		
Ελιά (Επιτραπέζια και ελιές για παραγωγή λαδιού) OLVEU	Πυρηνοτρήτης (<i>Prays oleae</i>) (ανθόβιας και καρπόβιας γενιά) PRAYOL	40	30 – 40	80 – 100	Εφαρμογή κατά την περίοδο της ανθοφορίας
	Δάκος (<i>Bractocera oleae</i> DACUOL)	50-70	50	100 – 140	Σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες
	Λεκάνιο (<i>Saissetia oleae</i> SAISOL)	50-70	50	100 – 140	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής
	Βαμβακάδα (<i>Eupyllyura olivine</i> EUPHSP)	30-70	30 – 50	100 – 140	
	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> APHIGO, <i>Aphis ruborum</i> APHIRB,	50	30 – 50	30 – 100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών 2 / 14

	<i>Aulacorthum solani</i> AULASO, <i>Chaetosiphon fragaefolii</i> CHTSFR, <i>Myzus persicae</i> MYZUPE) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> sp.) SPODSP Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis ypsilon</i> AGROSP)					
Φράουλα (θερμοκηπίου) FRAAN	Αφίδες (<i>Aphis</i> sp.) APHISP	25 - 50	50	50 - 100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προβολών	3 / 14
Κρεμμύδι ALLCE Πράσο ALLPO Σκόρδο ALLSA	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> sp. AGROSP) Θρίπας (<i>Thrips tabaci</i> THRITB)	30 – 50	--	40 - 50	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προβολών	3 / 14
Τομάτα (Υπαίθρου και θερμοκηπίου) LYPES Μελιτζάνα (Υπαίθρου και θερμοκηπίου) SOLME	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> APHIGO, <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU, <i>Myzus persicae</i> MYZUPE) Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR) Άλτης (<i>Chrysodeixis chalcites</i> PLUSCH) Μαμέστρα (<i>Autographa gamma</i> PYTOGA) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis segetum</i> AGROSE) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG, <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI)	50	30 - 50	30 - 100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προβολών	2 / 14
	Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	30 – 50	50	60 - 100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προβολών	3 / 14
	Βρωμούσα (<i>Nezara viridula</i>)	18 - 30	30	60 - 100		
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis ypsilon</i> AGROSP)	30 – 50	--	60 - 100		

Πιπεριά (Υπαίθρου και θερμοκηπίου) CPSSS	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>) HELIAR Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> sp.) SPODSP Δορυφόρος (<i>Lepidotarsa decemlineata</i>) LPTNDE Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> MYZUPE, <i>Aphis gossypii</i> APHIGO, <i>Anuraphis cardui</i> BRDSCA, <i>Hyperomyzus lactucae</i> HYPELA)	30 – 50 (Υ) 30 – 70 (Θ)	50	60 – 100 (Υ) 60 – 140 (Θ)	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών 3 / 14 (Υ) 4 / 7 (Θ)
	Βρωμούσα (<i>Nezara viridula</i>) NEZAVI	18 – 30 (Υ) 18 – 42 (Θ)	30	60 – 100 (Υ) 60 – 140 (Θ)	
	Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) TRIAVA	42 – 70 (Θ)	70 (Θ)	60 – 100 (Θ)	
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> sp.) AGROSP	30 – 50 (Υ)	--	60 – 100 (Υ)	
Κολοκυθάκι (Υπαίθρου και θερμοκηπίου) CUUPG	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> APHIGO, <i>Myzus persicae</i> MYZUPE) Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR) Μαμέστρα (<i>Autographa gamma</i> PYTOGA) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI)	50	30 - 50	30 - 100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών 2 / 14
	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> APHIGO, <i>Myzus persicae</i> MYZUPE, <i>Hyperomyzus lactucae</i> HYPELA) Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis segetum</i> AGROSE, <i>Agrotis ipsilon</i> AGROYP)	50	30 - 50	30-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών 2 / 14
Αγγούρι, Αγγουράκι CUMSA (υπαίθρου & θερμοκηπίου)					

Πεπόνι (υπαίθρου & θερμοκηπίου) CUMME	Αφίδες <i>(Aphis gossypii</i> APHIGO, <i>Myzus persicae</i> MYZUPE) Πράσινο σκουλήκι <i>(Helicoverpa armigera</i> HELIAR) Σποντόπτερα <i>(Spodoptera littoralis</i> SPODLI, <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG) Μαμέστρα <i>(Autographa gamma</i> PYTOGA) Κοφτοσκούληκα <i>(Agrotis segetum</i> AGROSE, <i>Agrotis ipsilon</i> AGROYF)	50	30 - 50	30-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	2 / 14
Καρπούζι (υπαίθρου & θερμοκηπίου) CITLA	Αφίδες <i>(Aphis gossypii</i> APHIGO, <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU) Πράσινο σκουλήκι <i>(Helicoverpa armigera</i> HELIAR) Σποντόπτερα <i>(Spodoptera littoralis</i> SPODLI, <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG) Μαμέστρα <i>(Autographa gamma</i> PYTOGA)	50	30 - 50	30-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	2 / 14
Κουνουπίδι BRSOB Μπρόκολο BRBOK	Αφίδες <i>(Brevicoryne brassicae</i> BRVCBR, <i>Lipaphis erysimi</i> LIPAER, <i>Myzus persicae</i> MYZUPE) Πιερίδα <i>(Pieris brassicae</i> PIERBR, <i>Pieris rapae</i> PIERRA) Κοφτοσκούληκα <i>(Agrotis segetum</i> AGROSE, <i>Agrotis ipsilon</i> AGROYF) Πράσινο σκουλήκι <i>(Helicoverpa armigera</i> HELIAR) Μαμέστρα <i>(Mamestra brassicae</i> BARABR, <i>Autographa gamma</i> PYTOGA) Σποντόπτερα <i>(Spodoptera littoralis</i> SPODLI) Πλουτέλλα <i>(Plutella xylostella</i> PLUTMA)	50	30 - 50	30 - 100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	2 / 14

Μαρούλι (Υπαίθρου) LACSA	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>) HELIAR) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera exigua</i> SPODEX) Άλτης (<i>Chrysodeixis chalcites</i>) PLUSCH Αφίδες (<i>Hyperomyzus lactucae</i> HYPELA, Aphis sp. APHISP, Nasonovia ribisnigri NASORN)		25-50	50	50-100	ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών 2 / 7
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> sp.) AGROSP		30 - 50	--	50-100	
Ρόκα ERUVV	Αφίδες (<i>Aphis</i> sp.) APHISP Σποντόπτερα (<i>Spodoptera exigua</i>) SPODEX Μαμέστρα (<i>Mamestra</i> sp.) BARABR Άλτης (<i>Chrysodeixis chalcites</i>) PLUSCH		35	50	70	ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών 2 / 14
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> sp.) AGROSP		30 - 50	--	70	
Μπιζέλια (αρακάς) φρέσκα PIBSX	Αφίδα των μπιζελιών (<i>Acyrtosiphon pisum</i>) ACYRON Σιτόνα (<i>Sitona</i> sp.) SITNSP		25	--	100	ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών 2 / 14
	Αφίδα των κουκιών (<i>Aphis fabae</i>) APHIFA Κάμπια των μπιζελιών (<i>Laspeyresia nigricana</i>) LASPNI Θρίπας (<i>Thrips angusticeps</i>) THRIAN Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> sp.) AGROSP		30-50			
Ψυχανθή (όσπρια): - Φακή LENCU - Περίθια CIEAR	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>) HELIAR Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> MYZUPE, Aphis sp. APHISP) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> sp.) AGROSP		30 - 50	--	50 – 100	ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών 2 / 14

Πατάτα SOLTU	Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>) LPTNDE	50	--	60	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	3 / 14
	Σποντόπτερα (<i>Spodoptera littoralis</i>) SPODLI	30 - 50	--	60		
Βαμβάκι GOSHI	Ρόδινο σκουλήκι (<i>Pectinophora gossypiella</i>) PECTGO Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>) HELIAR	50 - 70	--	30-50	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	2 / 14
	Αλευρώδης (<i>Bemisia tabaci</i>) BEMITB Τζιτζικάκια (<i>Empoasca</i> sp.) EMPOSP	50	--			
	Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> sp.) SPODSP Αφίδα (<i>Aphis gossypii</i>) APHIGO Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> sp.) AGROSP	30 - 50	--			
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> sp.) AGROSP Θρίπας (<i>Thrips tabaci</i>) THRITB	30 - 50	--	50-100		
Καπνός NIOTA	Αφίδες (<i>Aphis fabae</i>) APHIFA, <i>Myzus persicae</i> MYZUPE) Μύγα των τεύλων (<i>Pegomya</i> sp.) PEGOSP Άλτης (<i>Chaetocnema tibialis</i>) CHAETI Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> sp.) SPODSP Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> sp.) AGROSP	30 - 50	--	50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	1
Παντζάρι BEAVV	Κασσιίδα <i>Cassida nebulosa</i> CASSNE	50	--	50		
Αραβόσιτος*** ZEAMX	Πυραλίδα (<i>Ostrinia nubilalis</i>) PYRUNU Σεξάμια (<i>Sesamia nonagrioides</i>) ESANO	30 - 50	--	60	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	3 / 14-21

	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>) IELIAR Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> sp.) SPODSP Αφίδες (<i>Rhopalosiphum padi</i> RHOPFI, <i>Sitobion avenae</i> MACSAV) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> sp.) AGROSP		50				3 / 7-14
	Διαβρώτικα (<i>Diabrotica virgifera</i> DIABVI)						
Σιτηρά: - Σιτάρι TRZAX - Κριθάρι HORVX - Βρώμη AVESW - Σίκαλη SECCE	Αφίδες (<i>Rhopalosiphum padi</i> RHOPFI <i>Sitobion avenae</i> MACSAV) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> sp.) AGROSP		30 - 50	--	40 - 60	ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	1
Μηδική	Αφίδα των μπιζελιών (<i>Acyrtosiphon pisum</i>) ACYRON Σκαθάρι των μπιζελιών (<i>Apion pisi</i>) APIORI Φυτονόμος (<i>Hypera postica</i>) HYPRPO		25	--	40	ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	2 / 14
Καλλωπιστικά (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	Αφίδες (<i>Myzus</i> sp.) MYZUPE Θρίπες (<i>Thrips tabaci</i>) THRITB		25 – 50	50	50-100	ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	3 / 7
	Φυλλοδέτες (<i>Archips</i> sp. CACORO, <i>Adoxophyes</i> sp. ADXPSP, <i>Pandemis</i> sp. PANDSP)		17,5 – 35	35			
	Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) TRIAVA		50	70	70		

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

* ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα μηλαιοδή η δόση των 50 κ.εκ. σκευάσματος/ηλ πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 lt/δεκάριο) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50 κ.εκ. σκευάσματος στο δεκάριο.

** Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν.

*** Η εφαρμογή στο καλαμπόκι οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia* spp. και *Sesamia* spp.

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Φράουλα, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι, Πεπόνι, Καρπούζι, Ρόκα	3 ημέρες
Αμπέλι, Ελιά, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βυσσινιά, Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Μαρούλι, Φακές, Ρεβίθια, Μπιζέλια-Αρακάς, Πατάτα, Καπνός	7 ημέρες
Μηδική	14 ημέρες
Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπφρούτ, Νεραντζιά, Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά, Βαμβάκι, Παντζάρι, Αραβόσιτος, Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη	30 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διατήρηση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 3Α

- Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών, φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.
- Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς.
- Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται τις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.
- Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές του προϊόντος. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών-στόχων με τη γρήγορη μέθοδο της αντικειμενοφόρου πλάκας, ειδικό σύστημα μικροδοκιμής, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
- Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.**

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:


Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.
Οι εργάτες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια αν εισέλθουν στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή.

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:



12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς..
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια / εκνεφώματα
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
Φοράτε κατάλληλα γάντια, φόρμα εργασίας, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο και αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια και φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή
P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένους τόπους απομάκρυνσης χημικών απόβλητων/συσκευασιών.
Sp1 Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:
30 μέτρων, για τις δενδρώδεις καλλιέργειες
20 μέτρων, για αμπέλι και ελιά
30 μέτρων, με φυτική κάλυψη, σε τομάτα, μελιτζάνα, κολοκυνθοειδή και φράουλα
20 μέτρων, που να συμπεριλαμβάνει **10 μέτρα φυτικής κάλυψης**, σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 75 %, σε Κουνουπίδι και Μπρόκολο
10 μέτρων για τις υπόλοιπες υπαίθριες καλλιέργειες

Spe3	Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από μη γεωργική γη, σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 80 %, σε δένδρωδεις καλλιέργειες ή κατά 60 %, σε ελιά.
Spe8	Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Για εφαρμογές σε καλλιέργειες θερμοκηπίου, για την προστασία των μελισσών να μην εφαρμόζεται κατά την διάρκεια της άνθησης, όταν τα θερμοκήπια παραμένουν ανοικτά. Μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα ωφέλιμα έντομα και επικονιαστές όπως βομβίνοι κ.α. Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες σε απόσταση τουλάχιστον 3 χιλιομέτρων

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P301+P310+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Διατηρείστε το στην αρχική, απαραβίαστη συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

1. Όσες ποσότητες του σκευάσματος, με την παλιά ετικέτα, υπάρχουν στα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων, ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά, οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο, για να ενημερώσει για τη νέα άδεια τα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων που έχουν ήδη προμηθευτεί το σκεύασμα.
2. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: ..17/01/2025.....



Σφραγίδα

Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας