



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την αίτηση με αρ. 4624 (Έντυπο 01), για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,
- την επιστολή του αιτητή για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Τσεχία,

χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
.....**DELTA PLUS ULV**..... με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

4112

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

02/08/2024

Ημερομηνία λήξης άδειας:

15/08/2027

2. Κάτοχος της άδειας:

Sharda Cropchem España S.L.

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

L. Lambrou Agro Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον
κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

L. Lambrou Agro Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

Delta Plus ULV

2. Μορφή:

Πολύ χαμηλού όγκου ψεκασμού
(Ultra-low volume (ULV) liquid)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

deltamethrin 0,6% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 99,31 % β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

SHARDA CROP CHEM LIMITED, Ινδία

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

1. SPACHEM S.L.
2. LERIDA UNIÓN QUÍMICA S.A. (LUQSA)
3. I.R.C.A. Services S.P.A.
4. Scam SPA
5. Gujarat Pesticides
6. CORAX-BIONER BIOTECHNOLÓGIAI ZRT

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. SPACHEM S.L.
2. LERIDA UNIÓN QUÍMICA S.A. (LUQSA)
3. I.R.C.A. Services S.P.A.
4. Scam SPA
5. Gujarat Pesticides
6. CORAX-BIONER BIOTECHNOLÓGIAI ZRT

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	250 κ.εκ., 500 κ.εκ., 1000 κ.εκ.	HDPE/PA
2	Δοχείο	5 και 10 λίτρα	HDPE/PA
3	Δοχείο	20 λίτρα	f-HDPE

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Deltamethrin

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98% (β/β) min
98,5% (β/β) min (2^η πηγή Tagros)

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

1. Sharda Cropchem Ltd.
2. Tagros Chemicals India Pvt Ltd.

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

1. Gujarat Pesticides
2. Tagros Chemicals India Pvt Ltd.

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου σε μορφή πολύ χαμηλού όγκου ψεκασμού για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων σε αποθηκευμένα σιτηρά (Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Τριτικάλε, Βρώμη, Σπέλτα, Αραβόσιτο, Ρύζι) και όσπρια (μπιζέλι, φασόλι, φάβα, ρεβίθι, φακή, λούπινο).

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός με αδιάλυτο το προϊόν κατευθείαν στους σπόρους πριν την εισαγωγή τους στην αποθήκη. Ο ψεκασμός θα πρέπει να γίνεται απευθείας στα προς αποθήκευση προϊόντα στον ιμάντα πλήρωσης των αποθηκών χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό (ULV).

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Προϊόν έτοιμο για χρήση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως όλα τα ορατά υπολείμματα του προϊόντος.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	κ.εκ./Τόνο σπόρων		
Σπόροι προς αποθήκευση: -Σιτηρά (Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Τριτικάλε, Βρώμη, Σπέλτα, Αραβόσιτος, Ρύζι)	<i>Rhizopertha dominica</i> , <i>Tenebroides mauritanicus</i> , <i>Orizaephilus surinamensis</i> , <i>Tribolium sp.</i> , <i>Sitotroga cerealella</i> , <i>Sitophilus granaries</i> , <i>Ephesia kuehniella</i>	--	--	42-84	Ψεκασμός με αδιάλυτο το προϊόν απευθείας στους σπόρους πριν την εισαγωγή τους στην αποθήκη με πολύ χαμηλού όγκου ψεκασμού (ULV). BBCH 99	1
	Σπόροι προς αποθήκευση: -Οσπρια (Μπιζέλι, Φασόλι, Φάβα, Φακή, Ρεβύθι, Λούπινο)					

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Όλες όσες παρουσιάζονται στο φάσμα δράσης	Δεν ορίζεται

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διατήρηση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης - IRAC: **deltamethrin: 3**

Μην εφαρμόζετε αυτό το προϊόν ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει δραστική ουσία πυρεθροειδούς διαδοχικά, χωρίς εναλλαγή με άλλο εντομοκτόνο με διαφορετικό μηχανισμό δράσης.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

--

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

--

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Οι εργάτες να μην εισέρχονται στο πεδίο εφαρμογής πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό (1 ημέρα μετά τον ψεκασμό).

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

--

10. Συνδυαστικότητα:

--

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P273: Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα.

«Φοράτε κατάλληλα γάντια, ολόσωμη φόρμα εργασίας και-κλειστά υποδήματα. κατά την ανάμειξη/ φόρτωση»

Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κλειστά υποδήματα, μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι, εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό.

P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την τοπική, περιφερειακή, εθνική ή διεθνή νομοθεσία

Sp1: Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Αποφύγετε τη μόλυνση μέσω αποχετεύσεων από αγροκτήματα και δρόμους).

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Γενικές πληροφορίες: Σε περίπτωση αδιαθεσίας επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή με έναν γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Εξασφαλίστε σωματική και ψυχική ηρεμία.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα και εμποτισμένα ρούχα. Πλύνετε τις προσβεβλημένες περιοχές του δέρματος με ζεστό νερό και σαπούνι αν είναι δυνατόν, στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά το δέρμα.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο, κατά προτίμηση χλιαρό καθαρό νερό. Εάν το άτομο έχει φακούς επαφής, αφαιρέστε τους εάν μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Στην αρχική του, κλειστή συσκευασία παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής σε θερμοκρασία 5°C έως 30°C.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 02/08/2024



Σφραγίδα

Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας